2016 年中药学综合知识与技能真题及答案

1.根据中医理论，“症”“证”“病”含义不同，下列表述中属于“证”的是 C
A.胸痹
B.心悸
C.气虚血瘀
D.胸胁胀满
E.胸痛彻背
2.根据阴阳理论，下列属阳的是 B
A.滋润
B.兴奋
C.抑制
D.凝聚
E.收敛
3.具有助心行血作用的气称为 B
A.营气
B.宗气
C.卫气
D.元气
E.真气
4.称为“十二经脉之海”的经脉是 D
A.带脉
B.督脉
C.任脉
D.冲脉
E.阴维脉
5.某女，22 岁。身体偏寒、喜静、少动，其体质类型应辨为 C
A.偏阳质
B.气虚质
C.偏阴质
D.痰湿质
E.瘀血质
6.根据七情内伤致病的理论，惊可导致 E
A.气上
B.气结
C.气消
D.气下
E.气乱
7.中医诊断用以分辨疾病性质的纲领是 C
A.阴阳
B.表里
C.寒热

金英杰医学搜集整理

D.虚实
E.气血
8.处方炒三仙、焦山仙中，“三仙”的组成是 A
A.山楂、麦芽、神曲
B. 山楂、稻芽、神曲
C. 槟榔、麦芽、神曲
D. 麦芽、稻芽、谷芽
E. 仙茅、仙灵脾、仙鹤草
9.安排饮片斗谱时，不能排于一斗或上下药斗中的是 C
A.麻黄与桂枝
B.陈皮与青皮
C.乌头与天花粉
D.酸枣仁与远志
E.板蓝根与大青叶
10.某女，48 岁。夜不能寐，虚烦不安，健忘，盗汗，舌红少苔，脉细数，应采用的治法是 D
A.健脾养心
B.疏肝解郁
C.清心泻火
D.滋阴养血
E.益气养血
11.某患儿，6 岁。面色萎黄，形体消瘦，神疲肢倦，不思饮食，腹满喜按，大便稀溏，夹有未消化食物，舌质淡，苔白腻，脉滑。治宜选用的方剂是 B
A.消乳丸
B.健脾丸
C.四物汤
D.香连丸
E.归脾汤
12.能使氨基糖苷类抗生素排泄减少，吸收增加，易引起暂时性或永久性耳聋的中药是 C
A.芒硝
B.雄黄
C.硼砂
D.石膏
E.硫黄
13.下列治疗感冒的中成药中，既含马来酸氯苯那敏又含安乃近的是 D
A.重感冒灵片
B.维 C 银翘片
C.感特灵胶囊
D.感冒灵胶囊
E.复方感冒灵片
14.临床使用清开灵注射液应特别监护的严重不良反应是 A
A.过敏性休克
B.肝损害
C.骨髓抑制
D.肾损害

金英杰医学搜集整理

E.脑卒中
15.处方调剂复核时，应予以纠正的错付是 B
A.草决明付决明子
B.大腹子付牛蒡子
C.双花付金银花
D.二术付苍术、白术
E.益母草子付茺蔚子
16.血清淀粉酶（AMS）活性增高常见于 D
A.急性胃肠炎
B.病毒性肝炎
C.慢性胆囊炎
D.急性胰腺炎
E.病毒性心肌炎
17.某女，因产后恶露不尽就诊。医师处方：当归 12g、川芎 9g、桃仁 9g、炙甘草 6g、炮姜 6g、坤草 15g，药师调剂时，坤草应付的是 B
A.金钱草
B.益母草
C.龙胆草
D.夏枯草
E.豨莶草
18.根据蒙医传统用药的“服药十则”，补养药的服用时间是 A
A.食前服
B.食间服
C.睡前服
D.空腹服
E.夹食服
19.可参考胸痹辩证论治的西医疾病是 C
A.高血压病
B.支气管炎
C.冠心病
D.支气管扩张症
E.病毒性肺炎
20.某男，因患慢性心衰，长期服用强心苷类药物，现咽喉红肿疼痛，音哑失声。下列中成药中，不宜与强心苷类药物同用的中成药是 A
A.六神丸
B.清音丸
C.金果饮
D.黄氏响声丸
E.牛黄解毒片
21.婴幼儿脏腑娇嫩，形体未充。下列关于婴幼儿用药原则的表述，错误的是 B
A.用量宜轻
B.宜佐滋补之品
C.宜用轻清之品
D.宜佐凉肝定惊之品

金英杰医学搜集整理

E.宜佐健脾和胃之品
22.诊断心肌坏死最敏感的首选标志物是 B
A.血清 CK-BB
B.血清肌钙蛋白 I
C.血清 CK-BB
D.血清 CK-MM
E.血清肌酸激酶
23.根据常见病辨证论治的理论，咳嗽风寒犯肺证的主要症状是 B
A.咳嗽气粗，咯痰黄稠
B.咳嗽声重，痰稀色白
C.干咳无痰，鼻燥咽干
D.咳嗽痰多，食后加重
E.咳嗽气急，郁怒诱发
24.中药养护中吸湿防潮法可采用的干燥剂是 B
A.干冰
B.生石灰
C.熟石灰
D.氯化钠
E.氢氧化钠
25.某男，28 岁。因频数就诊。症见小便频数短涩，淋沥刺痛，小腹拘急引痛。其中医诊断是 D
A.关格
B.尿浊
C.郁证
D.淋证
E.癃闭
26.中药饮片贮存过程中，易发生吸潮粘连和发霉的饮片是 C
A.黄柏
B.苦参
C.天冬
D.大黄
E.川芎
27.某男，39 岁。肛内肿物脱出，肛管紧缩，坠胀疼痛，触痛明显。舌质暗红，苔薄白，脉细涩。中医辨证为内痔气滞血瘀证，治宜选用的方剂是 A
A.凉血地黄汤
B.补中益气汤
C.桃仁承气汤
D.止痛如神汤
E.四妙勇安汤
28.某男，35 岁。口腔黏膜溃疡，周边红肿，灼痛明显，每因过食煎炒辛辣食物而发，并伴口渴心烦，大便秘结，小便短黄，舌红，苔黄腻，脉数无力。治宜选用的方剂是 A
A.凉膈散
B.枳术丸
C.龙胆泻肝汤
D.附子理中丸

金英杰医学搜集整理

E.玉女煎
29.执业药师指导患者用药时，应首先考虑的原则是 B
A.经济
B.安全
C.有效
D.简便
E.易得
30.处方调剂复核时，应予以纠正的错误是 B
A.生牡蛎单包先煎
B.苦杏仁未捣碎
C.薄荷单包后下
D.三七粉单包冲服
E.阿胶单包洋化
31.具有安神功能的藏药是 B
A.洁白丸
B.八味沉香散
C.大月晶丸
D.仁青芒觉
E.仁青常觉
32.某男，25 岁。因腹泻就诊。症见腹痛肠鸣，泻下粪便臭如败卵，伴有未消化食物，邂逅痛减，嗳腐吞酸，不思饮食，舌苔厚腻，脉滑。D
A.参苓白术散
B.四神丸
C.葛根芩连丸
D.保和丸
E.藿香正气散
33.临床使用不当可导致急性肾功能衰竭的中药是 C
A.南沙参
B.牡丹皮
C.马兜铃
D.瓜蒌皮
E.北沙参
34.某男，大便下血，血色黯淡，四肢不温，面色萎黄，舌淡苔白，脉沉细无力。辨证为便血，脾胃虚寒证，医师处以黄土汤加减。方中宜煎汤代水的中药是 D
A.阿胶
B.甘草
C.制附子
D.灶心土
E.地黄
35.罂粟壳中毒的典型症状是 A
A.瞳孔极度缩小
B.精神亢奋
C.呼吸紧促
D.血压升高

金英杰医学搜集整理

E.心跳加速
36.按药物自然属性分类的首部本草学专著是 D
A.《新修本草》
B.《神农本草经》
C.《本草纲目》
D.《本草经集注》
E.《重修政和本草》
37.某男，患鼓胀。医师处方中有京大戟、芫花，内服宜选用的炮制品是 A
A.醋炙品
B.酒炙品
C.蜜炙品
D.盐炙品
E.姜炙品
38.某女，妊娠 6 周。胎动不安，阴道少量下血。中医辨证属冲任不固，处方党参 30g、白术 10g、黄芪 15g、天山雪莲 6g、沙苑子 20g、续断 15g、桑寄生 15g、阿胶 15g。药师审方发现该方有妊娠禁忌的中药是 A
A.天山雪莲
B.白术
C.黄芪
D.续断
E.沙苑子
39.执业药师在审方中发现有中成药不合理配伍，下列各组配伍中，属证候禁忌的是 A
A.附子理中丸与黄连上清丸
B.二陈丸与平胃散
C.归脾丸与人参养荣丸
D.金匮肾气丸与麦味地黄丸
E.生脉饮与六味地黄丸
40.某女，24 岁。因受凉后出现头痛，连及项背。恶寒畏风，口不渴，舌质淡，苔白，脉浮。中医辨证为风寒头痛，治宜选用的中成药是 C
A.芎菊上清丸
B.通天口服液
C.川芎茶调颗粒
D.天麻钩藤颗粒
E.杞菊地黄丸
二、配伍选择题
【41-43】
A.鸡血藤
B.血竭粉
C.黄芪
D.五味子
E.桃仁
41.不宜与苦杏仁装于一个药斗的饮片是 E
42.常与红花装于一个药斗的饮片是 E
43.宜存放于加盖容器中的饮片是 B
【44-45】

金英杰医学搜集整理

A.通风干燥处
B.避光阴凉处
C.凉暗处
D.密闭容器中
E.阴暗处
44.含糖分多的饮片，应贮存于 A
45.炒制后的种子类饮片，应贮存于 D
【46-47】
A.另煎
B.冲服
C.烊化
D.煎汤代水
E.兑服
46.中药处方中含有竹沥水，正确的使用方法是 E
47.中药处方中含有西红花，正确的使用方法是 A
【48-49】
A.芒刺舌
B.瘦薄舌
C.痿软舌
D.齿痕舌
E.胖大舌
根据中医望诊理论
48.热邪亢盛可见 A
49.脾肾阳虚可见 E
【50-52】
A.口舌、四肢及全身麻木，头痛、头晕，精神恍惚，牙关禁闭，呼吸衰竭
B.恶心呕吐、口中有金属味，流涎，腹痛腹泻，口腔黏膜充血、牙龈肿胀溃烂
C.严重脱水，低蛋白血症，水肿，精神错乱，幻觉，癫痫样发作
D.胸闷、心悸，咽喉干痛，四肢无力，心电图显示房室传导阻滞
E.头晕、头痛，烦躁不安，面部肌肉紧张，吞咽困难，伸肌与屈肌同时收缩
50.轻粉中毒的主要临床表现是 B
51.朱砂中毒的主要临床表现是 B
52.乌头中毒的主要临床表现是 A
【53-54】
A.甘草
B.丹参
C.升麻
D.乌头
E.麻黄
根据中药症候禁忌理论
53.体虚多汗者忌用 E
54.湿盛水肿者忌用 A
【55-57】
A.百合固金汤

金英杰医学搜集整理

B.银翘散
C.荆防败毒散
D.参苏饮
E.清瘟解毒丸
治疗感冒时
55.属风热感冒者，宜选用的方剂是 B
56.属时行感冒者，宜选用的方剂是 E
57.属体虚感冒者，宜选用的方剂是 D
【58-60】
A.齿龈青紫
B.牙齿蛀蚀
C.齿龈淡白
D.齿稀根露
E.齿龈红肿
根据中医望诊理论
58.肾虚可见 D
59.血虚可见 C
60.胃火可见 E
【61-62】
A.钩藤
B.海金沙
C.人参
D.鹿角霜
E.阿胶
中药汤剂煎煮者
61.需后下的饮片是 A
62.需包煎的饮片是 B
【63-65】
A.通天口服液
B.十全大补丸
C.当归龙荟丸
D.杞菊地黄丸
E.半夏天麻丸
治疗眩晕时
63.属肝肾阴虚者，宜选用的中成药是 D
64.属痰浊上蒙者，宜选用的中成药是 E
65.属肝火上扰者，宜选用的中成药是 C
【66-67】
A.阴阳亡失
B.阴阳偏衰
C.阴阳偏盛
D.阴阳格拒
E.阴阳互损
66.身热反不恶寒，四肢厥逆，下利清谷，脉微欲绝，病机属于 D

金英杰医学搜集整理

67.冷汗淋漓，四肢厥逆，神情淡漠，脉微欲绝，病机属于 A

【68-69】

A.牡丹皮

B.细辛

C.红花

D.灯芯草

E.吴茱萸

按照对抗贮存法

68.宜与山药同贮的是 A

69.宜与蛤蚧同贮的是 E

【70-72】

A.清炒品

B.酒炒品

C.炒焦品

D.炒炭品

E.麸炒品

70.处方名王不留行，调配时应付 C

71.处方名莱菔子，调配时应付 C

72.处方名枳壳，调配时应付 B

【73-74】

A.固冲汤

B.圣愈汤

C.固阴煎

D.调肝汤

E.四物汤

治疗崩漏时

73.属气血两虚者，宜选用的方剂是 B

74.属脾不统血者，宜选用的方剂是 A

【75-77】

A.发热烦渴，汗多脉洪

B.午后热甚，身热不扬

C.午后发热，五心烦热

D.长期低热，劳倦则甚

E.日晡热甚，腹痛便结

75.气虚发热的症状特点是 D

76.湿热潮热的症状特点是 B

77.阴虚内热的症状特点是 C

【78-79】

A.祛痰止咳颗粒与镇咳宁胶囊

B.补中益气丸与桂附地黄丸

C.血府逐瘀丸与妇科千金片

D.附子理中丸与四神丸

E.天王补心丹与朱砂安神丸

78.因含有配伍禁忌中药而不宜合用的药组是 A

金英杰医学搜集整理

79.因含有相同有毒中药而不宜合用的药组是 E

【80-82】

A.影响药物吸收

B.影响药物代谢

C.增加药物排泄

D.减少药物排泄

E.影响药物分布

中西药联用时会引起药动学上的相互作用，下列药组中

80.煅龙骨与呋喃妥因联用能 C

81.陈皮与利福平联用能 E

82.藿香正气水与二甲双胍联用能 B

【83-84】

A.肺

B.心

C.脾

D.肝

E.肾

根据中医藏象理论

83.称为“贮痰之器”的脏是 A

84.称为“生痰之源”的脏是 C

【85-87】

A.阿司匹林

B.阿卡波糖

C.复方维生素 B

D.地高辛

E.法莫替丁

老年人用药时

85.不宜与麝香保心丸同时服用的药物是 D

86.不宜与银杏叶片同时服用的药物是 E

87.不宜与人参鹿茸丸同时服用的药物是 B

【88-90】

A.金芪降糖片

B.参苓白术散

C.人参健脾片

D.补肾强身片

E.杞菊地黄丸

88.属肾阴亏虚者，宜选用的中成药是 E

89.属脾胃气虚者，宜选用的中成药是 B

90.属阴虚燥热者，宜选用的中成药是 A

三、综合分析题

（一）

某女，32 岁。口舌生疮，烦躁焦虑，口干舌燥，小便短赤。舌尖红，苔薄黄，脉数。

91.口舌生疮，舌尖红，病位在 A

A.心

金英杰医学搜集整理

B.肝
C.胃
D.肺
E.肾
92.脉数主病是 C
A.虚证
B.阴证
C.热证
D.寒证
E.表证

（二）

某女，42 岁，经血淋漓不断月余，倦怠乏力，面色苍白，舌淡，脉细弱无力。
93.该病的病位在 C
A.心
B.肝
C.脾
D.肺
E.肾
94.中医辨证是 D
A.肝肾不足
B.气随血脱
C.气虚血瘀
D.气血两虚
E.精血亏虚
95.治宜选用的中成药是 C
A.少腹逐瘀丸
B.安坤赞育丸
C.乌鸡白凤丸
D.宫血宁胶囊
E.人参归脾丸

（三）

某男，56 岁。患高血压病服用吲达帕胺，后因血压控制不理想，自行加服珍菊降压片。近期感觉胸闷、心悸、乏力。到医院就诊。
96.医生告知患者联合用药一定要了解药物的成分和作用。珍菊降压片示含有西药成分的中成药，所含降压药成分是 D
A.甲基多巴
B.利血平
C.硝普钠
D.盐酸可乐定
E.氯沙坦
97.医师进一步告知，珍菊降压片除含上述西药成分外，还含有 D
A.卡托普利
B.硝苯地平
C.卡马西平

金英杰医学搜集整理

D.氢氯噻嗪
E.米诺地尔
98.医师认为患者出现的症状与其自行加服珍菊降压片有关。珍菊降压片和吲哚帕胺合用，最常见的不良反应是 C
A.低血糖
B.血小板减少
C.低血钾
D.低蛋白
E.白细胞减少

（四）

某男，31 岁。天气突然转冷，衣着单薄，致左上腹暴痛，喜温恶寒，得温痛减，口和不渴，恶心欲吐。舌质淡，舌苔薄白，脉弦紧。
99.中医诊断是 C
A.胸痹
B.痞满
C.胃痛
D.腹痛
E.嘈杂
100.中医辨证是 D
A.饮食停滞
B.肝胃郁热
C.脾胃虚寒
D.寒凝气滞
E.肝胃不和
101.宜选用的治法是 D
A.导滞和胃
B.疏肝和胃
C.温中健脾
D.温中散寒
E.温阳散寒
102.治宜选用的方剂是 A
A.良附丸加减
B.左金丸加减
C.附子汤加减
D.保和丸加减
E.黄芪建中汤加减

（五）

某男，75 岁。患者中风 1 年。左侧患肢软无力，手足浮肿，语言謇涩，面色少华。舌体不正，舌质淡紫，边有瘀斑，舌苔薄白，脉细涩无力。
103.中医辨证是 B
A.风痰阻络
B.气虚血瘀
C.肾精亏损

金英杰医学搜集整理

D.痰梦神窍
E.肝阳上亢
104.中医治法是 C
A.行气活血
B.滋肾利窍
C.益气活血
D.祛风涤痰
E.平肝潜阳
105.治宜选用的方剂是 B
A.天麻钩藤饮加减
B.补阳还五汤加减
C.镇肝熄风汤加减
D.通窍活血汤加减
E.血府逐瘀汤加减
106.治宜选用的中成药是 A
A.通心络胶囊
B.脑立清丸
C.血塞通片
D.脑血栓片
E.复方丹参片

（六）

某患儿，5 岁。体弱多病，近日口臭、便秘，家长希望用中药调理。请根据就诊情况选择用药。
107.初诊见其舌苔黄腻，脉滑，治宜选用的中药是 B
A.太子参，黄精
B.藿香、薏苡仁
C.黄芪、党参
D.菟丝子、肉苁蓉
E.补骨脂、熟地黄
108.经一段时间调理，患儿症状有所改善，但仍觉神疲乏力，易感冒，多汗，舌质淡，此时宜选用的中药是 A
A.黄芪、太子参
B.陈皮，茯苓
C.藿香、薏苡仁
D.白扁豆、稻芽
E.白芍、稻芽

（七）

某女，56 岁。因患类风湿关节炎，服用壮骨关节丸，每日服 2 次，每次 6 g。服药月余后，出现纳差，乏力，尿黄如浓茶色，皮肤黄染瘙痒，大便呈灰白色。遂收入院治疗。入院后进行各项检查，化验检查：ALT 316U/L，ALP 276U/L，GGT 231U/L，TBiL 171 μmol/L，DBiL 105 μmol/L，各种肝炎病毒学标志物检测均呈阴性，医师综合分析病情，考虑系药物不良反应，给予系统治疗。
109.根据上述临床资料，该患者发生的不良反应是 D
A.消化性溃疡
B.病毒性肝炎
C.急性胰腺炎

金英杰医学搜集整理

D.胆汁淤积型肝炎
E.急性胆囊炎
110.上述病例提示，为避免或减少壮骨关节丸不良反应的发生，在患者用药前，药师应进行用药指导，重点强调服药疗程、间隔时间及相关检查。关于该药服用方法的描述，正确的是 B
A.疗程 30 天，间隔 5 天
B.疗程 30 天，间隔 15 天
C.疗程 30 天，间隔 7 天
D.疗程 60 天，间隔 7 天
E.疗程 60 天，间隔 15 天
四、多项选择题
111.消灭病邪，防止邪气侵害的方法有 ABD
A.讲究卫生
B.使用药物
C.精神调养
D.防范外伤
E.人工免疫
112.使用乌头类药物引起中毒的原因有 ABCDE
A.过量服用
B.泡酒服用
C.使用生品
D.煎煮时间太短
E.个体差异引起蓄积性中毒
113.关于中成药不合理用药主要表现形式的说法，正确的有 ABCDE
A.药证不符
B.给药途径不当
C.给药剂量失准
D.疗程长短适宜
E.服药时间不当
114.在治疗疾病时，因人制宜需要考虑的因素包括 ACDE
A.年龄
B.季节
C.性别
D.体质
E.生活习惯
115.某女，32 岁。头晕眼花，心悸多梦，面色苍白，爪甲色淡，舌淡，苔薄白，脉细。治疗宜选用的中成药有 BCE
A.四神丸
B.八珍颗粒
C.十全大补膏
D.六味地黄丸
E.当归补血口服液
116.因富含鞣质，与乳酶生等含酶制剂联用时会产生抑酶作用的中药有 ACE
A.诃子
B.麻黄

金英杰医学搜集整理

C.地榆
D.女贞子
E.山茱萸
117.执业药师对医师开展用药咨询服务的内容包括 ABCD
A.新药信息
B.合理用药信息
C.药物相互作用与禁忌证
D.药品不良反应信息
E.价格信息
118.根据五行相生规律确定的治法有 BCDE
A.抑木扶土法
B.培土生金法
C.滋木涵水法
D.金水相生法
E.益火补土法
119.老年慢性病患者长期服用中药应注意的事项有 ABCD
A.从最小剂量开始服药
B.辨证用药，严格掌握适应病证
C.对体质较弱的患者不随意加药
D.服用多种药物时，注意药物相互作用，间隔服药
E.为增强疗效，可加大服用剂量，并坚持长期服用
120.饮片处方调配复核的主要内容有 ABCDE
A.有无虫蛀、霉变
B.毒麻药有无超量
C.剂量误差是否在允许范围内
D.特殊煎法的药味是否单包
E.有无错味、漏味、多味、异物

金英杰医学搜集整理