

# 2017 年全国卫生专业技术资格考试 护理学(师)知识点



## 2017 年全国卫生专业技术资格考试护理学(师)

## 高频必背考点 50 个知识点

1. 护理程序是指导护理人员以满足护理对象的身心需要,恢复或增进护理对象的健康为目标,运用系统理论方法实施计划性、连续性、全面整体护理的一种理论与实践模式。由评估、诊断、计划、实施、评价 5 个步骤组成。

2. 医疗事故的构成要件:主体是医疗机构及其医务人员;行为具有违法性;过失造成了患者人身损害;必须是医务人员的过失行为所致而非故意伤害患者,且对患者有人身损害的后果;过失行为与后果之间存在因果关系。

3. 前哨痔、肛裂与肛乳头肥大常同时存在,合称肛裂三联征。

4. 护理诊断是由名称、定义、诊断依据、相关因素四部分组成。

5. 骨折基本经历 3 个期,即血肿炎症机化期、原始骨痂形成期和骨板形成塑形期

6. 每次鼻饲量不超过 200 ml,间隔时间大于 2 小时。鼻饲液温度 38~40℃为宜。新鲜果汁与奶液应分别灌入,防止产生凝块。要素饮食浓度宜从 5% 开始,逐渐增加至 20%~25%;速度宜从 40~60 滴/分开始,逐渐增加至 120 ml/h,最高可达到 150 ml/h。

7. 圆韧带、阔韧带、主韧带和宫底韧带以及骨盆底肌肉和筋膜共同维持子宫的正常位置。

8. 传染性分泌物、排泄物 3 次培养结果均为阴性或已度过隔离期,医生开出医嘱后方可解除隔离。

9. 药物吸收速度:吸入>肌内注射>皮下注射>直肠>口服>皮肤。

10. 晶体液——分子量小,血管内存留时间短,维持细胞内外水分的相对平衡;胶体液——分子量大,血管内存留时间长,维持血浆胶体渗透压;静脉高营养液——提供热量,补充蛋白质、维生素和矿物质,维持正氮平衡。

11. 门脉高压 4 条交通支可简单记忆为:胃食直肛,前壁后腹。

12. 肠梗阻的临床表现可记为:痛(腹痛)吐(呕吐)胀(腹胀)闭(停止排便排气)。

13. 输液速度应根据患者年龄、病情、输液目的和药物性质等多方面情况来确定;一般成年人输液速度在 40~60 滴/分,儿童应为 20~40 滴/分,老年人不宜超过 40 滴/分;患有心脏(特别是心功能不全)或肺部疾病的患者,输液速度更慢;不同药物对输液速度也有要求,例如左氧氟沙星和补钾速度都不宜过快;还要根据病情调整输液速度,如通过快速补液来抢救血容量不足的休克患者时输液速度宜快。

14. 急性病容——急性感染性疾病;慢性病容——恶性肿瘤、肝硬化、严重结核;二尖瓣面容——风湿性心脏病;贫血面容——各型贫血;其他——甲亢面容、满月面容、脱水面容、面具面容等。

15. 子宫体肌纤维缩复——产后 6 周;子宫内膜的再生——产后 6 周;子宫颈——产后 4 周;子宫血管——螺旋动脉和静脉窦压缩变窄,胎盘附着面形成血栓,最后机化。

16. 收缩期杂音:二尖瓣区——二尖瓣关闭不全、二尖瓣脱垂综合征;主动脉瓣区——

主动脉狭窄;肺动脉瓣区——肺动脉瓣狭窄;三尖瓣区——二尖瓣狭窄、肺心病。舒张期杂音;二尖瓣区——中、重度主动脉瓣关闭不全——Austin-Flint 杂音;主动脉区——风湿性心瓣膜病、先天性心脏病、特发性主动脉脱垂;肺动脉瓣区——二尖瓣狭窄伴明显肺动脉高压。

17. 红色或棕红色——肺结核、肺癌、肺梗死出血;铁锈色——肺炎球菌肺炎;红褐色或巧克力色——阿米巴肺脓肿;粉红色泡沫——急性肺水肿;砖红色胶冻样——克雷伯菌肺炎;恶臭味厌氧菌感染。

18. 深呼吸和有效咳嗽利排痰,痰液黏稠时要吸入,排痰无力者胸部锤击,痰量较大时体位引流,意识不清者机械吸痰。

19. 哮喘典型症状为发作性呼气性呼吸困难或发作性胸闷和咳嗽,伴有哮鸣音;夜间及凌晨发作和加重。缓解哮喘发作——支气管舒张药;控制哮喘发作——糖皮质激素;急性发作期——糖皮质激素+ $\beta_2$ 受体激动剂。

20. 心源性水肿自下而上,首先在身体最低位置出现;肾源性水肿自上而下,常首先出现眼睑水肿,晨起出现肾病面容。

21. 最常见的疝内容物是小肠,难复性疝最常见的疝内容物是大网膜,最易嵌顿的疝为股疝。

22. 食管癌以鳞癌最常见,好发部位为胸中段>下段>上段。食管癌术后护理可记为:禁食减压三四天,注意饮食一二月。

23. 每日出血超过 50 ml 时可出现黑便,胃内积血超过 250 ml 时可出现呕血,出血超过 1000 ml 可出现休克。

24. 上腹部空腹振水音、胃蠕动波以及空腹抽出胃液量>200 ml 是幽门梗阻的特征性表现。

25. 闭合性气胸空气不能自由进出,抽气后压力下降,张力性气胸空气只进不出,抽气时压力先下降后迅速升高,开放性气胸空气可自由进出,抽气数分钟后压力不变。

26. 肝性脑病最常见的病因为病毒性肝炎肝硬化,最常见的诱因为上消化道出血。肝性脑病四期临床表现进展为“稍变-异常-昏睡-昏迷”。

27. 结核性腹膜炎主要因腹腔内结核灶直接蔓延,可有血行感染,但无经口感染。

28. 出血 10 ml 以内出现潜血试验阳性,100 ml 以内出现黑便,1000 ml 以上则可出现休克。

29. 三腔二囊管放气后保留 1 天后可拔出,胆管引流 T 管行夹管 1~2 天后拔出。

30. 尿蛋白持续大于 150 mg/d 为尿蛋白阳性,超过 3.5 g/d 时为大量蛋白尿。

31. 原发:我国导致慢性肾衰竭的主要病因是慢性肾小球肾炎;继发:我国导致慢性肾衰竭的主要继发性肾病是糖尿病肾病。

32. 再障的临床表现为三系减少产生的贫血,易感染,出血。再障的一个典型特征为肝脾不大。雄激素对全部再障有效果。

33. 急性白血病临床表现主要为红细胞和血小板减少,白细胞常升高而导致的贫血,出血以及发热。

34. 甲亢时白细胞总数减少,甲状腺危象时白细胞总数增多。甲状腺危象的抢救可记为“一合适,尔清透”即抑制甲状腺激素合成与释放,再用普萘洛尔和氢化可的松,再不行则

透析。

35.1 型糖尿病的特点可记为:年少(起病年龄早)体瘦(体型较瘦)起病急,三多一少(症状明显)易中毒(易发生糖尿病酮症酸中毒)。而 2 型糖尿病的特点大体相反推导可得。1 型糖尿病最主要的死亡原因为糖尿病肾病,2 型糖尿病最主要的死亡原因为心血管疾病。糖尿病的治疗可记为“五驾马车”:会吃,会运动,会检测血糖,会吃药,会检测并发症。

36.急性暴发型系统性红斑狼疮采用冲击治疗 and 对症治疗。

37.关节畸形为类风湿关节炎的晚期表现之一,风湿性关节炎无关节畸形。

38.毒蕈碱样症状可记为:心抑(心率减慢)血扩(血压下降)内平收(内脏平滑肌收缩),括松(括约肌松弛,大小便失禁)腺泌(腺体分泌增加)瞳孔缩(瞳孔缩小)。

39.控制脑水肿,降低颅内压是脑出血急性期处理的一个重要环节。

40.第一杯尿液异常,提示病变在尿道;第三杯尿液异常提示病变在后尿道、膀胱颈部或膀胱三角区;三杯尿液均异常,提示病变在膀胱或其以上部位。

41.微循环障碍分 3 期可记为:“收张杰”,即收缩期、扩张期和衰竭期。休克的治疗原则为:上联——扩管纠酸疏血管,下联——强心利尿抗感染,横批激素。休克的护理措施主要为:扩管保平衡,保温保呼吸,观察防感染。

42.产褥期表现:体温升高、脉搏略缓、子宫复旧、产后宫缩痛、恶露、会阴伤口、褥汗、排尿困难及便秘、乳房胀痛、乳头皲裂、体重减轻、疲乏、产后压抑。

43.胸外按压的并发症主要是肋骨骨折、心包积血或心脏压塞、气胸、血胸、肺挫伤等,应遵循正确的操作方法,尽量避免发生。

44.治疗活动早期佝偻病给予维生素 D 口服法的时间 1 月后改预防量。佝偻病恢复期长骨 X 线片改善的特点是临时钙化带重新出现。

45.镜下红细胞超过 3 个为镜下血尿,白细胞超过 5 个为脓尿。

46.颅内高压三联症为:头痛,呕吐,视盘水肿。引流脑脊液每日不宜超过 500 ml,胸腔抽液每日不宜超过 1000 ml。脑疝形成的最主要的根本条件为颅内各腔压力不均衡。

47.先兆流产——宫颈口未开,胎膜未破,妊娠产物未排出;难免流产——流产不可避免;不全流产妊娠产物部分排出;完全流产妊娠产物已完全排出;稽留流产胚胎或胎儿已死亡滞留在宫腔未自然排出;习惯性流产——自然流产连续发生 3 次或 3 次以上。

48.小脑幕切迹疝意识障碍发生早,枕骨大孔疝早期发生呼吸骤停。出现熊猫眼征为颅前窝骨折,有耳漏为颅中窝,可出现 Battle 征,无脑脊液漏考虑为颅后窝骨折。

49.喉返神经一侧前支或者全支伤出现声音嘶哑,两侧后支伤出现呼吸困难,两侧前支或者全支伤出现失音和呼吸困难。

50.无排卵性功血——子宫不规则出血,月经周期紊乱;排卵性功血——黄体功能不足者月经周期缩短,月经频发,子宫内膜不规则脱落者月经周期正常,经期延长。雌、孕激素序贯疗法——青春期功血或育龄期功血内源性雌激素水平较低者;雌、孕激素合并应用——育龄期功血内源性雌激素水平较高者;后半周期疗法——青春期或绝经过渡期功血。

## 2017 年全国卫生专业技术资格考试

## 护理学(师)押题 50 题

1. 粪便呈腥臭味的疾病是
- 上消化道出血
  - 下消化道出血
  - 胆道梗阻
  - 阿米巴痢疾
  - 直肠癌
2. 全身微循环障碍的患者禁忌使用冷疗的理由是
- 冷疗会引起患者冻伤
  - 冷疗会引起患者过敏
  - 冷疗会引起患者腹泻
  - 因患者循环不良,组织营养不足,若使用冷疗,进一步使血管收缩,加重血液循环障碍,导致局部组织缺血缺氧而变性坏死
  - 因冷疗可降低血液循环会影响创面愈合
3. 软组织损伤初期禁用热疗,其时间界定为
- 12 小时以内
  - 24 小时以内
  - 36 小时以内
  - 48 小时以内
  - 72 小时以内
4. 股动脉搏动点位于
- 髂嵴和坐骨结节连线的中点
  - 髂前上棘和耻骨结节连线的中点
  - 髂前上棘与脐连线的上外 1/3 交界处
  - 耻骨联合上方 1~2 cm 处
  - 髂嵴与耻骨联合连线的中点
5. 解除深昏迷患者舌后坠的最佳方式是
- 仰卧压胸法
  - 托下颌法
  - 仰头抬颈法
  - 仰面抬颌法
  - 俯卧压背法
6. 患者男性,43 岁。因胆道梗阻出现黄疸,尿中有胆红素,其尿液颜色为
- 红色
  - 乳白色
  - 淡黄色
  - 黄褐色
  - 酱油色
7. 患者女性,25 岁。手术后出现肠胀气,予肛管排气后缓解不明显,应间隔多少时间后再次进行排气
- 30 分钟
  - 1~2 小时
  - 2~3 小时
  - 3~4 小时
  - 5~6 小时
8. 患者女性,59 岁。直肠癌根治术后欲行静脉营养治疗,此时护士应选取的穿刺静脉为
- 股静脉
  - 颈外静脉
  - 手背静脉
  - 大隐静脉
  - 足背静脉
9. 患者女性,27 岁。因输卵管妊娠破裂行急诊手术,术中拟行自体输血,要求其血液流入腹腔的时限为
- 16 小时以内
  - 18 小时以内
  - 20 小时以内
  - 22 小时以内
  - 24 小时以内
10. 患者男性,26 岁。1 小时前因“急性一氧化碳中毒”急诊入院,为纠正缺氧,现欲行静脉输血治疗,以下适宜的血液制品种类为
- 血小板浓集悬液

- B. 浓集红细胞  
C. 红细胞悬液  
D. 洗涤红细胞  
E. 白细胞浓集悬液
11. 灌肠降温所用灌肠液的温度为  
A. 24~26 °C  
B. 28~32 °C  
C. 33~35 °C  
D. 38~40 °C  
E. 39~40 °C
12. 直接引起心脏后负荷加重的瓣膜病为  
A. 主动脉瓣狭窄  
B. 主动脉瓣关闭不全  
C. 二尖瓣狭窄  
D. 二尖瓣关闭不全  
E. 三尖瓣关闭不全
13. 敌百虫中毒病人禁用的洗胃溶液是  
A. 1 : 5 000 高锰酸钾  
B. 生理盐水  
C. 2% 碳酸氢钠  
D. 温开水  
E. 1% 食盐水
14. CO 与血红蛋白的亲合力比氧与血红蛋白的亲合力  
A. 大 240 倍  
B. 小 240 倍  
C. 大 3 600 倍  
D. 小 3 600 倍  
E. 大 360 倍
15. 支配环甲肌, 使声带紧张的神经是  
A. 喉上神经内支  
B. 喉上神经外支  
C. 喉返神经  
D. 交感神经  
E. 副交感神经
16. 甲状腺髓样癌最可靠的实验室诊断是  
A. 血清 T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub>  
B. 血清 TSH  
C. 血磷  
D. 血清降钙素  
E. 血清蛋白结合碘
17. 内痔的好发部位多在截石位的  
A. 3、7、12 点  
B. 2、4、8 点  
C. 3、5、11 点  
D. 3、6、9 点  
E. 3、7、11 点
18. 手术台数或手术间数的设置与外科实际床位数的比例一般为  
A. 1 : 20~1 : 25  
B. 1 : 20~1 : 30  
C. 1 : 15~1 : 20  
D. 1 : 20~1 : 28  
E. 1 : 25~1 : 30
19. 患者男性, 40 岁。在工地劳动中被铁钉刺伤足底, 1 周后发生破伤风, 其致病菌是  
A. G(+) 厌氧芽胞杆菌  
B. G(-) 厌氧芽胞杆菌  
C. G(+) 需氧杆菌  
D. G(-) 需氧杆菌  
E. G(+) 需氧球菌
20. 患者在输液过程中突然出现肺水肿, 遵医嘱给予酒精湿化、加压吸氧, 此时湿化瓶内的酒精浓度应为  
A. 50%~70%  
B. 40%~50%  
C. 30%~40%  
D. 20%~30%  
E. 10%~20%
21. 患者女性, 足月妊娠, 规律性腹痛 10 小时, 检查宫口开大 5 cm。先露部头居棘上 1 cm。大囟门位于 8 点, 小囟门位于 2 点, 下述胎位最正确的是  
A. 枕左前位  
B. 枕左后位  
C. 枕右前位  
D. 枕右后位  
E. 高直后位
22. 患儿, 生后 12 小时。出现呼吸困难, 鼻扇, 呻吟, 胸部 X 片示: 两肺呈毛玻璃样改变, 支气管充气征(+), 应考虑为

- A. 新生儿窒息  
 B. 新生儿肺炎  
 C. 新生儿肺透明膜病  
 D. 新生儿湿肺  
 E. 新生儿呼吸暂停
23. 患儿男, 3 岁。1 岁起青紫逐渐加重, 哭后更严重, 有昏厥史, 胸骨左缘有Ⅲ级收缩期杂音无震颤, 心脏 X 片呈“靴形”心影, 应考虑为
- A. 房间隔缺损  
 B. 室间隔缺损  
 C. 动脉导管未闭  
 D. 风心病二尖瓣狭窄  
 E. 法洛四联症
24. 患儿男, 7 岁。从小体弱、易累、消瘦、易患感冒曾患过 3 次肺炎。查体胸骨左缘第 2 肋间可闻及粗糙连续性机器样杂音可见毛细血管搏动及股动脉枪击音。诊断考虑为
- A. 室间隔缺损  
 B. 房间隔缺损  
 C. 动脉导管未闭  
 D. 法洛四联症  
 E. 肺动脉狭窄
25. 患儿女, 3 岁。自幼发现心脏杂音, 经常患肺炎, 查体胸骨左缘第 3 肋间 IV 级粗糙收缩期杂音, 心电图左室及右室均肥大, X 线肺血多, 肺动脉段膨隆。诊断应考虑为
- A. 室间隔缺损  
 B. 房间隔缺损  
 C. 动脉导管未闭  
 D. 法洛四联症  
 E. 肺动脉狭窄
26. 患儿, 5 岁。在体检时发现胸骨左缘第 2~3 肋间有收缩期杂音, 无其他症状。胸部 X 线检查右心房、右心室增大, 肺动脉段突出, 可见“肺门舞蹈”, 诊断应考虑为
- A. 法洛四联症  
 B. 肺动脉狭窄  
 C. 动脉导管未闭  
 D. 房间隔缺损  
 E. 室间隔缺损
27. 患儿男, 1 岁。生后未加辅食, 患儿皮肤、面色苍黄, 虚胖, 毛发稀疏细黄, 化验红细胞  $2.0 \times 10^{12}/L$ , 血红蛋白  $90 g/L$ , 患儿最可能的诊断是
- A. 生理性贫血  
 B. 婴儿感染性贫血  
 C. 营养性巨幼细胞贫血  
 D. 营养性缺铁性贫血  
 E. 营养性混合性贫血
28. 麦氏点的体表投影是
- A. 脐与右髂前上棘连线中外 1/3 交界处  
 B. 脐与右髂前上棘连线内 1/3 交界处  
 C. 脐与左髂前上棘连线中外 1/3 交界处  
 D. 脐与左髂嵴连线中外 1/3 交界处  
 E. 脐与右髂嵴连线中外 1/3 交界处
29. 新生儿颅内出血为降低颅内压可选用的药物是
- A. 地塞米松  
 B. 20% 葡萄糖  
 C. 25% 葡萄糖  
 D. 呋塞米  
 E. 大量甘露醇
30. 营养不良, 早期诊断灵敏而可靠的指标是
- A. 血清清蛋白  
 B. 血浆转铁蛋白  
 C. 血浆胰岛素样生长因子  
 D. 血浆胆固醇  
 E. 血糖
31. A/G 比值减低或倒置最常见于
- A. 严重肝损害  
 B. 肾病综合征  
 C. 慢性胃肠道疾病  
 D. 肾炎  
 E. 营养不良
32.  $\beta_2$ -受体激动剂的用药方法首选
- A. 肌注  
 B. 口服  
 C. 静脉注射

- D.吸入  
E.皮下注射
- 33.小儿补充生理需要量时液体的张力为
- A.2/3 张  
B.1/5~1/4 张  
C.等张  
D.1/3 张  
E.1/2 张
- 34.婴幼儿轻度脱水补充累积损失量应为
- A.<50 ml/kg  
B.90~120 ml/kg  
C.50~100 ml/kg  
D.150~180 ml/kg  
E.100~120 ml/kg
- 35.妊娠合并贫血的孕妇诊断缺铁性贫血的指标是
- A.血清铁<6.0 μmol/L  
B.血清铁<6.5 μmol/L  
C.血清铁<7.0 μmol/L  
D.血清铁<7.5 μmol/L  
E.血清铁<8.0 μmol/L
- 36.小儿急性上呼吸道感染继发链球菌感染用青霉素疗程应为
- A.3~5 天  
B.3~7 天  
C.5~7 天  
D.7~10 天  
E.10~14 天
- 37.婴幼儿易患呼吸道感染的免疫因素是
- A.清蛋白活性差  
B.SIgE 低  
C.SIgM 低  
D.SIgA 低  
E.SIgG 低
- 38.急阑尾炎易发生坏死穿孔的主要原因是
- A.阑尾淋巴丰富  
B.阑尾动脉是终末动脉  
C.阑尾系膜短  
D.阑尾位置多变  
E.阑尾蠕动较慢
- 39.营养性巨幼细胞贫血症状描述不正确的是
- A.颜面水肿,多虚胖  
B.烦躁不安,易怒  
C.反应迟钝,动作发育迟滞  
D.震颤甚至抽搐,共济失调  
E.易疲乏,不爱活动,头晕,耳鸣
- 40.肾上腺皮质激素治疗最有效的紫癜是
- A.皮肤紫癜  
B.关节型紫癜  
C.腹型紫癜  
D.紫癜性肾炎  
E.中枢神经系统病变
- 41.破伤风最早出现的症状是
- A.张口困难  
B.手足抽搐  
C.角弓反张  
D.苦笑面容  
E.颈项强直
- 42.肠内营养液在 4℃ 以下冰箱内放置时间为
- A.2 小时  
B.6 小时  
C.8 小时  
D.12 小时  
E.24 小时
- 43.下列不是甲状腺危象发生诱因的是
- A.放射性 131I 治疗  
B.心力衰竭  
C.口服过量的甲状腺药物  
D.感染  
E.手术中过度挤压甲状腺
- 44.系统性红斑狼疮病人应避免使用
- A.泼尼松  
B.阿司匹林  
C.环磷酰胺  
D.普鲁卡因胺  
E.磷酸氯喹
- 45.结核性脑膜炎脑脊液典型改变为



- A.糖升高氯化物下降,蛋白质量下降  
 B.糖和氯化物同时降低,蛋白质量增加  
 C.蛋白质量增加,糖和氯化物也增加  
 D.糖和氯化物正常,蛋白质量增加  
 E.糖和氯化物下降,蛋白正常
- 46.患者女性,28岁。流产2次,第2次流产后月经周期缩短,经期正常,血量不多,已4个月,经检查基础体温呈双相型,无器质性病变,应考虑为
- A.无排卵性功能失调性子宫出血  
 B.青春期功能失调性子宫出血  
 C.黄体功能不足  
 D.正常月经  
 E.子宫内膜脱落不全
- 47.患者女性,枕前位,宫口开全,胎头颅骨最低点O+3,矢状缝与出口前后径一致,宫缩40秒/(2~3)分钟,胎心100次/分钟,应进行的处理是
- A.加腹压娩出胎儿  
 B.等待自然分娩  
 C.静滴缩宫素  
 D.产钳术  
 E.剖宫产
- 48.在肝性脑病的治疗中,禁止使用的药物是
- A.安定  
 B.精氨酸  
 C.硫酸镁  
 D.西咪替丁  
 E.谷氨酸钾
- 49.尿毒症必有的临床表现是
- A.水肿  
 B.腹泻  
 C.出血  
 D.贫血  
 E.高血压
- 50.急性梗阻性化脓性胆管炎的典型症状是
- A.腹痛、黄疸、寒战高热、呕吐、昏迷  
 B.腹痛、黄疸、寒战高热、腹胀、昏迷  
 C.腹痛、黄疸、寒战高热、休克、昏迷  
 D.腹痛、寒战高热、呕吐、休克、昏迷  
 E.黄疸、寒战高热、呕吐、休克、昏迷

### 参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	D	D	B	D	D	C	B	A	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	C	A	B	D	E	A	A	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	C	E	C	A	D	C	A	D	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	D	B	A	B	E	D	B	E	C
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A	E	C	D	B	C	D	A	D	C