

2020 年初级护师考试 13 日考题汇总（网友回忆版）

17.患者开始接受自己患绝症的现实，不再怨天尤人，请求医生想尽办法治疗。属于

- A.愤怒期
- B.接受期
- C.协议期
- D.忧佛期
- E.否认期

答案：C

18.患者女，75 岁。严重车祸后意识不清。呼吸道分泌物较多给予气管切开，护士其吸痰时应避免的操作是

- A.动作轻稳，防止损伤
- B.从深部向上提拉，后右旋转
- C.次吸引不超过 15 秒
- D.根导管先吸口腔再吸气管
- E.插管时，阻断负压吸引

答案：D

20.为炎症早期患者应用冷疗法的目的是使毛细血管收缩、血流减慢从而

- A.使体内的热量通过传导而体外发散
- B.促进炎性分泌物的吸收和炎师消散
- C.降低细胞新陈代谢和微生物的活力
- D.增强细胞新陈代谢和白细胞存照力

E.通过传导和蒸发双重作用降低体温

答案：C

21.患者女，38岁。车祸后卧床，右下肢可在床上移动位置但不能抬起，评估患者右

肌力为

A.3级

B.5级

C.1级

D.4级

E.2级

答案：E

22.患者计划输液 2880ml，24 小时匀速输入，所用输液器滴系数为 15，每分钟滴速为

A.50 滴/分钟

B.40 滴/分钟

C.10 滴/分钟

D.30 滴/分钟

E.20 滴/分钟

答案：D

29.护理程序的理论框架是

A.Roy 的适应理论

B.沟通理论

C.一般系统论

D.基本需要层次论

金英杰教育

www.jinyingjie.com

E.应微与插应用 G

答案：C

31.患者女，32岁。因淋雨后发热40.1 护士给予冰袋降温。可取下冰袋的体温

A.37C 以下

B.38.5°C以下

C.39°C以下

D.38°C 以下

E.37.5°C 以下

答案：C

77.初产妇，妊娠40周临产。。。。。5小时。阴道检查：宫口开大6cm，头位。先露-1，

胎膜存。产妇目前处于

A.第三产程

B。。。。。

C.正常潜伏期

D.第二产程

E.正常活跃期

78.患者男，50岁。餐后上腹部烧灼痛2个月，黑便2日入院。对其诊断最有价值的辅助检

查是

A.胃液分析检查

B.选择性动脉造影

C.X线检查

D.胃镜检查

金英杰教育

www.jinyingjie.com

E.血常规检查

79.患者男，49岁。因近期头晕、乏力，连续3天血压160~170/95~100mmHg而院。

患者同时患有支气管哮喘。不宜使用的降压药物是

A.卡托普利

B.呋塞米

C.硝苯地平

D.阿替洛尔

E.哌唑嗪

81.下列甲状腺功能基本筛选试验时的辅助检查，不受外来碘干扰，甲亢时增高的是

A.基础代谢率(BMR)

B.促甲状腺激素释放激素(TRH)试验

C.促甲状腺激素测定(TSH)

D.血清总T₃、总T₄(TT₃, TT₄)

E.血清游离T₄(FT₄)

82.急性感染性多发性神经根神经炎患者脑脊液的典型改变是

A.蛋白细胞分离

B.氯化物减少

C.均匀血性

D.压力增高

E.糖明显增多

83.10个月女婴，高热40℃，剧咳，分泌物粘稠，不易咳出，伴喘憋、青紫。最紧急的处

理是

金英杰教育

www.jinyingjie.com

- A.吸痰
- B.鼻导管间歇给氧
- C.肌注苯巴比妥
- D.人工冬眠疗法

E.正压给氧

相关专业知识点

10.自我监测胎儿安危最适宜的方法是

- A.定期查尿妊娠试验
- B.胎动计数
- C.尿雌三醇测定
- D.胎心电子监护
- E.自测宫高和腹围

11.患者女，29岁，患支气管扩张10年，咳嗽、咳脓性痰，痰量50ml/d。下列处理不正确的是

- A.长期应用抗生素
- B.体位引流
- C.给予祛痰剂
- D.给予雾化吸入
- E.加强营养

12.患者女，60岁。子宫脱垂I度轻型，下列治疗原则正确的是

- A.增强腹压
- B.使用子宫托
- C.放射治疗
- D.加强运动
- E.手术治疗

13.开放性气胸急救处理的首要措施是

- A.胸腔穿刺术
- B.吸氧、输血、输液
- C.清创缝合术
- D.用厚敷料封闭伤口
- E.胸腔闭式引流术

14.患者女，20岁。3月前，因情绪过激后出现全身抽搐，口吐白沫，呼之不应，持续3分钟后抽搐停止，约半小时恢复意识。近期情绪不稳，反复出现2次抽搐而入院。患者每次发作抽搐约2~

4分钟，神经系统检查未见异常。为明确诊断首要的辅助检查是

- A.脑 MRI
- B.脑血流图
- C.脑 CT
- D.神经肌电图
- E.脑电图

15.导致肝硬化的因素不包括

- A.胆汁淤积
- B.丙型肝炎
- C.酒精中毒
- D.乙型肝炎
- E.甲型肝炎

16.患儿男，2岁，重度营养不良，清晨起床后突然大汗，面色苍白，体温下降，神志不清，脉搏减慢，对其进行急救处理应选择静脉推注

- A.葡萄糖
- B.甘露醇
- C.生理盐水
- D.肾上腺素
- E.葡萄糖酸钙

17.应用地西洋控制小儿惊厥的最佳给药途径是

- A.保留灌肠
- B.雾化吸入
- C.肌肉注射
- D.静脉注射
- E.静脉输液

18.慢性盆腔炎术后第1天，患者宜取的体位是

- A.侧卧位
- B.头低脚高位
- C.半卧位
- D.平卧位
- E.俯卧位

19.小儿肥胖症饮食管理中不正确的是

- A.少食多餐
- B.高糖类
- C.低脂肪
- D.不吃零食
- E.高蛋白质

20.患者女，26岁，诊断为系统性红斑狼疮，双面颊和鼻梁有紫红色蝶形红斑，表面光滑，有时可见鳞屑，皮肤护理措施不正确的是

金英杰教育

- A.禁忌日光浴
- B.保持皮肤的清洁卫生
- C.碱性肥皂水洗脸
- D.避免使用化妆品
- E.出门穿长袖衣裤

21.冠心病外科治疗必须进行的辅助检查是

- A.心脏 CT
- B.心导管检查
- C.心脏彩色 B 超
- D.心血管造影
- E.选择性冠状动脉造影

22.在临床麻醉中应用最广泛的全身麻醉方式是

- A.静脉麻醉
- B.静脉复合麻醉
- C.表面麻醉
- D.吸入麻醉
- E.椎管内麻群

23.门静脉吻合术的主要目的是

- A.降低门静脉压力
- B.改善肝功能
- C.消除脾功能亢进
- D.阻断侧支循环
- E.减少腹水形成

24.患儿 3 个月。近 2 日发生腹泻，大便每日 5~6 次，呈黄绿色稀便，内有奶瓣和泡沫，为防止患儿发生 应选择

- A.静脉补充 10%葡萄糖溶液
- B.静脉补充林格液
- C.少量多次给予米汤
- D.少量多次喂服 ORS
- E.少量多次饮温开

【答案】D

25.患者女，停经 9 周，少量阴道流血 3 天，无腹痛。子宫符合孕月，宫口未开，B 超检查：宫内妊娠。可见胎心搏动，入院后主要的治疗原则是

- A.尽快清宫
- B.间断吸氧
- C.止血补血
- D.预防感染
- E.保胎治疗

【答案】E

26.患者女, 38岁。5年前曾患过肺结核, 近3个月来常感腰背部疼痛, 时有低热、盗汗。体检:胸 11~12 棘突明显压痛。为确诊应进行的检查是

- A.血沉
- B.OT 试验
- C.X 线
- D.CT
- E.血常规

【答案】C

27.关于对 ARDS 患者的治疗原则, 不正确的叙述是

- A.加强营养支持
- B.加大补液量
- C.使用有效抗生素
- D.延长机械通气时间
- E.选用呼气末正压通气

【答案】B

28.肝性脑病患者并发上消化道出血时应避免输入的血液制品为

- A.血小板
- B.血浆
- C.白蛋白
- D.新鲜血
- E.库存血

【答案】E

29.感染性休克治疗中, 应用血管扩张药前最重要的是

- A.调整体位
- B.纠正酸碱失衡
- C.控制感染
- D.控制原发病
- E.补充血容量

【答案】E

30.患者, 男, 36岁, 严重贫血及皮肤广泛瘀斑, 最有助于确诊的检查是

- A.骨髓象
- B.B 超
- C.CT
- D.尿化验
- E.大便潜血

【答案】A

31.患者男, 48岁。因煤气中毒 6 小时后入院, 深昏迷, 休克, 尿少, 血 COHb 60%, 血压 80/50mmHg, 诊断为一氧化碳中毒。该患者的中毒类型为

金英杰教育

www.jinyingjie.com

- A.重度中毒
- B.慢性中毒
- C.原发性脑病
- D.中度中毒
- E.轻度中毒

【答案】B

32.肾病综合征的临床表现不包括

- A.高度水肿
- B.血脂低
- C.高血压
- D.高蛋白尿
- E.低蛋白血症

【答案】D

33.程度最轻的意识障是

- A.昏睡
- B.嗜睡
- C.昏迷
- D.谵妄
- E.意识模糊

【答案】E

34.患者女，经产妇，39岁。1年来月经量增多，经期持续4~14天。检查：子宫如孕3个月大小，凹凸不平，双附件无异常，血红蛋白90g/L。诊断为子宫肌瘤，恰当的处理为

- A.手术治疗
- B.随访观察
- C.中药治疗
- D.激素治疗
- E.放射治疗

【答案】A

35.乳房皮肤容易出现"橘皮样"改变的乳腺疾病是

- A.乳腺癌
- B.乳房纤维腺瘤
- C.乳房肉瘤
- D.急性乳腺炎
- E.乳房囊性增生

【答案】A

1.妊娠期糖尿病的产妇，孕期使用胰岛素者，分娩后如需继续使用，应减少胰岛素的用

量到原用量的

A.2/3

B.1/3

C.1/4

D.1/5

E.1/6

答案：B

2.大咯血患者发生窒息时，首要的护理措施是

A.给予输血

B.保持气道通畅

C.给予吸氧

D.给予止血

E.应用呼吸机

答案：B

3.下列提高妊娠率的措施中，错误的是

A.性交时避免精神紧张

B.性交后立即如厕

C.性交后适当抬高臀部

D.排卵期增加性交次数

E.注重营养，增强体质

答案：B

4.关于非特异性感染患者的健康教育，错误的是

A.保持皮肤清洁

金英杰教育

www.jinyingjie.com

- B.防止皮肤损伤
- C.处理原发病
- D.治疗相关的全身性疾病
- E.经常应用抗生素预防感染

答案：E

5.肺癌的早期表现是

- A.刺激性咳嗽，痰中带血
- B.持续性胸痛
- C.声音嘶哑
- D.Homer 征
- E.胸腔积液

答案：A

6.消化性溃疡患者出现全腹压痛、反跳痛及板样强直，应考虑

- A.食管静脉破裂
- B.癌变
- C.穿孔
- D.幽门梗阻
- E.出血

答案：C

7.阴道内大量豆腐渣样白带可见于

- A.滴虫阴道炎
- B.霉菌阴道炎

金英杰教育

www.jinyingjie.com

- C.宫颈炎
- D.老年阴道炎
- E.盆腔炎

答案：B

8.颅内高压三主征是

- A.头痛、呕吐、视神经乳头水肿
- B.呕吐、视神经乳头水肿、抽搐
- C.视神经乳头、水肿、抽搐

- D.抽搐、昏迷、头痛
- E.昏迷、头痛、呕吐

答案：A

10.正确的成人胸外心脏按压深度为

- A.3cm-4cm
- B.4cm-5cm
- C.5cm-6cm
- D.6cm-7cm
- E.7cm-8cm

答案：C

50.患儿女，3月龄。足月顺产，生后无窒息，母乳喂养。生后第3天出现黄疸至今未退，呈逐渐加重趋势，大便为灰白色，全身皮肤呈黄绿色。患儿最可能为

- A.母乳性黄疸
- B.药物性黄疸

金英杰教育

- C.慢性溶血性疾病
- D.先天性胆道闭锁
- E.乙型肝炎

答案：D

52.患者女，60岁。甲状腺肿大20年，下列与压迫邻近组织无关的症状是

- A.头面部瘀血
- B.咳粉红色泡沫痰
- C.声音嘶哑
- D.呼吸的难
- E.吞咽困难

答案：B