

2020 年国家执业医师资格考试押题密卷

第一单元

A1 型题

RXCS-U1-001.急进型肾小球肾炎 II 型最常见的检测异常是

- A.循环免疫复合物阳性
- B.血抗肾小球基底膜抗体阳性
- C.血清中性粒细胞胞浆抗体 (ANCA)阳性
- D.血单克隆免疫球蛋白升高
- E.血冷球蛋白阳性

RXCS-U1-002.使用血管紧张素转换酶抑制剂降压的患者血清肌酐水平不宜超过

- A.177 $\mu\text{mol/L}$
- B.88 $\mu\text{mol/L}$
- C.133 $\mu\text{mol/L}$
- D.221 $\mu\text{mol/L}$
- E.265 $\mu\text{mol/L}$

RXCS-U1-003.符合二尖瓣关闭不全的典型表现是

- A.右心房增大
- B.S1 增强
- C.心尖部全收缩期吹风样杂音
- D.P2 降低
- E.右心室增大

RXCS-U1-004.引起老年人继发性膜性肾病最常见的病因是

- A.系统性红斑狼疮
- B.恶性肿瘤
- C.系统性血管炎
- D.过敏性紫癜
- E.乙肝病毒相关性肾小球肾炎

RXCS-U1-005.肾盂结石 2.8 cm,肾功能正常,中度肾积水,首选的治疗方法是

- A.肾盂切开取石
- B.药物排石
- C.体外冲击波碎石
- D.多饮水密切观察
- E.经皮肾镜碎石取石

RXCS-U1-006.目前慢性阻塞性肺疾病治疗的最重要药物是

- A.支气管舒张剂
- B.吸入糖皮质激素
- C.抗氧化剂
- D.祛痰药
- E.黏液生成抑制剂

RXCS-U1-007.对于高血压合并 2 型糖尿病患者,下列药物中有利于延缓糖尿病肾病进展的是

- A.普萘洛尔
- B.吲达帕胺

- C. 缬沙坦
- D. 硝苯地平
- E. 氢氯噻嗪

RXCS-U1-008. 关节内骨折最常见的并发症是

- A. 骨折不愈合
- B. 创伤性关节炎
- C. 缺血性骨坏死
- D. 骨化性肌炎
- E. 骨折畸形愈合

RXCS-U1-009. 肾结核多来源于

- A. 骨结核
- B. 肠结核
- C. 肺结核
- D. 膀胱结核
- E. 生殖系结核

RXCS-U1-010. 心尖部收缩中晚期喀喇音提示

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 室间隔穿孔
- C. 室壁瘤形成
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 二尖瓣脱垂

RXCS-U1-011. 下述疾病最易出现Ⅱ型呼吸衰竭的是

- A. 糖尿病酮症酸中毒
- B. 慢性阻塞性肺疾病
- C. 哮喘急性发作
- D. 重症肺炎
- E. 肺血栓栓塞

RXCS-U1-012. 关于支气管哮喘的药物治疗，不正确的是

- A. 规律联合使用吸入糖皮质激素+长效 β_2 受体激动剂
- B. 规律使用吸入糖皮质激素
- C. 规律长效 β_2 受体激动剂单独治疗
- D. 按需使用短效 β_2 受体激动剂
- E. 规律使用白三烯调节剂

RXCS-U1-013. 主要表现为餐前（午、晚）低血糖的疾病是

- A. 腺垂体功能减退症
- B. 2型糖尿病
- C. 胰岛素瘤
- D. 糖原累积症
- E. 肝硬化

RXCS-U1-014. IgA 肾病最常见的临床表现为

- A. 蛋白尿
- B. 白细胞尿
- C. 血尿
- D. 水肿

E.高血压

RXCS-U1-015.提高人群肺癌筛查检出率的首选方法是

A.痰细胞学检查

B.PET-CT

C.低剂量 CT

D.高分辨 CT

E.血清肿瘤标志物

RXCS-U1-016.肾细胞癌最常见的组织病理类型是

A.乳头状肾细胞癌

B.未分类肾细胞癌

C.嫌色细胞癌

D.集合管癌

E.透明细胞癌

RXCS-U1-017.二尖瓣狭窄患者最常见的心律失常是

A.三度房室传导阻滞

B.窦性心动过缓

C.心室颤动

D.室性心动过速

E.心房颤动

RXCS-U1-018.因毛细血管通透性增加而致胸腔积液的疾病是

A.肾病综合征

B.肝硬化

C.类风湿关节炎

D.左心衰竭

E.缩窄性心包炎

RXCS-U1-019.针对我国结核病疫情，首先需要控制的是

A.活动性肺结核的高患病率

B.HIV 感染增加

C.城市人口的高感染率

D.地区患病率差异大

E.结核病患者的死亡率

RXCS-U1-020.无器质性心脏病慢性心房颤动患者静息心率的控制目标是

A.<100 次/分

B.<80 次/分

C.<60 次/分

D.<90 次/分

E.<110 次/分

RXCS-U1-021.对解剖复位要求最高的骨折是

A.胫骨平台骨折

B.肱骨干骨折

C.腓骨中段骨折

D.锁骨骨折

E.掌骨骨折

RXCS-U1-022.顽固性心力衰竭的最关键治疗是

A.寻找并纠正可能的原因

B.心脏移植

C.静脉注射强心药

D.静脉滴注血管扩张剂

E.静脉注射利尿剂

RXCS-U1-023.肱骨髁上骨折最容易出现的晚期并发症是

A.肱动脉损伤

B.肘内翻畸形

C.肘关节外翻畸形

D.尺神经损伤

E.骨折不愈合

RXCS-U1-024.下述疾病中最可能引起金黄色葡萄球菌肺脓肿的是

A.鼻窦炎

B.皮肤疖肿

C.牙周脓肿

D.食管穿孔

E.膈下脓肿

RXCS-U1-025.骨关节炎最典型的 X 线表现是

A.关节肿胀

B.关节周围骨质疏松

C.关节软骨侵蚀

D.软骨下骨软化

E.关节间隙变窄

RXCS-U1-026.最有助于诊断室性心动过速的心电图特点是

A.T 波和主波方向相反

B.心室夺获

C.QRS 波群宽大畸形

D.QRS 波群呈束支传导阻滞图形

E.PR 间期延长

RXCS-U1-027.女性尿路感染最常见的感染途径是

A.淋巴道感染

B.血行感染

C.医源性感染

D.上行感染

E.直接感染

RXCS-U1-028.不符合室性期前收缩的心电图表现是

A.提前出现的 QRS 波，主波方向与 T 波相反

B.QRS 波宽大畸形

C.代偿间歇完全

D.联律间期恒定

E.P 波与提前出现的 QRS 波群有相关性

RXCS-U1-029.主要调节甲状旁腺激素分泌的因素是

A.血 1, 25-(OH) 2-维生素 D3

B.血钙

- C.血镁
- D.降钙素
- E.血磷

RXCS-U1-030.腰椎间盘突出症与腰椎管狭窄症临床症状的主要鉴别点是

- A.有无鞍区感觉障碍
- B.间歇性跛行是否为主要特点
- C.双下肢无力的程度
- D.二便是否障碍
- E.腰痛及下肢放射痛的程度

RXCS-U1-031.以下关于尿道损伤的叙述，不正确的是

- A.阴茎部尿道损伤多见
- B.球部损伤多见于骑跨性损伤
- C.前尿道损伤多发生于球部
- D.后尿道损伤多发生于骨盆骨折
- E.医源性尿道狭窄有增多趋势

RXCS-U1-032.原发性肾小球疾病的临床分类不包括

- A.慢性肾小球肾炎
- B.肾盂肾炎
- C.急进性肾小球肾炎
- D.肾病综合征
- E.无症状性血尿或（和）蛋白尿

RXCS-U1-033.造成气流受限的病因中，最常出现肺脏弹性回缩力减弱的是

- A.弥漫性泛细支气管炎
- B.支气管扩张
- C.慢性支气管炎
- D.慢性纤维空洞性肺结核
- E.阻塞性肺气肿

RXCS-U1-034.糖尿病高渗高血糖综合征常见于

- A.2型糖尿病合并妊娠
- B.饮食控制不佳的2型糖尿病
- C.青少年2型糖尿病
- D.1型糖尿病
- E.老年2型糖尿病

RXCS-U1-035.下列细胞因子中，与慢性阻塞肺疾病慢性气道炎症发病关系最密切的是

- A.IL-4
- B.IL-10
- C.IL-5
- D.IL-8
- E.IL-13

RXCS-U1-036.下列成分可见于肾小管性蛋白尿的是

- A.补体
- B.β₂微球蛋白
- C.IgG
- D.本周蛋白

E. IgM

RXCS-U1-037. 支气管镜检查对下述疾病诊断意义不大的是

- A. 支气管肺癌
- B. 弥漫性肺泡出血
- C. 结节病
- D. 支气管扩张
- E. 肺孢子菌肺炎

RXCS-U1-038. 小剂量地塞米松抑制试验适用于

- A. 肾上腺皮质功能减退症定性
- B. 肾上腺皮质增多症定性
- C. 肾上腺皮质增多症定位
- D. 肾上腺皮质功能减退症定位
- E. 醛固酮增多症定性

RXCS-U1-039. Thomas 征阳性提示

- A. 骶髂关节炎
- B. 膝关节屈曲挛缩
- C. 腰椎间盘突出症
- D. 髋关节屈曲挛缩
- E. 腰椎管狭窄

RXCS-U1-040. 心室颤动电除颤的正确方法是

- A. 必须在心电监测下进行
- B. 不能反复多次电除颤
- C. 首先需静脉推注安定
- D. 非同步电除颤
- E. 电击能量一般 < 200 J

RXCS-U1-041. 属于支气管扩张手术治疗禁忌证的是

- A. 双下肺均存在局限性支气管扩张病变
- B. 合并反复感染
- C. 窦性心动过缓，阿托品试验 (+)
- D. 合并大咯血
- E. 合并肺心病

RXCS-U1-042. 急性肺源性心脏病最常见的病因是

- A. 重症肺结核
- B. 支气管哮喘
- C. 肺血栓栓塞
- D. 过敏性肺炎
- E. 慢性阻塞性肺疾病

A2 型题

RXCS-U1-043. 男，50 岁。胸部不适 2 个月，无咳嗽、发热。胸部 CT 示右前上纵隔肿物，直径约 3 cm，边缘光滑，上极清晰。首先考虑的诊断是

- A. 胸腺瘤
- B. 胸骨后甲状腺
- C. 支气管囊肿
- D. 食管囊肿

E.神经纤维瘤

RXCS-U1-044.女, 34 岁。全程肉眼血尿 1 天, 无血丝, 血块, 无尿频、尿急、尿痛, 无发热及腰腹疼痛, 尿沉渣镜检 RBC 满视野, WBC 4~5/HP, 尿蛋白 (++)。首先应进行的检查是

- A.膀胱镜检查
- B.清洁中断尿培养
- C.静脉肾盂造影
- D.尿相差显微镜检查
- E.同位素肾动脉扫描

RXCS-U1-045.男, 59 岁。排尿困难 2 年。2 年来排尿困难逐渐加重, 表现为尿线变细, 尿滴沥。夜尿 3~4 次。无尿痛及肉眼血尿, 直肠指检及 B 超诊断为前列腺增生, 确定排尿梗阻程度的有效检查方法是

- A.尿流率检查
- B.膀胱镜
- C.残余尿测定
- D.CT
- E.MRI

RXCS-U1-046.女, 43 岁。近 2 周来发热, 乏力, 痰中带血, 最高体温 38 °C, 经“头孢菌素”抗感染治疗 1 周无效。查体:体温 37.8 °C, 脉搏 84 次/分, 左上肺语颤减弱, 呼吸音低, 实验室检查血常规: WBC $7.8 \times 10^9/L$, N 0.73, L 0.24。ESR 43 mm/h, 胸部 X 线片示左上肺斑片状阴影, 其内可见透亮区, 该患者最可能的诊断是

- A.肺癌
- B.肺结核
- C.肺脓肿
- D.支气管扩张
- E.肺炎

RXCS-U1-047.男, 32 岁。活动后心悸、胸痛、喘息 2 月余。其兄 24 岁时猝死。查体: P 78 次/分, BP 105/75 mmHg, 双肺呼吸音清, 胸骨左缘第 4 肋间可闻及 3/6 级收缩期喷射样杂音。胸部 X 线片示心脏外形大致正常。该患者最可能的诊断是

- A.风湿性心脏瓣膜病
- B.房间隔缺损
- C.肥厚型心肌病
- D.限制型心肌病
- E.冠心病

RXCS-U1-048.男, 50 岁。车祸致下腹部受伤 2 小时。查体:T 36.8 °C, P 90 次/分, R 20 次/分, BP 140/70 mmHg, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿啰音, 心律齐, 未闻及杂音, 下腹膨隆, 有压痛, 无肌紧张, 移动性浊音阴性, 耻骨联合处压痛, 骨盆分离挤压试验阳性, 予导尿, 导尿管插入后仍未引出尿液, 导尿管尖端见血迹, 最可能的原因是

- A.导尿管阻塞
- B.导尿管插入方法不对
- C.骨盆骨折并膀胱损伤
- D.导尿管插入深度不足
- E.骨盆骨折合并尿道断裂

RXCS-U1-049.男, 19 岁。初发肾病综合征, 应用泼尼松 60 mg/d 治疗 8 周, 水肿无明显好转, 复查尿蛋白仍大于 3.5 g/d, 肾活检提示微小病变型肾病。下一步最适宜的治疗是

A.加用人血白蛋白

B.加用免疫抑制剂

C.增加泼尼松剂量

D.大剂量静脉应用免疫球蛋白

E.加用 ACEI/ARB

RXCS-U1-050.男, 24 岁。间断咳嗽 2 天。伴阵发性胸闷, 无痰, 无发热、胸痛。查体: 右下肺呼吸音稍低, 未闻及干湿性啰音, 为明确诊断, 首选的检查是

A.血 D-二聚体

B.胸部 B 超

C.胸部 X 线片

D.肺功能

E.动脉血气分析

RXCS-U1-051.男, 59 岁。活动后气短半年, 夜间憋醒 1 周。既往陈旧性心肌梗死 3 年。查体: 血压 110/80 mmHg, 双下肺可闻及少许湿性啰音, 心率 98 次/分, 心律齐。最有助于明确该患者气短原因的检查是

A.超声心动图

B.胸部 X 线片

C.动脉血气分析

D.肺功能

E.血常规

RXCS-U1-052.女, 62 岁。间断咳嗽, 咳少量白黏痰 10 年。查体: 双肺呼吸音粗, 未闻及干湿性啰音。血常规正常。胸部 X 线片示肺纹理增粗紊乱, 肺功能示 FEV1 占预计值 57%, FEV1/FVC=67%(舒张后)。该患者最可能的诊断是

A.支气管哮喘

B.特发性肺纤维化

C.支气管肺结核

D.慢性阻塞性肺疾病

E.支气管扩张

RXCS-U1-053.男, 38 岁。心悸, 多汗, 食欲亢进 2 个月。体重下降 3 kg, 大便 2 次/日, 糊状, 昨夜聚餐, 大量饮用可乐, 今晨起乏力, 下肢无法活动。查体: T 37.1 °C, P 108 次/分, R 18 次/分, BP 145/70 mmHg, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 腹软, 无压痛。双下肢肌力 1 级, 肌张力明显减弱。实验室检查: 血 K⁺2.8 mmol/L, Na⁺140 mmol/L, GLU 6.4 mmol/L。下列检查对明确病因意义最大的是

A.肾上腺皮质功能

B.甲状腺功能

C.血儿茶酚胺

D. OGTT 试验

E. 血气分析

RXCS-U1-054.女, 67 岁。劳力性呼吸困难 4 年, 加重 2 天。4 年前开始出现活动后呼吸困难, 休息状态下症状消失, 2 天前呼吸困难加重后夜间不能平卧, 高血压病史 20 年。查体: BP 160/100 mmHg, 端坐呼吸, 双肺底可闻及湿啰音, 心率 102 次/分, P2 亢进, 可闻及 S3 奔马律, 该患者不宜立即使用的药物是

A.呋塞米

B.硝酸甘油

- C. 硝普钠
- D. 吗啡
- E. 美托洛尔

RXCS-U1-055. 男, 24 岁。右股骨中段粉碎性骨折, 手术复位时彻底清除骨折碎片, 行钢板内固定。半年后骨折仍未愈合。最可能的原因是

- A. 骨折碎片清除过多
- B. 骨折处血液循环差
- C. 骨折固定不确定
- D. 未配合药物治疗
- E. 功能锻炼不够

RXCS-U1-056. 男, 38 岁。醉酒后出现发热, 咳嗽、咳脓臭痰 5 天, 右侧胸痛, 查体: T 39.2 °C, P 112 次/分, R 26 次/分, BP 130/80 mmHg, 神志清楚, 右中肺少许湿性啰音。胸部 X 线片示右中肺团块状影。可见空洞和气液平面。血 WBC $16.3 \times 10^9/L$, N 0.88, L 0.10。该患者最可能的诊断是

- A. 大叶性肺炎
- B. 肺脓肿
- C. 肺结核
- D. 肺癌
- E. 真菌性肺炎

RXCS-U1-057. 男, 59 岁。发现右侧阴囊内肿物 5 年, 逐渐增大。肿物呈球形, 表面光滑, 有囊性感, 无压痛, 触不到睾丸和附睾。透光试验阳性。B 超示液性暗区, 平卧后肿物无消失或缩小。最可能的诊断是

- A. 腹股沟斜疝
- B. 附睾炎
- C. 精索囊肿
- D. 睾丸鞘膜积液
- E. 睾丸肿瘤

RXCS-U1-058. 男, 50 岁。水肿 2 周, 少尿伴血压升高 1 周。3 周前曾有皮肤感染史。尿常规: 尿蛋白 (+), 尿沉渣镜检 RBC 20~30 个/HP, 血肌酐 $140 \mu\text{mol/L}$, 尿素 $11 \mu\text{mol/L}$, 血 C3 降低, 肾穿刺提示为毛细血管内增生性肾小球肾炎。通常该患者 C3 恢复正常的时间约为

- A. 半年
- B. 1 年
- C. 8 周
- D. 3 个月
- E. 2 周

RXCS-U1-059. 女, 62 岁。尿频、尿急、尿痛 1 天, 尿中可见血丝, 伴排尿时下腹痛, 无发热, 不宜采取的检查方法是

- A. 尿菌落计数
- B. 尿细菌培养+药物敏感试验
- C. 静脉尿路造影
- D. 膀胱镜检查
- E. 尿常规检查

RXCS-U1-060. 男, 38 岁。突发呼吸困难伴短暂意识丧失, 无咳嗽、咳痰及咳血, 既往体健。查体: BP 85/65 mmHg, 呼吸急促, 口唇发绀, 双肺可闻及少量哮鸣音, 心率 110 次/分, P2 亢

进。心电图示窦性心动过速，对明确诊断意义最大的检查是

- A. CT 肺动脉造影
- B. 动脉血气分析
- C. 胸部 X 线片
- D. 血心肌坏死标记物
- E. 血 D-二聚体

RXCS-U1-061. 男，19 岁。发热、咳嗽伴左胸痛 5 天，既往体健，查体：T 39.5 °C，左下肺叩诊呈浊音，可闻及支气管呼吸音。该患者最可能感染的病原体是

- A. 结核分枝杆菌
- B. 肺炎链球菌
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 肺炎支原体
- E. 铜绿假单胞菌

RXCS-U1-062. 女，67 岁。间断咳嗽、咳痰 15 年，心悸、气短伴双下肢水肿 3 天。心电图示胸前导联重度顺时针向转位，V1 导联呈 Rs 型，V5R/S < 1，RV1+SV5=1.5 mV 该患者最可能的诊断是

- A. 心包积液
- B. 扩张型心肌病
- C. 风湿性心脏瓣膜病
- D. 慢性肺源性心脏病
- E. 冠心病，心肌梗死

RXCS-U1-063. 女，28 岁。恶心、呕吐 1 天，诊断为急性胃炎。查体：BP 120/80 mmHg，心率 55 次/分。心电图示窦性心动过缓。该患者心动过缓的最恰当处理措施是

- A. 植入临时起搏器
- B. 口服阿托品
- C. 植入永久起搏器
- D. 静脉滴注异丙肾上腺素
- E. 治疗胃炎，继续观察

RXCS-U1-064. 男，59 岁。突发持续性胸痛 3 小时，黑矇 1 次，高血压病史 5 年，间断服用降压药物。查体：BP 85/50 mmHg，心率 35 次/分，心律齐，心电图示 II、III、aVF 导联，ST 段抬高 0.3 mV，三度房室传导阻滞。在置入临时起搏器以前，提高该患者心率的药物治疗措施是

- A. 肾上腺素静脉注射
- B. 多巴胺丁醇静脉滴注
- C. 阿托品静脉注射
- D. 去甲肾上腺素静脉滴注
- E. 异丙肾上腺素静脉滴注

RXCS-U1-065. 女，62 岁。发现右侧乳房肿块 3 个月，诊断为乳腺癌。发现血脂异常 3 年，未诊治。右乳腺癌改良根治术后第 4 天，感左小腿疼痛，左脚不能着地踏平。查体：T 37.2 °C，P 86 次/分，BP 120/80 mmHg，伤口局部无异常渗出，左小腿肿胀最可能的原因是

- A. 血栓性浅静脉炎
- B. 急性动脉栓塞
- C. 血栓闭塞性脉管炎
- D. 大隐静脉曲张

E.深静脉血栓形成

RXCS-U1-066.男, 68 岁。近 2 年反复出现发作性心悸, 伴头晕、黑矇, 查体: BP 135/65 mmHg, 心率 52 次/分, 律齐, 心脏各瓣膜听诊区未闻及杂音, 动态心电图: 窦性心律为主, 平均心率 56 次/分, R-R 长间歇 35 次/分, 最长 4.2 秒伴房室交界逸搏, 房性期前收缩, 短暂房性心动过速, 一度房室传导阻滞。最能提示该患者为病态窦房结综合征诊断的动态心电图表现是

- A. 一度房室传导阻滞
- B. R-R 长间歇 35 次/分, 最长 4.2 秒伴房室交界逸搏
- C. 窦性心律为主, 平均心率 56 次/分
- D. 房性期前收缩
- E. 短阵房性心动过速

RXCS-U1-067.男, 59 岁。外伤致右腕部疼痛、肿胀 1 小时。既往体健, 无糖尿病病史。查体: T 36.8 °C, P 70 次/分, R 18 次/分, BP 100/60 mmHg, 心肺腹未见异常, 右腕部疼痛、肿胀活动受限。X 线片检查: 桡骨下端骨皮质不连续, 对位对线良好, 并有嵌插。最恰当的治疗措施是

- A. 皮牵引
- B. 中药活血化瘀
- C. 切开复位内固定
- D. 骨牵引
- E. 手法复位外固定

RXCS-U1-068.女, 34 岁, 右前臂骨折 2 小时, 予手法复位, 管型石膏固定 5 小时后, 患者感觉右手指麻木, 肿胀, 活动不灵, 查体: 生命体征平稳, 心肺腹未见异常, 目前最恰当的处理方法

- A. 脱水
- B. 立即手术
- C. 止痛
- D. 立即松解外固定
- E. 扩血管药物治疗

RXCS-U1-069.女, 34 岁。停经, 溢乳 3 个月, 查体: 体温 36.5 °C, 脉搏 80 次/分, 呼吸 18 次/分, 血压 120/80 mmHg, 乳房挤压有少量乳白色液体未触及肿块, 余体格检查未见异常, 该患者最可能的诊断是

- A. 多囊卵巢综合征
- B. 颅咽管瘤
- C. 垂体柄损伤
- D. 早期妊娠
- E. 泌乳素瘤

RXCS-U1-070.男, 38 岁。3 个月前搬重物后出现腰痛伴右下肢麻木疼痛, 诊断为腰椎间盘突出症, 经保守治疗后症状不缓解, 反而逐渐加重。2 小时前出现大小便障碍, 查体: T 36.6 °C, P 89 次/分, BP 110/60 mmHg, 心、肺、腹未见异常, 右下肢肌力 4 级, 感觉减退, 会阴部感觉减退, 目前首选的治疗方法是

- A. 理疗按摩
- B. 激素注射
- C. 牵引治疗
- D. 急症手术

E.卧床休息

RXCS-U1-071.女, 67 岁。双下肢水肿 1 个月, 既往高血压病史 15 年, 未规范药物治疗, 查体: BP 160/100 mmHg, 双下肢轻度凹陷性水肿, 实验室检查: 血肌酐 97 mmol/L, 血钾 3.4 mmol/L,尿蛋白 (++)。应首选的降压药物是

- A.钙通道阻滞剂
- B. α 受体拮抗剂
- C.噻嗪类利尿剂
- D.血管紧张素转换酶抑制剂
- E. β 受体拮抗剂

RXCS-U1-072.男, 38 岁。反复发作肉眼血尿 8 年, 均在上呼吸道感染后 1~2 天出现。发作间期多次查尿常规示蛋白 (+~+++), 沉渣镜检 RBC 8~10 个/HP, 双下肢无水肿。尿蛋白定量 0.8 g/d, 肾功能正常。该患者临床诊断为

- A.高血压肾损害
- B.无症状性血尿和蛋白尿
- C.慢性间质性肾炎
- D.慢性肾小球肾炎
- E.肾病综合征

RXCS-U1-073.男, 38 岁。发热 2 周, 胸闷 5 天。无咳嗽、咳痰、咯血, 曾使用“头孢曲松”抗感染治疗无效。查体: T 37.8 °C, BP 140/90 mmHg, 右下肺呼吸音消失, 语音共振减弱。胸部 X 线片示右下肺大片状高密度增高影, 上缘呈外高内低弧形, 为明确诊断, 应首选的检查是

- A.支气管镜
- B.胸腔穿刺抽液
- C.胸部 CT
- D.血肿瘤标志物
- E.超声心动图

RXCS-U1-074.男, 38 岁。健康体检胸部 X 线片发现右肺上叶后段直径约 2 cm 高密度结节影, 边界欠清楚。查体: T 36.5 °C, P 72 次/分。双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音。为明确诊断应首选的检查是

- A.PET-CT
- B.肺相关肿瘤标志物
- C.支气管镜
- D.胸部 CT
- E.肺功能

RXCS-U1-075.男, 50 岁。无明显诱因出现左肩, 上臂, 前臂外侧放射痛 3 个月。既往体健。查体: T 36.6 °C, P 82 次/分, BP 110/60 mmHg, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 未闻及杂音, 腹软, 无压痛, 未触及包块, 肩关节活动正常, 上肢感觉及肌力均正常。Eaton 试验和 Spurling 试验阳性。首先考虑的诊断是

- A.冈上肌腱炎
- B.肩峰撞击综合征
- C.肩袖损伤
- D.神经根型颈椎病
- E.粘连性肩关节囊炎

RXCS-U1-076.男, 38 岁。右上肢刀割伤 3 小时, 查体 T 36.9 °C, P 102 次/分, BP 120/70 mmHg,

双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心律齐，未闻及杂音，腹软，无压痛，右手小指及环指的小指半侧感觉明显减退，手指内收障碍，损伤的神经是

- A.肌皮神经
- B.正中神经
- C.尺神经
- D.腋神经
- E.桡神经

RXCS-U1-077.男，24岁。在工厂流水线工作时，电锯切割致左手示指离断。对断指的正确的保存方法是用无菌纱布包好放置在

- A.干燥冷藏容器中
- B.酒精中
- C.福尔马林溶液中
- D.生理盐水中
- E.冰箱冷冻室中

RXCS-U1-078.男，59岁。吞咽困难半年余，进行性加重，现只能进流食，并出现胸痛及咳嗽。该患者食管X线钡剂造影检查不可能出现的影像是

- A.食管造影时气道内出现造影剂
- B.食管下段呈鸟嘴症改变，边缘光滑
- C.局部食管腔扩张
- D.部分食管腔明显狭窄
- E.食管管壁僵硬，蠕动中断

RXCS-U1-079.女，54岁。手指活动时时有弹响，最有可能的诊断是

- A.痛风
- B.风湿热
- C.狭窄性腱鞘炎
- D.骨关节炎
- E.类风湿关节炎

RXCS-U1-080.男，59岁。头痛、头晕1周，感恶心，未呕吐。既往有支气管哮喘、痛风病史。查体:BP 160/80 mmHg，心率55次/分，律齐。该患者宜首选的降压药物是

- A.氨氯地平
- B.卡维地洛
- C.维拉帕米
- D.美托洛尔
- E.氢氯噻嗪

RXCS-U1-081.男，38岁。口干、多饮、多尿3个月。查体:双唇肥厚，下颌前突，咬合困难，手脚粗大肥厚，实验室检查，空腹血糖7.2 mmol/L，TG3.0 mmol/L，尿比重1.020，最可能的诊断是

- A.糖尿病
- B.尿崩症
- C.甲状腺功能减退症
- D.高甘油三酯血症
- E.肢端肥大症

RXCS-U1-082.女，28岁。间断发热伴刺激性咳嗽3周。查体:T 37.5℃，右上肺可闻及哮鸣音。血常规正常，ESR 45 mm/h。自服“头孢菌素”及“阿奇霉素”治疗无效，胸部X线片示

上肺纹理增粗、紊乱。痰涂片抗酸染色可疑阳性，对明确诊断最有意义的处理措施是

- A. 支气管镜检查
- B. 诊断性抗结核治疗
- C. 痰分支杆菌培养
- D. 胸部 CT 检查
- E. 肺功能检查

RXCS-U1-083. 男，24 岁。发热伴心前区锐痛 3 天，3 天前出现发热，体温 38 °C 左右，伴心前区锐痛，休息后未减轻。既往体健，查体：BP 100/60 mmHg，双肺呼吸音清，心率 107 次/分，胸骨左缘第 3 肋间可闻及粗糙的双相性搔刮样声音。该患者疼痛最可能的病因是

- A. 肺癌
- B. 气胸
- C. 主动脉夹层
- D. 急性心包炎
- E. 急性心肌梗死

RXCS-U1-084. 女，67 岁。阵发性心房颤动 1 年，持续心悸 2 天，既往无高血压病史。2 小时前急诊查体：P 102 次/分，BP 110/60 mmHg，心率 130 次/分，心律绝对不齐，心音强弱不等。予以普罗帕酮静脉推注后，心悸缓解离院。1 小时前因左腹痛再次就诊，无呕吐和腹泻。尿常规正常。该患者腹痛首先考虑的病因是

- A. 肝淤血
- B. 肾结石
- C. 内脏动脉栓塞
- D. 急性下壁心肌梗死
- E. 主动脉夹层

RXCS-U1-085. 女，67 岁。发热、咳嗽 1 个月，胸闷 3 天。体温最高 38 °C，咳少量痰，近 3 天感渐进性胸闷，卧位时更明显，曾抗感染治疗效果欠佳。查体右下胸略膨隆，语音震颤减弱，叩诊实音，呼吸音消失，该患者首先考虑的诊断是

- A. 气胸
- B. 阻塞性肺炎
- C. 浸润性肺结核
- D. 肺炎支原体肺炎
- E. 结核性胸膜炎

RXCS-U1-086. 女，28 岁。劳累后心悸、气短 6 年，加重伴咳粉红色泡沫痰 1 周。查体：心界扩大，心律绝对不齐，心尖部可闻及双期杂音，超声心动图示二尖瓣重度狭窄及中度关闭不全。该患者最恰当的治疗方案是

- A. 先抗心衰治疗，择期行二尖瓣瓣膜修补术
- B. 先抗心衰治疗，择期行二尖瓣置换术
- C. 立即行二尖瓣球囊扩张术
- D. 抗心衰治疗后口服药物治疗，随访
- E. 立即行二尖瓣置换术

RXCS-U1-087. 男，75 岁。反复咳嗽、咳痰、喘憋 40 余年，加重伴发热 3 天。查体：R 24 次/分，BP 145/85 mmHg，昏睡，颈静脉怒张，双肺散在哮鸣音，双下肺可闻及湿性啰音，心率 128 次/分，双下肢轻度凹陷性水肿该患者目前应首先进行的检查是

- A. 眼底镜
- B. 肝肾功能+电解质

C.动脉血气分析

D.UCG

E.头颅 CT

RXCS-U1-088.男, 19 岁。反复镜下血尿 2 年。无水肿、高血压。尿沉渣镜检红细胞 10~20HP, 变形红细胞为主, 尿蛋白阴性, 血肌酐 70 $\mu\text{mol/L}$ 。临床应诊断为

A.无症状性血尿

B.IgA 肾病

C.慢性肾小球肾炎

D.泌尿系统肿瘤

E.急性肾小球肾炎

RXCS-U1-089.男, 50 岁。间断水肿 3 年, 加重伴乏力 1 个月。3 年来反复出现颜面和双下肢水肿, 未予诊治。1 个月来水肿加重, 查体: BP 170/85 mmHg, 双下肢中度水肿, 尿常规: 尿 RBC (-), 蛋白 (++)。血 Hb 70 g/L, SCr 865 $\mu\text{mol/L}$, K⁺6.5 mmol/L, Ca²⁺1.79 mmol/L, 全段甲状旁腺激素 (PTH)710pg/mL,需要紧急处理的临床情况是

A.血 K⁺6.5 mmol/L

B.血 Ca²⁺1.79 mmol/L

C.血 Hb 70 g/L

D.血 SCr 865 $\mu\text{mol/L}$

E.血 PTH710pg/mL

RXCS-U1-090.女,62 岁。发热,咳嗽,咳脓痰 3 天,支气管扩张病史 20 年,近年来曾因感染反复住院治疗,频繁使用广谱抗生素,查体:体温 38.5 $^{\circ}\text{C}$,左下肺可闻及湿性啰音,心率 90 次/分,律齐,患者感染的病原体最可能是

A.肺炎支原体

B.肺炎链球菌

C.铜绿假单胞菌

D.肺炎克雷伯杆菌

E.金黄色葡萄球菌

RXCS-U1-091.男, 68 岁。痰中带血 1 个月。无发热,抗菌药物治疗无效。慢性支气管炎病史 20 年。查体:右下肺呼吸音减弱。该患者应首先考虑的诊断是

A.支气管肺癌

B.支气管扩张

C.支气管哮喘

D.肺结核

E.肺血栓栓塞症

RXCS-U1-092.女, 62 岁。膀胱炎病史多年,近期反复出现肉眼血尿。膀胱镜检查可见膀胱左侧乳头状肿瘤,大小 1.5 cm \times 1 cm,有蒂,活组织病理检查为尿路上皮癌 1 级。最适宜的治疗措施是

A.放疗

B.膀胱全切除术

C.经尿道膀胱肿瘤电切术

D.开放保留膀胱手术

E.膀胱内药物灌注治疗

RXCS-U1-093.男, 59 岁。反复胸痛 3 天,劳累时发作。体息 15 分钟或含服硝酸甘油 1 分钟后可缓解,每天发作 3~5 次。既往糖尿病史 10 年。不适宜立即进行的检查是

- A.动态心电图
- B.静息心电图
- C.冠状动脉造影
- D.心电图负荷试验
- E.超声心动图

RXCS-U1-094.女, 67岁, 行冠脉介入治疗过程中突发心悸, 气短。查体: BP 80/70 mmHg, 口唇无发绀, 颈静脉怒张, 心率 90 次/分, 心律齐, 心音低钝, 奇脉, 已停止冠脉介入治疗, 还应立即采取的治疗措施

- A.皮下注射低分子肝素
- B.静脉注射毛花苷丙
- C.心包穿刺抽液
- D.呼吸机辅助呼吸
- E.静脉滴注去甲肾上腺素

RXCS-U1-095.女, 28岁。低热、干咳 2 周。胸部 X 线片示右侧中等量胸腔积液。胸腔积液检查示有核细胞总数 $1460 \times 10^6/L$, 单核细胞 0.85。给予四联抗结核药物治疗。下列对防止该患者出现胸膜肥厚最重要的措施是

- A.胸腔内注射糖皮质激素
- B.胸腔内注射抗结核药物
- C.口服糖皮质激素
- D.胸腔内注射尿激酶
- E.反复胸腔穿刺抽取胸腔积液

RXCS-U1-096.男, 24岁。因体检发现心律不齐 1 周就诊。平素无心悸和头晕, 既往体健。查体: BP 110/60 mmHg, 心界不大, 心律不齐, 可闻及早搏 2 次/分。心电图室性期前收缩。超声心动图提示心结构正常。该患者最适宜的处理措施是

- A.继续随访, 暂不予药物治疗
- B.口服 I C 类抗心律失常药物
- C.口服 β 受体拮抗剂
- D.口服 I B 类抗心律失常药物
- E.口服 III 类抗心律失常药物

RXCS-U1-097.女, 34岁。突发右下胸痛, 少量咯血 2 天, 已婚, 自然流产 2 次。查体: T 37.5 °C, P 85 次/分, 右下肺叩诊呈浊音, 呼吸音减弱, 右下肢轻度肿胀。血常规: WBC $8.8 \times 10^9/L$, Hb 124 g/L, PLT $64 \times 10^9/L$, 胸部 X 线片示右侧少量胸腔积液。该患者最可能的诊断是

- A.肺结核
- B.肺炎旁胸腔积液
- C.肺血管炎
- D.肺血栓栓塞症
- E.支气管肺癌

RXCS-U1-098.女, 67岁。5 年来出现进行性乏力、纳差, 逐渐加重, 且不能耐受饥饿。既往有肺结核病史, 查体: BP 90/60 mmHg, 肤色黑, 掌趾处明显, 双肺呼吸音清, 心率 90 次/分, 腹软, 无明显压痛。该患者的最可能诊断是

- A.肝硬化
- B.肺结核
- C.Addison 病
- D.黑棘皮病

E.Nelson 综合征

RXCS-U1-099.女, 21 岁。右大腿下端肿痛 2 个月, 查体: T 36.9 °C, P 85 次/分, R 18 次/分, BP 110/60 mmHg。双肺呼吸音清, 未闻及杂音, 腹软、无压痛, 未触及包块, 右下腿下端肿胀、压痛。X 线检查示股骨下端界限不清的骨质破坏区, 骨膜增生及放射状阴影, 最可能的诊断是

- A.骨巨细胞瘤
- B.骨髓炎
- C.骨结核
- D.骨转移瘤
- E.骨肉瘤

RXCS-U1-100.男, 38 岁。肱骨干骨折行手法复位, 夹板外固定治疗, 既往体健, 8 个月后复查 X 线片示骨折线存在, 断端有 0.3 cm 间隙, 断端骨髓腔已封闭硬化, 此时应选择的治疗是

- A.中医中药治疗
- B.改为牵引固定
- C.继续夹板固定
- D.手术植骨并内固定
- E.改为石膏外固定

RXCS-U1-101.女, 28 岁。进行性背痛半年, 下肢乏力, 食欲减退。查体:T 37.8 °C, P 90 次/分, R 18 次/分, BP 100/60 mmHg, 未见皮疹, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 未闻及杂音, 腹软, 无肌紧张, 移动性浊音阴性, 胸椎后凸, 有叩痛。X 线片示:第 6、7 胸椎间隙变窄, 椎旁软组织阴影增宽。实验室检查, 血常规: Hb 118 g/L, WBC $7.0 \times 10^9/L$, L 0.40, PLT $112 \times 10^9/L$, ESR 60 mm/h, 最可能的诊断是

- A.胸椎结核
- B.胸椎转移癌
- C.化脓性脊椎炎
- D.胸椎间盘突出症
- E.胸椎血管瘤

RXCS-U1-102.女, 43 岁。近 1 月来发热, 乏力, 气短。有先天性心脏病史。查体:T 37.2 °C, 双肺呼吸音清, 心率 100 次/分, 律齐, 胸骨左缘第 3 肋间可闻及响亮粗糙的收缩期杂音。实验室检查血 WBC $13.4 \times 10^9/L$, N 0.89, Hb 104 g/L, 尿常规沉渣镜检 RBC 5 个/HP, 该患者需首先考虑的诊断是

- A.急性肾小球肾炎
- B.急性心包炎
- C.风湿热
- D.感染性心内膜炎
- E.急性心肌炎

RXCS-U1-103.女, 28 岁。咳嗽、流涕 2 周, 心悸 2 天, 无发热及疼痛。既往体健。查体:BP 100/60 mmHg, 心界不大, 心率 10.8 次/分; 可闻及早搏 4 次/分, 心尖部可闻及 2/6 级收缩期杂音, 柔和未闻及心包摩擦音。实验室检查: 血肌钙蛋白升高。心电图示房性期前收缩。该患者最可能的诊断是

- A.病毒性心肌炎
- B.扩张型心肌病
- C.感染性心内膜炎
- D.风湿性心脏瓣膜病

E.急性心包炎

RXCS-U1-104.男, 32 岁。反复活动时气短 3 年余, 加重伴双下肢水肿 2 周, 无发热。查体: BP 100/60 mmHg, 颈静脉怒张, 双肺可闻及湿性啰音, 心界明显向两侧扩大, 心率 120 次/分, 心尖部可闻及舒张早期奔马律和 2/6 级收缩期吹风样杂音。该患者最可能的诊断是

- A.心包炎
- B.扩张型心肌病
- C.肥厚型心肌病
- D.风湿性心脏瓣膜病
- E.缺血性心肌病

RXCS-U1-105.男, 24 岁。发作性呼吸困难 2 年, 曾肺功能检查诊断:“支气管哮喘”, 控制使用吸入糖皮质激素+长效受体激动剂, 2 天来症状加重, 连续吸入短效 β_2 受体激动剂效果欠佳。此时患者应首先采取的措施是

- A.口服抗生素
- B.再次吸入糖皮质激素+长效 β_2 受体激动剂
- C.继续吸入短效受体激动剂
- D.口服糖皮质激素
- E.口服氨茶碱

RXCS-U1-106.男, 68 岁。慢性咳嗽咳痰 5 年, 近 1 年来自觉长距离行走时感气短, 体息后可好转。否认呼吸系统疾病及心脏病史。查体未见明显异常。血常规及胸部 X 线片检查大致正常。为明确诊断应首先进行的检查是

- A.UCG
- B.D-二聚体
- C.动脉血气分析
- D.胸部 CT
- E.肺功能

RXCS-U1-107.女, 67 岁。因“急性广泛前壁心肌梗死”于 4 天前入院治疗。今日患者突然喘憋, 不能平卧, 查体: BP 120/80 mmHg, 心率 107 次/分, 胸骨左缘第 3 肋间可触及震颤并可闻及粗糙的 4/6 级全收缩期杂音。该患者突发喘憋的最可能病因是

- A.乳头肌功能不全
- B.室壁瘤形成
- C.心室游离壁破裂
- D.室间隔穿孔
- E.主动脉瓣狭窄

RXCS-U1-108.男, 59 岁。发现血糖升高, 既往体健。查体: T 36.5 °C, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80 mmHg, BMI 29 kg/m², 腹型肥胖, 75g 葡萄糖耐量试验结果如下: 糖化血红蛋白 9%, ALT 86 U/L, AST 34 U/L, SCr 101 mmol/L。腹部超声提示中度脂肪肝。患者首选的降糖药物是

- A.阿卡波糖
- B.那格列奈
- C.胰岛素
- D.二甲双胍
- E.罗格列酮

A3/A4 型题

(109~111 题共用题干)

女，48岁。近一个月来出现口渴。每日饮水量约2000 mL。身高156 cm，体重70 kg。患者空腹血糖12.0 mmol/L，餐后血糖14.8 mmol/L。过去无糖尿病病史。

RXCS-U1-109. 首先给予的治疗措施

- A. 饮食+运动
- B. 磺脲类降血糖药
- C. α -葡萄糖苷酶抑制剂
- D. 双胍类降血糖药
- E. 使用胰岛素

RXCS-U1-110. 【假设信息】治疗3个月后，空腹血糖5.5 mmol/L，餐后血糖17.5 mmol/L。治疗改为

- A. 使用胰岛素
- B. 格列齐特
- C. 阿卡波糖
- D. 那格列奈
- E. 二甲双胍

RXCS-U1-111. 【假设信息】4年后该患者被发现有浸润性肺结核，降血糖治疗宜选用

- A. 增加原降血糖药剂量
- B. 改用降血糖作用更强的口服降血糖药
- C. 增加一种口服降血糖药
- D. 使用胰岛素
- E. 联合使用双胍类、磺脲类、 α -葡萄糖苷酶抑制剂

(112~113 题共用题干)

女，42岁。咳嗽，痰中带血伴右胸痛6个月，既往体健，吸烟30年，30支/天，查体：T 36.5℃，右侧肺部可闻及湿性啰音，实验室检查血WBC $8 \times 10^9/L$ ，胸部CT如下。

RXCS-U1-112. 初步诊断首先考虑

- A. 后纵隔肿瘤
- B. 浸润型肺结核
- C. 支气管扩张
- D. 大叶性肺炎
- E. 中央型肺癌

RXCS-U1-113. 为进一步明确诊断，首选的检查是

- A. 纤维支气管镜
- B. 胸腔镜
- C. PET-CT
- D. 纵隔镜
- E. 磁共振

(114~117 题共用题干)

男，19岁。咽痛、发热伴咳嗽2周，眼睑水肿伴肉眼血尿3天，查体：BP 150/100 mmHg，全身皮肤无皮疹。实验室检查：尿蛋白(++)，尿红细胞30~40/HP，管型3~5/HP，血C3降低，SCr 126 $\mu\text{mol/L}$ 。

RXCS-U1-114. 该患者最可能的诊断为

- A. 急进性肾小球肾炎
- B. 慢性肾小球肾炎

- C. 肾病综合征
- D. 急性肾小球肾炎
- E. 急性肾盂肾炎

RXCS-U1-115. 该患者最可能出现的管型是

- A. 上皮细胞管型
- B. 透明管型
- C. 红细胞管型
- D. 白细胞管型
- E. 蜡样管型

RXCS-U1-116. 该患者治疗应不包括

- A. 糖皮质激素
- B. 利尿
- C. 控制血压
- D. 休息
- E. 抗生素

RXCS-U1-117. 【假设信息】若患者 4 天后出现尿量进行性减少，肌酐进行性升高，应首先考虑进行的检查是

- A. 同位素肾动态显像
- B. 肾穿刺活检
- C. 泌尿系统 B 超
- D. 清洁中段尿培养+药敏
- E. 静脉肾盂造影

(118~119 题共用题干)

男，50 岁。车祸 2 小时急诊入院，经抢救后生命体征平稳，神志清醒。现出现下腹部疼痛，不能排尿 4 小时。查体：下腹部叩诊呈浊音，直肠指检可触及直肠前方饱满，前列腺尖端浮动感。X 线摄片显示骨盆骨折（耻骨下段断裂）。

RXCS-U1-118. 最可能的诊断是

- A. 肾损伤
- B. 前尿道损伤
- C. 输尿管损伤
- D. 后尿道损伤
- E. 膀胱破裂

RXCS-U1-119. 后期需要补充的最重要的检查是

- A. B 超
- B. 尿道造影
- C. CT
- D. 膀胱造影
- E. 静脉尿路造影

(120~121 题共用题干)

男，24 岁。阵发性心悸 3 年，突发突止，每次持续 0.5~3 小时不等，无头晕和黑朦，发作时查体：BP 120/70 mmHg，心率 180 次/分，律齐。心电图示：心率 180 次/分，QRS 波形正常。

RXCS-U1-120. 该患者最可能的诊断是

- A. 室性期前收缩
- B. 阵发性室性心动过速

- C. 窦性心动过速
- D. 心房颤动
- E. 阵发性室上性心动过速

RXCS-U1-121. 该患者心悸发作时，下列可首选的治疗是

- A. 口服 β 受体拮抗剂
- B. 静脉注射毛花苷丙
- C. 静脉注射腺苷
- D. 口服地高辛
- E. 静脉注射利多卡因

(122~124 题共用题干)

男，7岁。突发寒战，高热，右膝下方剧痛3天。查体：T 39.8℃，P 86次/分，R 25次/分，BP 110/60 mmHg。烦躁不安，右膝关节呈半屈曲状，拒动，右小腿近端皮温高，肿胀不明显，压痛阳性。

RXCS-U1-122. 最可能的诊断是

- A. 风湿性关节炎
- B. 急性血源性骨髓炎
- C. 膝关节结核
- D. 类风湿关节炎
- E. 化脓性关节炎

RXCS-U1-123. 早期确诊最可靠的是

- A. 血常规
- B. 局部分层穿刺
- C. CT
- D. X线
- E. 体格检查

RXCS-U1-124. 诊断明确后首选的处理措施

- A. 足量抗生素
- B. 物理降温
- C. 支持治疗
- D. 手术
- E. 肢体制动

(125~127 题共用题干)

女，21岁。1型糖尿病8年，平素4次胰岛素皮下注射治疗，定期查糖化血红蛋白7.5%~8%，2日前患者受凉后发热，体温37.5~38℃，因食欲不佳自行停用胰岛素，改用阿卡波糖治疗。渐出现恶心、食欲不振，呕吐少量胃内容物，尿中有异味。查体：P 102次/分，BP 90/60 mmHg，体重55 kg，轻度脱水貌，精神萎靡，实验室检查：随机血糖25.6 mmol/L，血钾4.8 mmol/L，血钠144 mmol/L，尿糖(++++)，尿酮体(+++)；动脉血气分析pH值7.25。

RXCS-U1-125. 该患者目前最佳胰岛素治疗方案是

- A. 速效胰岛素类似物持续静脉滴注，起始量11IU/小时
- B. 长效胰岛素类似物持续静脉滴注，起始量5.5IU/小时
- C. 常规人胰岛素持续静脉滴注，起始量11IU/小时
- D. 恢复4次胰岛素注射治疗，并适当增加剂量
- E. 常规人胰岛素持续静脉滴注，起始量5.5 IU/小时

RXCS-U1-126. 该患者pH值降低合理的治疗是

A. 静脉滴注 0.9%生理盐水

B. 静脉注射 5%碳酸氢钠，至血 pH 值正常

C. 静脉滴注 1.25%碳酸氢钠，至血 pH 值正常

D. 静脉滴注 1.25%碳酸氯钠，至尿酮体转阴

E. 静脉滴注 5%碳酸氢钠至尿酮体转阴

RXCS-U1-127. 患者入院后尿量约 5.0 mL/h, 复查血钾 4.0 mmol/L 关于补钾治疗应采取

A. 每 2 小时测定血钾低于 3.5 mmol/L 开始补钾

B. 开始口服补钾

C. 开始静脉补钾

D. 两次检测血钾均正常，不需要补钾

E. 观察尿量如果有进一步的增加，则补钾

(128~130 题共用题干)

男，50 岁。持续胸痛 8 小时。喘憋 2 小时入院，既往无高血压病史。查体 BP 150/70 mmHg, 端坐位，双肺可闻及少许细湿啰音，心界不大，心率 110 次/分，律齐，P2>A2。心电图示 I、aVF、V1~V6 导联 ST 段抬高 0.1~0.4 mV。可见病理性 Q 波。

RXCS-U1-128. 该患者最可能的诊断是

A. 高血压急症

B. 肥厚型心肌病

C. 急性心肌梗死

D. 急性心肌炎

E. 急性心包炎

RXCS-U1-129. 该患者的心功能分级为

A. NYHA 分级 IV 级

B. Killip 分级 III 级

C. NYHA 分级 III 级

D. Killip 分级 II 级

E. Killip 分级 I 级

RXCS-U1-130. 该患者应慎用的药物治疗为

A. 皮下注射吗啡

B. 静脉注射毛花苷丙

C. 口服阿司匹林

D. 静脉注射硝酸甘油

E. 静脉注射呋塞米

(131~132 题共用题干)

男，32 岁。支气管哮喘 20 年。喘息加重 1 周。意识恍惚 1 天来急诊。查体：T 37.5 °C，P 94 次/分。面色暗红，口唇发绀。可见胸腹矛盾运动，双肺呼吸音低，可闻及低调哮鸣音。

RXCS-U1-131. 该患者此时最可能出现的动脉血气变化

A. PaO₂ 降低、PaCO₂ 降低、pH 升高

B. PaO₂ 降低、PaCO₂ 升高、pH 降低

C. PaO₂ 降低、PaCO₂ 升高、pH 升高

D. PaO₂ 降低、PaCO₂ 升高、pH 正常

E. PaO₂ 降低、PaCO₂ 正常、pH 降低

RXCS-U1-132. 该患者首选的治疗措施是

A. 大剂量糖皮质激素静脉点滴

- B. 气管插管、机械通气
- C. β_2 受体激动剂雾化吸入
- D. 面罩吸氧
- E. 无创通气

(133~134 题共用题干)

男, 75 岁。排尿困难 3 年, 加重 2 周。直肠指检发现前列腺结节, 质地硬。血清 PSA30ng/mL。

RXCS-U1-133. 为明确诊断, 最重要的检查是

- A. 前列腺穿刺活检
- B. 前列腺 MRI
- C. 膀胱尿道镜检查
- D. 前列腺增强 CT
- E. 经直肠前列腺超声

RXCS-U1-134. 下列检查对患者病情评价意义不大的是

- A. 前列腺 MRI
- B. 泌尿系 B 超
- C. 放射性核素骨显像
- D. X 线胸片
- E. 膀胱尿道造影

(135~136 题共用题干)

男, 40 岁。痰中带血 1 个月, 乏力、头晕 1 周。实验室检查: 血钠 114 mmol/L, 补钠治疗效果欠佳。胸部 X 线片检查发现右肺门状影 4 cm×4 cm。纤维支气管镜检查示右主支气管黏膜粗糙水肿, 管腔狭窄, 黏膜活检可见肿瘤细胞。

RXCS-U1-135. 最可能的病理类型是

- A. 大细胞瘤
- B. 腺癌
- C. 类癌
- D. 小细胞癌
- E. 鳞癌

RXCS-U1-136. 对该患者首选的治疗方法是

- A. 免疫治疗
- B. 放疗
- C. 手术治疗
- D. 靶向药物治疗
- E. 化疗

B1 型题

(137~138 题共用备选答案)

- A. 膀胱结石
- B. 急性膀胱炎
- C. 膀胱肿瘤
- D. 急性肾盂肾炎
- E. 泌尿系结核

RXCS-U1-137. 男, 32 岁。慢性膀胱刺激症状伴终末血尿, 应首先考虑

RXCS-U1-138. 男, 40 岁。慢性膀胱刺激症状, 伴排尿困难及尿流中断, 改变体位后可继续排尿, 应首先考虑

(139~140 题共用备选答案)

- A.经蝶手术
- B.开颅手术
- C.长效奥曲肽
- D.放疗
- E.溴隐亭

RXCS-U1-139.巨大生长激素瘤首选的治疗方法是

RXCS-U1-140.泌乳素瘤应首选的治疗方法

(141~142 题共用备选答案)

- A.心室率不规整
- B.出现 f 波
- C.PR 间期逐渐延长, QRS 波周期性脱落
- D.刺激迷走神经后心室率明显加快伴心律不齐
- E.出现 F 波

RXCS-U1-141.提示二度 I 型房室传导阻滞的心电图表现是

RXCS-U1-142.提示心房扑动的心电图是

(143~144 题共用备选答案)

- A.肺炎链球菌
- B.病毒
- C.肺炎克雷伯杆菌
- D.肺炎支原体
- E.金黄色葡萄球菌

RXCS-U1-143.男, 24 岁。急性起病, 高热伴右胸痛, 胸部 X 线片示右肺下叶实变影, 其内可见多发气囊。其感染的病原体最可能是

RXCS-U1-144.男, 68 岁。急性起病, 高热伴呼吸衰竭。胸部 X 线示双肺弥漫毛玻璃影。其感染的病原体最可能是

(145~146 题共用备选答案)

- A.膝关节脱位
- B.髌关节脱位
- C.肘关节脱位
- D.肩关节脱位
- E.腕关节脱位

RXCS-U1-145.Hippocrates 法治疗的是

RXCS-U1-146.Allis 法治疗的是

(147~148 题共用备选答案)

- A.美托洛尔
- B.卡托普利
- C.哌唑嗪
- D.硝苯地平
- E.氢氯噻嗪

RXCS-U1-147.最易引起低钾血症的降压药是

RXCS-U1-148.最易引起干咳的降压药是

(149~150 题共用备选答案)

- A.急性间质性肾炎

- B.急性肾小管坏死
- C.肾后性急性肾衰竭
- D.急进性小球肾炎
- E.肾前性氮质血症

RXCS-U1-149.男, 32 岁。误服生鱼胆后恶心、呕吐、腹痛, 腹泻伴少尿, 尿比重 1.009, 尿钠 45 mmol/L, SCr 225 $\mu\text{mol/L}$, BUN 8.97 $\mu\text{mol/L}$ 。少尿最主要的原因是

RXCS-U1-150.男, 59 岁。慢性充血性心力衰竭患者, 上呼吸道感染后喘憋加重, 尿量减少, 尿比重 1.020,尿钠 18.6 mmol/L,SCr 256 $\mu\text{mol/L}$, 少尿最主要的原因是

第二单元

A1 型题

RXCS-U2-001.具有缓解肠胃痉挛作用的自主神经递质受体阻断剂是

- A.阿替洛尔
- B.阿托品
- C.酚妥拉明
- D.育亨宾
- E.筒箭毒碱

RXCS-U2-002.《精神卫生法》规定承担精神障碍患者再次诊断的精神科执业医师人数是

- A.5 人
- B.2 人
- C.4 人
- D.1 人
- E.3 人

RXCS-U2-003.医务人员特别是护理人员最常见的安全事件是

- A.化学伤害
- B.锐器伤
- C.生物伤害
- D.电离辐射
- E.中毒

RXCS-U2-004.在生产过程中形成的呼吸性粉尘是指

- A.能随呼吸进入人体并沉积于呼吸道的粉尘
- B.分散度较小的粉尘
- C.直径小于 5 μm 的粉尘
- D.分散度较大的粉尘
- E.直径小于 15 μm 的粉尘

RXCS-U2-005.不属于地塞米松药理作用的是

- A.刺激骨髓造血功能
- B.抑制毛细血管和成纤维细胞增生
- C.增强机体对细胞内毒素的耐受力
- D.抑制体内环氧化酶
- E.稳定溶酶体膜

RXCS-U2-006.反复输血的个体进行实体器官移植时容易发生的现象是

- A.异种移植排斥反应
- B.慢性排斥反应

C.超急性排斥反应

D.自体移植排斥

E.急性排斥反应

RXCS-U2-007.急性弥漫性增生性肾小球肾炎中增生的主要细胞是

A.肾小球周围的成纤维细胞及系膜细胞

B.肾球囊壁层上皮细胞及毛细血管内皮细胞

C.肾小球毛细血管内皮细胞及系膜细胞

D.肾球囊脏层上皮细胞及系膜细胞

E.肾球囊脏层上皮细胞及壁层上皮细胞

RXCS-U2-008.肿瘤细胞被细胞毒性 T 细胞杀伤的关键条件是

A.表达黏附分子

B.表达 MHC I 类分子

C.表达 CD 分子

D.分泌细胞因子

E.表达 MHC II 类分子

RXCS-U2-009.卫生服务反应性中的“对人的尊重”包括

A.尊严、自主性和保密性

B.尊严、及时性和社会支持

C.社会支持、及时性和保密性

D.社会支持、自主性和保密性

E.自主性、保密性和及时性

RXCS-U2-010.两样本均数比较的 t 检验，差别有统计学意义时，P 越小，说明

A.两总体均数的差别不大

B.两总体均数的差别越大

C.越有理由认为两总体均数的差别很大

D.越有理由认为两样本均数不同

E.越有理由认为两总体均数不同

RXCS-U2-011.糖尿病一般不会出现血管病变是

A.玻璃样变性

B.淀粉样变性

C.纤维素样坏死

D.纤维化

E.钙化

RXCS-U2-012.成熟红细胞利用葡萄糖的主要代谢途径是

A.磷酸戊糖途径

B.无氧酵解

C.有氧氧化

D.三羧酸循环

E.糖原分解

RXCS-U2-013.不引起肉芽肿性炎的病原体是

A.结核杆菌

B.痢疾杆菌

C.麻风杆菌

D.梅毒螺旋体

E. 伤寒杆菌

RXCS-U2-014. 与血浆凝固酶阴性葡萄球菌无关的疾病是

A. 食物中毒

B. 败血症

C. 股骨头置换术后感染

D. 急性膀胱炎

E. 细菌性心内膜炎

RXCS-U2-015. 属于酪氨酸衍生物的物质是

A. 组胺

B. 精胺

C. 腐胺

D. 5-羟色胺

E. 多巴胺

RXCS-U2-016. 青霉素 G 的主要不良反应是

A. 肾损害

B. 过敏

C. 听力减退

D. 肝损害

E. 胃肠道反应

RXCS-U2-017. 根据《放射治疗管理规定》，非特殊需要，不得对受孕一定时间的育龄妇女进行下腹部放射影像检查。该时间段是

A. 受孕后 28~34 周

B. 受孕后 34~36 周

C. 受孕后 8~15 周

D. 受孕后 36~38 周

E. 受孕后 16~28 周

RXCS-U2-018. 我国社区卫生服务体系建设内容不包括

A. 坚持公益性质，完善社区卫生服务功能

B. 建设大型综合性医院

C. 加强社区卫生服务队伍建设与完善社区卫生服务运行机制

D. 建立社区卫生服务机构与预防保健机构，医院合理的分工协作关系

E. 坚持政府主导、鼓励社会参与，建立健全社会卫生服务网络

RXCS-U2-019. 医疗机构为预防传染病院内传播应承担的职责是

A. 实施传染病预防控制规划

B. 收集和分析传染病疫情信息

C. 对传染病预防工作进行指导

D. 流行病学调查

E. 医疗废物处理

RXCS-U2-020. 对于大多数在小学里学习成绩中等的孩子而言，可以判断其智力水平处于正常范围，这一心理健康判断的角度为

A. 文化学角度

B. 社会学角度

C. 人类学角度

D. 统计学角度

E.病理学角度

RXCS-U2-021.帕金森病的主要发病原因是

- A.黑质-纹状体多巴胺通路受损
- B.纹状体受损
- C.丘脑基底核受损
- D.大脑皮层-纹状体回路受损
- E.大脑皮层运动区受损

RXCS-U2-022.对收受药品生产经营企业或其代理人财务且情节严重的医师，卫生计生行政部门应当作出的处理是

- A.注销执业证书
- B.暂停执业活动
- C.吊销执业证书
- D.记过
- E.警告

RXCS-U2-023.不属于氯丙嗪临床应用的选项是

- A.精神分裂症
- B.感染中毒性精神病
- C.顽固性呃逆
- D.洋地黄引起的呕吐
- E.前庭刺激所致晕动症

RXCS-U2-024.患者表现平静，客观面对患病现实，关注自身疾病，遵行医嘱所体现的患者角色行为类型

- A.角色行为冲突
- B.角色行为减退
- C.角色行为异常
- D.角色行为缺如
- E.角色行为适应

RXCS-U2-025.医学人道观的基本内容不包括

- A.尊重患者的平等医疗保健权
- B.消除或减轻影响患者健康的危险因素
- C.对患者尽量使用高新技术
- D.尊重患者的人格
- E.尊重患者的生命

RXCS-U2-026.根据心身疾病的定义，以下不属于心身疾病的是

- A.原发性高血压
- B.腹股沟斜疝
- C.神经性皮炎
- D.消化性溃疡
- E.支气管哮喘

RXCS-U2-027.医学伦理学中尊重原则所涵盖的权利不包括

- A.自主选择权
- B.社会免责权
- C.个人隐私权
- D.知情同意权

E.人格尊严权

RXCS-U2-028.原发性高血压时细动脉可逆性病理改变是

- A.血管壁平滑肌萎缩
- B.血管纤维化
- C.血管痉挛
- D.内膜下蛋白性物质沉积
- E.血管腔狭窄

RXCS-U2-029.属于第二级预防措施的是

- A.遗传咨询
- B.疾病筛检
- C.病后康复
- D.健康促进
- E.疫苗接种

RXCS-U2-030.医学心理学对于健康和疾病的基本观点不包括

- A.认知评价的观点
- B.个性特征作用的观点
- C.情绪因素作用的观点
- D.被动适应的观点
- E.心身统一的观点

RXCS-U2-031.构成传染病流行过程的必备因素有

- A.宿主，环境，病因
- B.传染源，传播途径，易感人群
- C.寄生虫，中间宿主，终末宿主
- D.社会因素，自然因素，遗传因素
- E.病原体及机体

RXCS-U2-032.“水平膳食宝塔”提示，每日每人大豆类摄入量相当于干豆 50 g,其目的主要是

- A.保证膳食纤维摄入
- B.保证水和糖的摄入
- C.提高必需脂肪酸摄入水平
- D.提高膳食蛋白质质量
- E.补充人体必需氨基酸

RXCS-U2-033.确定食物中毒的可疑食物主要是根据

- A.在同一场所同一时间未发病者未进食的食物
- B.潜伏期最短者
- C.病人的潜伏期特有的中毒症状
- D.病人的潜伏期呕吐物和排泄物
- E.发病者的临床症状

RXCS-U2-034.有关生物转化作用的描述，错误的是

- A.有些物质经过生物转化毒性增强
- B.肝是进行生物转化最重要的器官
- C.使非极性物质的极性增强
- D.作用的实质是裂解生物活性物质
- E.使疏水性物质水溶性增加

RXCS-U2-035.当样本含量固定时，第一类错误 α 和第二类错误 β 的关系有

- A. α 愈大, β 可能愈大
- B. $\alpha > \beta$
- C. $\alpha < \beta$
- D. α 愈大, β 可能愈小
- E. $\alpha = \beta$

RXCS-U2-036. 下列关于酶促反应调节的叙述, 正确的是

- A. 温度越高反应速度越快
- B. 反应速度不受底物质浓度的影响
- C. 底物饱和时, 反应速度随酶浓度增加而增加
- D. 在最适 pH 下, 反应速度不受酶浓度影响
- E. 反应速度不受酶浓度的影响

RXCS-U2-037. 不属于 HIV 传播途径的是

- A. 母婴传播
- B. 性接触
- C. 器官移植
- D. 呼吸道传播
- E. 输血

RXCS-U2-038. 肺癌最常见的转移部位是

- A. 脾
- B. 脑
- C. 肠
- D. 胃
- E. 肾

RXCS-U2-039. 医疗机构保存住院病历的最低期限是

- A. 30 年
- B. 15 年
- C. 20 年
- D. 50 年
- E. 10 年

RXCS-U2-040. 实施主动安乐死的首要社会条件是

- A. 家属的主动要求
- B. 安乐死的合法化
- C. 患者的主动要求
- D. 能够减轻患者的痛苦
- E. 维护患者的尊严

RXCS-U2-041. 对儿童进行乙型肝炎疫苗接种的临床试验研究, 为评价其流行病学预防效果, 最好选用的指标是

- A. 发病率
- B. 效果指数
- C. 感染率
- D. 死亡率
- E. 病死率

RXCS-U2-042. 用阈下刺激即可诱发心肌细胞产生期前收缩的兴奋性周期时相是

- A. 绝对不应期

B.相对不用期

C.低常期

D.局部反应期

E.超常期

RXCS-U2-043.不属于血栓结局描述的是

A.溶解

B.钙化

C.软化

D.机化

E.硬化

RXCS-U2-044.医师在诊疗活动中，不过度医疗所体现医师行为规范是

A.规范行医

B.严格权限

C.救死扶伤

D.重视人文

E.规范文书

RXCS-U2-045.属于工作相关疾病的是

A.职业性肿瘤

B.职业有关抑郁症

C.职业性铅中毒

D.职业性苯中毒

E.工伤

RXCS-U2-046.卫生计生行政部门可以责令发生医疗事故的医务人员暂停执业活动的期限是

A.1个月以上3个月以下

B.6个月以上1年以下

C.1年以上3年以下

D.3个月以上6个月以下

E.1年以上18个月以下

RXCS-U2-047.属于人际水平的健康行为改变理论的是

A.健康信念模式

B.社会认知理论

C.“知-信-行”理论

D.创新扩散理论

E.社会组织理论

RXCS-U2-048.衰老红细胞难以通过微小血管和孔隙的主要原因是

A.渗透脆性增加

B.细胞体积增大

C.悬浮稳定性下降

D.血红蛋白减少

E.变形能力减退

RXCS-U2-049.不适合接受心理治疗的疾病是

A.焦虑症

B.恐惧症

C.精神分裂症急性发作

D.强迫症

E.创伤后应激障碍

RXCS-U2-050.维系蛋白质二级结构稳定的主要化学键是

A.盐键

B.氢键

C.疏水作用

D.肽键

E.二硫键

RXCS-U2-051.人体试验道德的首要原则是

A.医学目的原则

B.随机对照原则

C.信息公开原则

D.知情同意原则

E.维护受试者利益原则

RXCS-U2-052.不属于体内甘油酯类正常生理功能的是

A.保持体温

B.传递电子

C.参与维生素吸收

D.构成生物膜

E.参与信息传递

RXCS-U2-053.筛检的目的是

A.对可疑病人进行确诊

B.评价筛检试验的敏感度

C.验证病因

D.评价筛检试验的特异度

E.从表面健康的人群中查出某病的可疑患者或某病的高危人群

RXCS-U2-054.依照我国《人体器官移植条例》，下列可以为其直系亲属捐献肾脏的是

A.27 周岁的未婚男性

B.35 周岁的严重智力低下患者

C.17 周岁的健康中学生

D.25 周岁的乙肝患者

E.22 周岁的精神病患者

RXCS-U2-055.关于真核生物 mRNA 结构的描述，错误的是

A.5'-端留有特殊的内含子

B.3'-端有特殊的“尾”结构

C.3'-端存在非翻译序列

D.5'-端有特殊“帽子”结构

E.含有开放阅读框架区

RXCS-U2-056.人的社会性需要不包括

A.劳动

B.求知

C.饮食

D.交往

E.尊重

RXCS-U2-057.具有麻醉药品处方权的执业医师被追究法律责任的情形是

- A.未按照规定进行麻醉药品处方专册登记
- B.未按照规定保存麻醉药品专用处方
- C.未按照规定储存麻醉药物
- D.紧急借用麻醉药品后未备案
- E.未依照临床应用指导原则使用麻醉药品

RXCS-U2-058.食物蛋白质的营养互补作用是

- A.蛋白质的营养价值与脂肪酸的作用互补
- B.营养必需氨基酸与营养必需微量元素的互补
- C.营养必需氨基酸之间的互相补充
- D.营养必需氨基酸和非营养必需氨基酸互补
- E.营养物质与非营养物质的互补

RXCS-U2-059.疾病的三间分布是指

- A.国家、地区和城乡分布
- B.职业、家庭和环境分布
- C.短期波动、季节性和周期性分布
- D.年龄、性别和种族分布
- E.时间、地区 and 人群分布

RXCS-U2-060.在环境卫生评价中,剂量-反应关系是指

- A.随暴露量增加引起个体效应严重程度不同的规律
- B.不同的暴露引起不同疾病的规律
- C.人群健康效应谱发生的规律性变化
- D.暴露人群分布变化的规律
- E.人群发病率随暴露因素的剂量增加而呈规律性变化

RXCS-U2-061.不属于免疫缺陷病的疾病是

- A.X-连锁慢性肉芽肿病
- B.艾滋病
- C.遗传性血管神经性水肿
- D.系统性红斑狼疮
- E.X-连锁无丙种球蛋白血症

RXCS-U2-062.母婴保健工作人员出具虚假医学证明,即使未造成严重后果,仍应承担一定的法律责任。该法律责任是

- A.暂停执业
- B.行政处分
- C.吊销执业证书
- D.通报批评
- E.注销执业注册

RXCS-U2-063.原发性肺结核和继发性肺结核病均可见的病理类型是

- A.慢性纤维空洞型肺结核
- B.浸润性肺结核
- C.结核球
- D.局灶性肺结核
- E.粟粒性肺结核

RXCS-U2-064.临床上用于判断肺通气功能的较好指标是

A.补吸气量/用力肺活量

B.潮气量/肺活量

C.无效腔量/潮气量

D.用力呼吸量/用力肺活量

E.潮气量/功能余气量

RXCS-U2-065.在健康信念模式中，促进个体行为改变的关键事件和暗示称为

A.对疾病易感性的认识

B.自我效能

C.行为能力

D.对疾病严重性的认识

E.行为线索

RXCS-U2-066.参与构成视觉细胞内感光物质的维生素是

A.维生素 D

B.维生素 A

C.维生素 B2

D.维生素 B

E.维生素 C

RXCS-U2-067.在线粒体中进行的代谢过程是

A.脂肪酸合成

B.糖酵解

C.糖原合成

D.氧化磷酸化

E.核糖体循环

RXCS-U2-068.与黏膜免疫应答密切相关的免疫球蛋白是

A.IgG

B.IgA

C.IgE

D.IgD

E.IgM

RXCS-U2-069.可通过非特异性方式杀伤病毒感染细胞的免疫细胞是

A.中性粒细胞

B.T 细胞

C.B 细胞

D.肥大细胞

E.NK 细胞

RXCS-U2-070.某心理治疗师婉拒治疗的患者请吃饭的邀请，其遵循的原则是

A.保密原则

B.真诚原则

C.关系限定原则

D.回避原则

E.客观中立原则

RXCS-U2-071.由于 V2 受体缺陷引起的肾性尿崩症，其相关的水孔蛋白是

A.AQP-4

B.AQP-1

C.AQP-2

D.AQP-5

E.AQP-3

RXCS-U2-072.疾病检测最重要的目的是

- A.向卫生行政部门报告某人群中某病的流行状况
- B.及时掌握疾病的变化趋势，采取控制措施
- C.收集和分析健康资料
- D.消灭传染源
- E.确定致病因素

RXCS-U2-073.按照临床诊疗道德的最优化原则，医务人员不需要考虑的是

- A.患者的地位
- B.医疗安全
- C.医疗效果
- D.医疗费用
- E.患者的痛苦

RXCS-U2-074.最容易发生变异的呼吸道病毒是

- A.甲型流感病毒
- B.副流感病毒
- C.麻疹病毒
- D.腮腺炎病毒
- E.呼吸道合胞体病毒

RXCS-U2-075.最有可能引起副肿瘤综合征的肺癌类型是

- A.小细胞癌
- B.鳞状细胞癌
- C.腺鳞癌
- D.肉瘤样癌
- E.乳头状腺癌

RXCS-U2-076.与排卵后基础体温升高有关的激素是

- A.卵泡雌激素
- B.缩宫素
- C.雌激素
- D.黄体生成素
- E.孕激素

A2 型题

RXCS-U2-077.男，72岁。乏力，走路不稳3个月。查体：肌张力减低，共济失调，意向性震颤，指鼻试验阳性，该患者最可能的病变部位是

- A.小脑
- B.皮层运动区
- C.脑干
- D.基底神经节
- E.脊髓

RXCS-U2-078.男，40岁。上腹部不适伴纳差1个月，既往体健。胃镜检查结果为黏膜相关样组织淋巴瘤。与该病发生密切相关的病原体是

- A.军团菌

- B. 粪肠球菌
- C. 幽门螺杆菌
- D. 产气肠杆菌
- E. 大肠埃希菌

RXCS-U2-079. 若用统计图直观地表示某城市在 8 年中肝炎的病发率随时间的变化情况, 宜选择

- A. 圆图
- B. 直条图
- C. 普通线图
- D. 直方图
- E. 散点图

RXCS-U2-080. 男, 41 岁。腹泻 1 天, 1 天前进食海产品后出现腹泻, 大便 30 余次, 为米泔样便。查体: P 110 次/分, BP 80/50 mmHg, 皮肤干皱, 弹性稍差, 眼窝凹陷。血常规: Hb 162 g/L, WBC $13.7 \times 10^9/L$, N 0.85, PLT $142 \times 10^9/L$ 。该患者腹泻的发病机制是

- A. 肠黏膜细胞内 cAMP 水平升高, 过度分泌及电解质
- B. 胆汁分泌减少引起肠胃功能紊乱
- C. 主要由于结肠、乙状结肠管麻痹
- D. 主要由于脏器的实质性损害
- E. 与致病菌引起的侵袭性病变有关

RXCS-U2-081. 男, 18 岁。因终末肾脏病行肾脏移植手术, 其母亲为其供肾者, 这种移植类型是

- A. 同基因移植
- B. 同种异体移植
- C. 异种移植
- D. 同系移植
- E. 自体移植

RXCS-U2-082. 女, 37 岁。因阵发性室上性心动过速行射频消融治疗, 术后患者突然出现胸闷、烦躁、呼吸困难。查体: BP 80/70 mmHg, 颈静脉怒张, 两肺呼吸音清, 心界向两侧扩大。心率 120 次/分, 律齐。各瓣膜听诊区未闻及杂音, 奇脉 (+)。导致其临床表现的机制是

- A. 心排血量增加, 静脉压升高
- B. 心排血量不变, 静脉压升高
- C. 心排血量下降, 静脉压降低
- D. 心排血量增加, 静脉压降低
- E. 心排血量下降, 静脉压升高

RXCS-U2-083. 某糖尿病患者为了控制血糖, 在医生的建议下准备和营养师一起定制一份饮食计划。她虽然知道饮食控制的好处, 但总认为无法管住自己, 计划难以实施。对于这样患者的干预重点是

- A. 提高自我效能
- B. 培养行为能力
- C. 提高结果预期
- D. 提供社会支持
- E. 建立支持性环境

RXCS-U2-084. 一位服用了 60 多片安定的精神病患者被送到医院急救, 患者父母表示无力承担抢救费用。按照急救伦理的要求, 医生应该选择的处理措施是

- A.在征得患者父母同意和医院领导同意的情况下，迅速实施抢救
B.在征得患者父母同意的情况下，放弃治疗
C.放弃治疗，让患者父母将其接回家
D.向民政部门反映，争取社会支持，并由他们决定是否抢救
E.仅给予患者家庭能够承受费用的支持疗法

RXCS-U2-085.男，40岁。右下肢肿胀，剧痛3小时。1天前用粪便在农田施肥时，右足被扎伤，半夜感胀裂样痛，症状加重，出现下肢肿胀，皮肤由紫红变成黑紫、水肿有水泡。查体：局部皮下有捻发音，伤口处有恶臭的血性浆液渗出。最可能的致病菌是

- A.乙型溶血性链球菌
B.大肠埃希菌
C.表皮葡萄球菌
D.梭状芽胞杆菌
E.结核杆菌

RXCS-U2-086.主治医师邱某经过抗菌药物临床应用知识和规范管理培训并考核合格后，被授予限制使用级抗菌药物处方权。但不久，邱某因违反《抗菌药物临床应用管理办法》的相关规定，受到医院警告并限制其上述处方权。医院处理邱某的依据是

- A.多次使用非限制使用级抗菌药物
B.使用价格相对较高的抗菌药物
C.在紧急情况下越级使用抗菌药物
D.无正当理由开具抗菌药物超常处方3次以上
E.在门诊使用限制使用级抗菌药物

RXCS-U2-087.已知某省山区、丘陵、湖区婴幼儿体格发育有较大的差异，现需制定该省婴幼儿体格发育有关指标的参考值范围，抽样方法最好采取

- A.分层抽样
B.整群抽样
C.系统抽样
D.机械抽样
E.单纯随机抽样

RXCS-U2-088.女，43岁。发热、咳嗽、少量脓痰2周，既往健康。查体未见明显异常。血常规大致正常，ESR 45 mm/h，胸部X线片示右上肺渗出性病変伴不规则空洞，无液平。为明确诊断，宜首选的检查是

- A.痰细菌培养+药敏
B.经支气管镜肺活检
C.痰涂片抗酸染色
D.痰涂片革兰染色
E.PPD皮试

RXCS-U2-089.某煤矿职工医院欲探讨二、三期矽肺患者胸部平片阴影密度级别（+、++、+++、++++）间是否不同，可选择

- A.线性回归
B.成组设计比较的秩和检验
C.直线相关
D.两样本t检查
E.四个表X²检查

RXCS-U2-090.某人因病住院20天，治疗费用共53000元，结算费用时被告知其中50000元

以下的部分由医保支付，另外 3 000 元需个人支付，该案例中的 50 000 是

- A.起付线
- B.封顶线
- C.自付线
- D.共同付费
- E.封底线

RXCS-U2-091.女，70 岁。冠心病、高血压、糖尿病患者。近 1 个月调整用药为阿司匹林、比索洛尔、辛伐他汀、二甲双胍。近 3 天双下肢无力及疼痛，双侧足背动脉搏动一致。实验室检查：血 CK 2 200 U/L,cTn 10.01ng/mL,血肌酐 368 μ mol/L。出现双下肢无力及疼痛的最可能原因是

- A.糖尿病足
- B.主动脉夹层
- C.间歇性跛行
- D.横纹肌溶解
- E.腰椎间盘突出症

RXCS-U2-092.女，50 岁。右乳头皮肤脱屑、结痂半年。去除痂皮可见糜烂样创面，刮片细胞学检查，可见大而异型、胞质透明的肿瘤细胞。这种细胞为

- A.镜影细胞
- B.L&H 型细胞
- C.陷窝细胞
- D. Paget 细胞
- E.多核瘤巨细胞

RXCS-U2-093.男，45 岁。右利手。因头痛和言语障碍 6 月余就诊。头颅 MRI 显示左侧中央前回底部前方有占位性病变，脑膜瘤可能性大。该患者的言语障碍最可能是

- A.失写
- B.失读
- C.感觉性失语
- D.传导性失语
- E.运动性失语

RXCS-U2-094.男，75 岁。慢性阻塞性肺疾病急性加重重复出现，抗感染治疗时，为杀灭铜绿假单胞菌，下列抗菌药物首选的是

- A.莫西沙星
- B.阿米卡星
- C.头孢他啶
- D.阿奇霉素
- E.阿莫西林

RXCS-U2-095.糖尿病患者，女，65 岁。家庭主妇，初中文化程度。医生给予的饮食建议，容易理解和执行的说法是

- A. “您每天摄入热量不能超过 1 200 千卡。”
- B. “您必须严格控制饮食，要低盐、低脂、低糖饮食。”
- C. “每顿饭主食 2 两，少吃油腻的。”
- D. “不吃甜食、稀饭、甘蔗、西瓜、甜饮料、少吃肉、油。可吃点粗粮。”
- E. “您一定要管住自己的嘴，原来爱吃的都不能吃了。”

RXCS-U2-096.男，16 岁。阵发性心悸 1 年余，突发突止发作期间心电图正常，10 分钟前再

次发作，心电图示快速、规则的 QRS 波群，形态正常，未见明显 P 波。急诊医师在患者右胸锁乳突突然按摩，心率恢复正常，该治疗手法的作用机制是

- A. 减弱心迷走神经紧张
- B. 加强心迷走神经冲动
- C. 加强心交感神经冲动
- D. 减弱心交感神经冲动
- E. 兴奋颈动脉体

RXCS-U2-097. 小李，男，25 岁。硕士研究生毕业参加工作。半年来对上级领导布置的任务总感觉不能胜任，屡屡出错，受到多次批评后内心受挫，选择了辞职。小李的这种选择在应激反应属于

- A. 认知反应
- B. 生理反应
- C. 情绪反应
- D. 行为反应
- E. 防御反应

RXCS-U2-098. 某医师为评价某新药对流感的治疗效果，共收治了 100 例流感病人，一周后治愈的有 90 例，由此认为该新药对流感疗效显著，针对此实验，正确的观点是

- A. 结论正确，因为治愈率达 90%
- B. 结论不能肯定，因为未作重复试验
- C. 结论不能肯定，因为未设对照组
- D. 结论不能肯定，因为未作统计学处理
- E. 结论不能肯定，因为实验样本含量较少

RXCS-U2-099. 男，70 岁。上腹痛 1 年，进食后加重，大便 10 次/天，可见脂肪滴。查体：上腹中部压痛 (+)。腹部 B 超：胰腺多发钙化灶。该患者应选用的药物是

- A. 钙通道阻滞剂
- B. 质子泵抑制剂
- C. 抗胆碱药物
- D. 胰酶制剂
- E. H₂ 受体拮抗剂

RXCS-U2-100. 男，30 岁。患再生障碍性贫血 3 年由于贫血严重予以输血治疗，在输血开始后 10 分钟患者突发寒战、发热、腰背痛、恶心、呕吐、心悸、呼吸困难、烦躁不安、无尿，急查血浆游离血红蛋白增高，该患者发生的不良反应，所属超敏反应的类型是

- A. III 型
- B. IV 型
- C. 不能定型
- D. II 型
- E. I 型

RXCS-U2-101. 男，72 岁。反酸，烧心 36 年。呼吸困难，乏力 2 个月。间断口服质子泵抑制剂治疗，起初有效，近 2 个月效果不佳。胃镜检查示：食管下段及贲门区隆起溃疡性病变，质脆、易出血。最有可能的活组织检查为

- A. 淋巴瘤
- B. 神经内分泌肿瘤
- C. 胃肠间质瘤
- D. 鳞癌

E.腺癌

RXCS-U2-102.男, 48 岁。右季肋区疼痛 3 月。既往乙型病毒性肝炎病史 10 年。B 超检验见肝右叶巨大肿块。血 AFP 增高。符合该肿瘤病理学特点的是

- A.肿瘤组织间质较多
- B.癌细胞呈腺管状排列
- C.癌细胞分泌黏液且血管少
- D.癌细胞与肝细胞类似
- E.发生于肝内胆管上皮最多见

RXCS-U2-103.男, 55 岁。反复活动时胸痛, 快步行走及上楼梯可诱发, 休息可缓解。冠状动脉造影见前降支阻塞 80%, 血管病变的始动环节是

- A.内皮下复合糖类沉积
- B.内皮下钙质沉积
- C.内皮下纤维沉积
- D.内皮细胞受损及功能失调
- E.内皮下脂质沉积

RXCS-U2-104.某心外科医生在实施一例先天性心脏病手术之前的晚上, 在自己脑海中反复想象手术过程, 路径以及手术以外的应对措施等。这种思维方式是

- A.聚合思维
- B.形象思维
- C.发散思维
- D.抽象思维
- E.创造思维

RXCS-U2-105.某医师从医院辞职到一家药品生产企业从事营销工作。后因事业不顺, 想重回医院工作, 但因其中止医师执业活动已满法定期限被卫生行政部门注销注册。该法定期限是

- A.2 年
- B.3 年
- C.4 年
- D.1 年
- E.6 个月

RXCS-U2-106.男, 33 岁。消化性溃疡反复发作并出血 3 年, 再出血 1 周, 内科治疗无效, 行手术治疗。术中见胃皱襞显著增厚, 最可能导致上述病理改变的内源性物质是

- A.转化生长因子- α
- B.促胃液素
- C.促胰液素
- D.生长抑素
- E.乙酰胆碱

RXCS-U2-107.男, 26 岁。因人际关系问题而寻求心理治疗, 心理治疗师采用的干预方法是非指令性的, 无条件的积极关注协助来访者充分体验和整合自己的经验。这一心理治疗的方法属于

- A.精神分析法
- B.行为疗法
- C.以人为中心疗法
- D.催眠疗法
- E.认知疗法

RXCS-U2-108.女,45岁。大学教授。因车祸导致颅脑损伤,智力测验显示其智商为85分。同时有一位从未接受过正规教育的老人测得智商也是85分。心理治疗师认为前者的智力出现了问题,而后者正常。这一判断所遵循的原则是

- A.客观性原则
- B.中立性原则
- C.操作性原则
- D.保密性原则
- E.标准化原则

RXCS-U2-109.男,68岁,恶心、上腹隐痛、呕吐少许咖啡样液体2天。血压升高,血脂异常病史2年,长期口服阿司匹林100mg/d,胃镜检查可见胃窦黏膜多发糜烂,表面附着血性黏液。最适应的治疗药物是

- A.多潘立酮
- B.奥美拉唑
- C.枸橼酸铋钾
- D.硫糖铝
- E.法莫替丁

RXCS-U2-110.男,25岁。头痛。全身痛,乏力伴发热3天于8月15日来诊。发病前曾收割水稻多日。查体:T 39℃,P 110次/分钟,神志清,球结膜充血,腹股沟淋巴结肿大,腓肠肌压痛。此患者所患疾病的病原特点是

- A.菌体纤细,有12~18个螺旋,镀银染色呈黑色
- B.革兰染色阴性双球菌,裂解释放内毒素致命
- C.革兰染色阴性杆菌,在含胆汁培养基生长更好
- D.革兰染色阴性杆菌,有菌毛,无鞭毛及荚膜
- E.革兰染色阴性弧菌,形态弯曲

RXCS-U2-111.男,32岁。曾患急性附睾炎,治疗不彻底,总感觉阴囊轻度不适,休息后好转,检查发现附睾局限性增厚及肿大。下列治疗错误的是

- A.托起阴囊
- B.热敷
- C.热水坐浴
- D.理疗
- E.阴囊切除

RXCS-U2-112.男,56岁。因“肺部感染、休克”入监护室治疗。血气分析提示该患者“代谢性酸中毒,I型呼吸衰竭”为保护患者组织灌注,此时不宜快速纠正酸中毒,其主要原因在于酸中毒时

- A.组织氧摄取能力增加
- B.血红蛋白结合氧增加
- C.肺部获得更多的氧
- D.组织氧耗量减少
- E.氧离曲线右移

RXCS-U2-113.某种年男性因突发急症在大街上摔倒并昏迷,由路人送至附近医院,被确诊为脑出血,急需手术,但医务人员无法联系到其亲属。再此情况下,可以决定为其急诊手术的人员是

- A.医院所在地民政部门负责人
- B.医院所在地派出所负责人

- C.为其接诊医师的上级医师
- D.院长或其授权人
- E.路人

RXCS-U2-114.男, 37 岁, 右下胸部撞伤 6 小时, 伤后感上腹部疼痛, 头晕。查体: 血压 90/70 mmHg, 心率 110 次/分, 面色苍白, 右腹部压痛、反跳痛、肌紧张较明显。X 线透视示肝阴影扩大、右膈抬高, 首先应考虑的诊断是

- A.外伤性血气胸
- B.肝破裂
- C.右肾破裂
- D.结肠肝曲破裂
- E.胃十二指肠穿孔

RXCS-U2-115.女, 79 岁。咳嗽、咳痰 70 年, 气促 10 年, 加重 5 天, 查体: 桶状胸, 呼气相延长, 血气分析提示 pH 7.32, PaO₂ 55 mmHg, PaCO₂ 54 mmHg, 该患者的发病机制, 下列不包括

- A.阻塞性肺通气功能障碍
- B.弥散功能障碍
- C.无效腔增加
- D.限制性通气功能障碍
- E.通气/血液比例失衡

RXCS-U2-116.女, 18 岁。持续发热 10 天, 于 9 月 2 日来诊, 体温逐日升高, 伴乏力, 纳差。查体: T 39.8 °C, P 80 次/分, 精神萎靡, 腹部可见 6 个充血性皮疹, 腹部胀气, 脾肋下可及。实验室检查: 血 WBC 3.7×10⁹/L。此患者所患疾病的主要病理特点是

- A.基本病变是小血管炎
- B.全身单核-巨噬细胞系统增生性反应
- C.小肠黏膜苍白、水肿
- D.主要病变在淋巴结和胸腺
- E.肠黏膜呈弥漫性纤维蛋白渗出性炎症

A3/A4 型题

(117~119 题共用题干)

某女性患者, 45 岁。体检结果显示: 血压 180/100 mmHg, 体重 68 kg, 身高 160 cm(BMI=26.6), 甘油三酯 4.5 mmol/L, 胆固醇 5.1 mmol/L。

RXCS-U2-117.该女患者营养状况判断为

- A.肥胖
- B.严重肥胖
- C.消瘦
- D.超重
- E.正常

RXCS-U2-118.对该患者进行非药物治疗, 应告知其饮食要注意严格控制

- A.高糖类食物摄入
- B.胆固醇和脂肪摄入
- C.胆固醇摄入
- D.总热能和脂肪摄入
- E.蛋白质摄入

RXCS-U2-119.针对该患者开出运动处方中, 不合适的是

- A.运动频率每周 2 次，每次 20 分钟
- B.鼓励参加自行车、游泳等下肢关节承重小的运动
- C.运动中合理补液
- D.中等强度运动
- E.减重同时加强肌肉力量锻炼

(120~121 题共用题干)

女，27 岁。多食、善饥、大便次数增多，体重下降 1 个月。经甲疏咪唑治疗 1 个月后。FT3、FT4 正常，TSH0.01 $\mu\text{mol/mL}$ 。查体：P 78/次分，BP 120/60 mmHg，甲状腺Ⅲ肿大，左侧明显气管右偏。

RXCS-U2-120.患者拟行甲状腺手术治疗，术前准备应选择的药物是

- A.左甲状腺素钠
- B.普萘洛尔
- C.糖皮质激素
- D.丙硫氧嘧啶
- E.复方碘溶液

RXCS-U2-121.甲状腺切除术后半年，患者出现乏力、便秘、怕冷、体重增加，最可能需要的治疗药物是

- A.左甲状腺素钠
- B.普萘洛尔
- C.糖皮质激素
- D.丙硫氧嘧啶
- E.复方碘溶液

(122~124 题共用题干)

某小学组织学生接种乙肝疫苗，有 44 名学生出现头痛、呕吐、四肢乏力而送到医院就诊，首诊医师及时处理并报告医院有关部门，经医护人员解释、安抚后，39 名学生未经治疗症状很快消失，5 名学生仍感恶心，并伴有焦虑。医院组织专家会诊后排除了疫苗和其他躯体疾病所致。

RXCS-U2-122.根据《疫苗流通与预防接种管理条例》，该事件所出现的情况属于

- A.药物不良反应
- B.群体性心因性反应
- C.预防接种异常反应
- D.医疗事故
- E.突发公共卫生事件

RXCS-U2-123.首诊医师及时处理并报告医院有关部门所遵循的伦理要求是

- A.信息公开
- B.耐心倾听
- C.保守医密
- D.恪守职责
- E.知情同意

RXCS-U2-124.对上述 5 名未愈学生的焦虑症状，适宜的心理干预方法是

- A.行为塑造
- B.放松训练
- C.厌恶疗法
- D.催眠疗法

E.冲击疗法

(125~126 题共用题干)

男, 48 岁。双下肢水肿 2 个月, 既往体健, 查体: BP 140/90 mmHg, 血 Alb 27 g/L, Scr 92 μ mol/L, 尿蛋白(+++), 尿潜血(-)。肾活检显示, 基底膜增厚, 嗜银染色有钉突形成。

RXCS-U2-125.最可能的诊断是

- A.膜性肾病
- B.IgA 肾病
- C.局灶阶段性肾小球硬化
- D.微小病变型肾病
- E.系膜毛细血管性肾小球肾炎

RXCS-U2-126.应首选的药物治疗方案是

- A.硫唑嘌呤+环孢素
- B.环孢素
- C.糖皮质激素+环磷酰胺
- D.糖皮质激素+硫唑嘌呤
- E.环磷酰胺

B1 型题

(127~128 题共用备选答案)

- A.抑制远曲小管近端 Na^+ - Cl^-
- B.抑制血管紧张素转换酶活性
- C.加快心率
- D.阻滞 Ca^{2+} 通道
- E.增强心肌收缩力

RXCS-U2-127.卡托普利的作用机制是

RXCS-U2-128.氢氯噻嗪的作用机制是

(129~130 题共用备选答案)

- A.10 日
- B.2 日
- C.3 日
- D.5 日
- E.7 日

RXCS-U2-129.开具普通处方, 其药物用量一般不超过的日数是

RXCS-U2-130.开具急诊处方, 其药物用量一般不超过的日数是

(131~132 题共用备选答案)

- A.荚膜
- B.质粒
- C.普通菌毛
- D.芽孢
- E.鞭毛

RXCS-U2-131.与耐药性的获得及转移密切相关的细菌结构的是

RXCS-U2-132.与肺炎链球菌致病性密切相关的细菌结构是

(133~134 题共用备选答案)

- A.糖原合成
- B.尿酸合成

- C.糖原分解
- D.丙酮酸羧化
- E.酮体生成

RXCS-U2-133.与糖尿病患者酸中毒有关的主要代谢途径是

RXCS-U2-134.三羧酸循环中的草酰乙酸来源于

(135~136 题共用备选答案)

- A.密码子
- B.增强子
- C.启动子
- D.沉默子
- E.反密码子

RXCS-U2-135.结合转录调节因子并抑制基因表达的序列是

RXCS-U2-136.RNA 聚合酶在转录起始时结合的序列是

(137~138 题共用备选答案)

- A.以浆液渗出为主
- B.以纤维素渗出为主
- C.以淋巴细胞渗出为主
- D.以中性粒细胞渗出为主
- E.以嗜酸性细胞渗出为主

RXCS-U2-137.符合小叶性肺炎炎症特点的是

RXCS-U2-138.符合大叶性肺炎炎症特点的是

(139~140 题共用备选答案)

- A.支气管哮喘
- B.荨麻疹
- C.溶血性贫血
- D.接触性皮炎
- E.血清病

RXCS-U2-139.由III型超敏反应引起的疾病是

RXCS-U2-140.由自身抗体诱导的II型超敏反应引起的疾病是

(141~142 题共用备选答案)

- A.直径 1.6 cm
- B.直径 1.2 cm
- C.直径 0.8 cm
- D.直径 0.4 cm
- E.直径 2.0 cm

RXCS-U2-141.符合小胃癌的肿瘤大小是

RXCS-U2-142.符合微小胃癌的肿瘤大小是

(143~145 题共用备选答案)

- A.心交感神经冲动增多
- B.交感缩血管纤维冲动增多
- C.心迷走神经冲动增多
- D.窦神经冲动增多
- E.交感舒血管纤维冲动增多

RXCS-U2-143.体位性低血压恢复正常时, 心率加快的原因是

RXCS-U2-144.临床按颈动脉窦治疗阵发性室性心动过速的直接作用是

RXCS-U2-145.颈动脉窦灌注压升高时诱发降压反射的是

(146~148 题共用备选答案)

- A.彼此信任, 互相协作
- B.关心、爱护、尊重患者, 保护患者隐私
- C.努力消除歧视, 促进医疗卫生资源的公平分配
- D.努力钻研业务, 更新知识, 提高专业技术水平
- E.提高道德修养水平

RXCS-U2-146.医师对患者应承担的责任是

RXCS-U2-147.医师应履行的专业责任是

RXCS-U2-148.医师之间应恪守的道德规范是

(149~150 题共用备选答案)

- A.硝酸盐
- B.酸雨
- C.水体富营养化
- D.甲基汞
- E.光化学烟雾

RXCS-U2-149.空气中大量 SO₂ 污染产生的二次污染物是

RXCS-U2-150.氮氧化物与挥发性有机物在日光下生成的二次污染是

第三单元

A1 型题

RXCS-U3-001.MDS-RCMD 不可能出现的异常表现是

- A.骨髓造血祖细胞培养集落形成减少
- B.难治性贫血
- C.外周血可见幼稚细胞
- D.血小板减少
- E.骨髓原始细胞>5%

RXCS-U3-002.烧伤后第一个 8 小时应输入的液体量为估计伤后第一个 24 小时补液总量的

- A.2/3
- B.1/3
- C.1/2
- D.1/4
- E.1/5

RXCS-U3-003.急性梗阻性化脓性胆管炎典型临床表现“Reynolds 五联征”不包括

- A.腹痛
- B.神经系统症状
- C.休克
- D.黄疸
- E.呕吐

RXCS-U3-004.甲状腺患侧腺叶大部切除术适用于

- A.甲状腺乳头状癌
- B.青少年原发性甲亢
- C.单纯性弥漫性甲状腺肿
- D.甲状腺高功能腺瘤

E.桥本病

RXCS-U3-005.下列指导低血容量性休克补液治疗最可靠的检测指标是

- A.血红蛋白
- B.颈外静脉充盈度
- C.中心静脉压
- D.肢端温度
- E.血细胞比容

RXCS-U3-006.正常成人热量的基本需要量是

- A.25 kcal(kg · d)
- B.55 kcal(kg · d)
- C.45 kcal(kg · d)
- D.35 kcal(kg · d)
- E.15 kcal(kg · d)

RXCS-U3-007.下列细胞中，能分泌降钙素的是

- A.甲状腺滤泡细胞
- B.甲状旁腺细胞
- C.腺垂体细胞
- D.神经垂体细胞
- E.甲状腺滤泡旁细胞

RXCS-U3-008.来源于 T 淋巴细胞的淋巴瘤类型是

- A.滤泡性淋巴瘤
- B.套细胞淋巴瘤
- C.边缘区淋巴瘤
- D.毛细胞白血病
- E.蕈样霉菌病

RXCS-U3-009.属于破伤风较为特异的临床表现是

- A.稽留热
- B.张口困难
- C.恐水
- D.昏迷
- E.坏疽

RXCS-U3-010.患者因急性弥漫性腹膜炎需急诊手术，正确的原则和步骤不包括

- A.关腹前在腹腔内用抗生素控制感染
- B.术后一般放置腹腔引流
- C.寻找引起腹膜炎的原发灶
- D.根据怀疑病变脏器的部位确定手术切口
- E.用生理盐水冲洗腹腔至清洁

RXCS-U3-011.拟实施储存式自体输血的患者，其血红蛋白水平至少应大于

- A.110 g/L
- B.100 g/L
- C.130 g/L
- D.120 g/L
- E.140 g/L

RXCS-U3-012.属于非特异性免疫的是

A. 致敏 T 淋巴细胞

B. IgG 抗体

C. IgM 抗体

D. IgE 抗体

E. 单核-巨噬细胞

RXCS-U3-013. 急性胰腺炎的典型症状是

A. 脐周阵发性疼痛, 停止肛门排便和排气

B. 上腹部剧烈疼痛, 向左上臂内侧放射

C. 上腹部烧灼样疼痛, 进后可缓解

D. 上腹部持续性剧烈疼痛, 向腰背部放射

E. 阵发上腹部钻顶样疼痛, 碾转体位

RXCS-U3-014. 疟疾患者血常规的特点是

A. 红细胞及血红蛋白减少

B. 白细胞总数明显升高

C. 血小板明显降低

D. 淋巴细胞比例增加

E. 网织红细胞减少

RXCS-U3-015. 采取非手术方法治疗急性消化性溃疡穿孔, 错误的处理措施是

A. 静脉应用质子泵抑制剂

B. 胃肠减压

C. 静脉应用抗生素

D. 静脉输液, 营养支持

E. 静脉应用糖皮质激素

RXCS-U3-016. 孕早期妇女感染下列哪种病原体易导致胎儿先天性感染

A. 人乳头瘤病毒

B. 沙眼衣原体

C. 白假丝酵母菌

D. 淋病奈瑟菌

E. 巨细胞病毒

RXCS-U3-017. 肝硬化最常见的并发症是

A. 自发性腹膜炎

B. 肝性脑病

C. 门静脉血栓形成

D. 上消化道出血

E. 原发性肝癌

RXCS-U3-018. 初治急性早幼粒细胞白血病首选的药物是

A. 全反式维 A 酸

B. 羟基脲

C. 1,25-(OH)₂-D₃

D. 阿糖胞苷

E. 高三尖杉酯碱

RXCS-U3-019. 具有降低食管下括约肌压力作用的药物是

A. 钙通道阻滞剂

B. 质子泵抑制剂

C.H₂受体拮抗剂

D.β受体拮抗剂

E.促胃肠动力剂

RXCS-U3-020.霍乱的典型临床表现是

A.发热，腹痛，黏液脓血便，里急后重

B.大量水样便，剧烈呕吐，无发热或明显腹痛

C.发热，腹痛，果酱样便

D.无发热，剧烈呕吐，少量黄水样便

E.发热，剧烈腹痛，水样便或血便

RXCS-U3-021.高钾血症的病因不包括

A.慢性肾衰竭

B.应用袢利尿剂

C.应用螺内酯

D.大量输入库存血

E.挤压综合征

RXCS-U3-022.向肝脏输送血液最多的血管是

A.肝静脉

B.胃右动脉

C.肝动脉

D.门静脉

E.肠系膜上动脉

RXCS-U3-023.中毒后临床表现为双侧瞳孔散大的毒物是

A.有机磷杀虫剂

B.氯丙嗪

C.阿片类药物

D.吗啡

E.阿托品

RXCS-U3-024.以慢性腰痛和下肢大关节不对称关节炎为特征临床表现的疾病是

A.腰椎间盘突出症

B.类风湿关节炎

C.强直性脊柱炎

D.痛风关节炎

E.腰肌劳损

RXCS-U3-025.急性单纯性阑尾炎时，最不符合临床表现的是

A.右下腹局限性压痛

B.脐周疼痛

C.白细胞计数轻度升高

D.局部腹肌紧张

E.有低热表现

RXCS-U3-026.关于下肢丹毒临床表现的描述，正确的是

A.在中央部的表面有脓栓

B.局部多呈紫红色

C.界线清楚

D.局部硬肿

E.常累及双侧肢体

RXCS-U3-027.根除幽门螺杆菌治疗后，首选的复查方法是

- A.幽门螺杆菌培养
- B.血清幽门螺杆菌抗体检查
- C.¹³C 或 ¹⁴C 尿素呼气试验
- D.快速尿素酶试验
- E.组织学检查

RXCS-U3-028.下列乳腺癌病理类型中，预后最好的是

- A.黏液腺癌
- B.硬癌
- C.单纯癌
- D.髓样癌
- E.导管内癌

RXCS-U3-029.克罗恩病的主要手术指征是

- A.持续性粪隐血阳性
- B.严重腹泻
- C.营养不良，体重减轻
- D.疑有恶变
- E.合并结肠息肉

RXCS-U3-030.手术病人胃肠准备中要求术前 12 小时禁食，4 小时禁水的目的是

- A.减少术后感染
- B.防止麻醉或手术中呕吐
- C.防止术后切口裂开
- D.防止术后吻合口瘘
- E.防止术后腹胀

RXCS-U3-031.腹部钝性损伤，腹壁未破裂却导致腹内下列某一脏器破裂，出现腹膜炎症状最晚的是

- A.空肠
- B.回肠
- C.结肠
- D.十二指肠
- E.胃

RXCS-U3-032.与动、静脉血栓形成及反复流产相关的自身抗体是

- A.抗 SSA 抗体
- B.抗核抗体
- C.抗 Sm 抗体
- D.抗 dsDNA 抗体
- E.抗磷脂抗体

RXCS-U3-033.典型伤寒的临床表现不包括

- A.脾大
- B.相对缓脉
- C.表情淡漠
- D.持续发热
- E.出血性皮炎

RXCS-U3-034.血清淀粉酶水平是临床上诊断和监测急性胰腺炎的重要指标,其升高的高峰一般出现在发病后

- A.4 小时
- B.48 小时
- C.12 小时
- D.24 小时
- E.8 小时

RXCS-U3-035.全身性外科感染的综合性治疗中,最关键的是

- A.保护最重要脏器功能
- B.全身支持治疗
- C.处理原发感染灶
- D.对症治疗
- E.应用抗菌药物

A2 型题

RXCS-U3-036.男,45 岁。餐后突发右上腹阵发性绞痛伴恶心 2 天,尿色呈浓茶样。既往有类似发作。查体:急性病容,巩膜黄染,双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音,右上腹深压痛,无肌紧张,最可能的诊断是

- A.急性胰腺炎
- B.胆道蛔虫病
- C.急性胆囊炎
- D.胆总管结石
- E.胆总管囊肿

RXCS-U3-037.男,32 岁。发热、乏力、纳差、腹胀 2 个月。体温最高 T 37.9 °C。查体:T 37.5 °C, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80 mmHg。双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音,心律齐,腹壁柔韧感,移动性浊音阳性。实验室检查:血沉 60 mm/h,腹水:比重 1.025,蛋白 35 g/L,白细胞 850×10⁶/L,单核 0.80,多核 0.20。首先考虑的诊断是

- A.结核性腹膜炎
- B.Budd-Chiari 综合征
- C.肝硬化并原发性腹膜炎
- D.系统性红斑狼疮
- E.腹膜转移癌

RXCS-U3-038.男,62 岁。上腹胀伴食欲下降 4 年。查体:T 36.5 °C,P 80 次/分, R 18 次/分, BP 130/80 mmHg。双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音,心律齐,腹软,无压痛。胃镜检查:胃黏膜菲薄,可见血管显露。血常规提示大细胞性贫血,血抗壁细胞抗体阳性。最可能的诊断是

- A.慢性萎缩性胃体炎
- B.慢性淋巴细胞性胃炎
- C.消化性溃疡
- D.慢性浅表性胃炎
- E.慢性萎缩性胃窦炎

RXCS-U3-039.男,55 岁。上腹胀痛伴恶心 3 天,右下腹痛阵发加剧、腹胀半天。既往体健。查体:T 38.3 °C, P 120 次/分, BP 150/90 mmHg。全腹压痛(+),右下腹明显有肌紧张,肝浊音界存在,未闻及肠鸣音。实验室检查:血 WBC 13.0×10⁹/L, N 0.88。右下腹穿刺抽出黄色混浊液体 2 mL,镜检脓细胞(++)。最可能的诊断是

- A. 阑尾炎穿孔并弥漫性腹膜炎
- B. 伤寒肠穿孔并弥漫性腹膜炎
- C. 绞窄性肠梗阻
- D. 消化性溃疡穿孔并弥漫性腹膜炎
- E. 重症急性胰腺炎

RXCS-U3-040. 男, 32 岁。间断上腹痛 3 年。腹痛多发生在饥饿时, 进食后可缓解。查体: T 36.5 °C, P 18 次/分, R 18 次/分, BP 100/60 mmHg。双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 腹软, 无压痛。胃镜检查十二指肠溃疡愈合期, 13C 尿素呼气实验阳性。最有效的治疗方案是

- A. 奥美拉唑+枸橼铋钾+克拉霉素
- B. 西咪替丁+克拉霉素+左氧氟沙星
- C. 奥美拉唑+阿莫西林+替硝唑+枸橼酸铋钾
- D. 奥美拉唑+硫糖铝
- E. 法莫替丁+阿莫西林+克拉霉素+铝碳酸镁

RXCS-U3-041. 女, 35 岁。术后粘连性梗阻 3 天, 加重 1 天。查体: 腹部可见肠型, 右下腹有局限性压痛, 肠鸣音亢进。多次腹部 X 线平片可见固定肠襻。首选的治疗措施是

- A. 继续补液, 观察病情变化
- B. 灌肠治疗
- C. 剖腹探查
- D. 注射吗啡止痛
- E. 出现腹膜刺激征后手术

RXCS-U3-042. 女, 55 岁。寒战, 发热, 右上腹痛 15 天, 体温每日高达 39.8 °C 左右, CT 提示肝内两个脓肿, 最大直径达 6 cm, 其治疗方法应首选

- A. 全身大剂量应用抗生素
- B. 右半肝切除术
- C. 经皮穿刺置管引流术
- D. 脓腔内注入抗生素
- E. 支持治疗

RXCS-U3-043. 男, 32 岁。锐器刺伤右上腹 1 小时。查体: T 36.5 °C, P 100 次/分, R 26 次/分, BP 100/65 mmHg, 双肺呼吸音清; 未闻及干湿性啰音, 心率 100 次/分, 心律齐。诊断性腹腔穿刺抽出不凝血。急症手术探查。正确的腹腔探查顺序首先探查

- A. 小肠
- B. 胃后壁及胰腺
- C. 右肾
- D. 肝脏
- E. 胃、十二指肠

RXCS-U3-044. 男, 32 岁。发热、下腹痛、腹泻 1 个月。体温最高 38.1 °C, 大便 3 次/日, 黄稀便, 无脓血。查体: T 37.5 °C, P 90 次/分, R 18 次/分, BP 120/80 mmHg。双肺呼吸音清, 未闻及干湿啰音, 心律齐, 腹软, 无压痛。腹部 B 超示右下腹部肠壁增厚对诊断最有意义的检查是

- A. 腹腔镜
- B. 下消化道 X 线钡剂造影
- C. 腹部 CT
- D. 结肠镜

E.腹部 X 线平片

RXCS-U3-045.女, 45 岁。甲状腺癌根治术后 1 天。感觉面部针刺样麻木, 间断手足抽搐。正确的处理措施是

- A.口服葡萄糖酸钙
- B.静脉注射钙剂
- C.气管切开
- D.口服维生素 D3
- E.伤口切开

RXCS-U3-046.男, 32 岁。左下腹痛 2 个月伴腹泻。大便为黄稀便, 时有黏液血便, 每日 3 次。查体: T 36.5 °C, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80 mmHg。双肺呼吸音清, 未闻及干湿啰音, 心率齐, 腹软, 左下腹轻压痛, 无反跳痛。结肠镜检查:直肠、乙状结肠黏膜弥漫充血、水肿, 粗颗粒样改变, 多发糜烂及浅溃疡。最可能的诊断是

- A.结肠癌
- B.克罗恩病
- C.慢性结肠炎
- D.溃疡性结肠炎
- E.脑结核

RXCS-U3-047.男, 55 岁。车祸伤, 现场查体:T 36.5 °C, P 100 次/分, R 22 次/分, BP 100/60 mmHg, 意识模糊, 呼吸浅促, 右侧额部皮肤裂口 1 cm, 裂口内见搏动性出血, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 腹软, 无压痛。现场紧急的止血方法是

- A.指压法
- B.填塞法
- C.止血带法
- D.三角巾包扎法
- E.局部止血剂

RXCS-U3-048.男, 45 岁。突发中上腹持续性疼痛, 伴呕吐、尿黄 2 小时, 发病前 3 小时大量饮酒, 并进食较多油腻食物。查体: T 37.5 °C, P 98 次/分, R 22 次/分, BP 130/80 mmHg, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心率 98 次/分, 心律齐, 上腹有压痛及反跳痛。最有诊断价值的检查是

- A.腹部 CT
- B.胃镜
- C.尿淀粉酶
- D.腹部 X 线平片
- E.血清淀粉酶

RXCS-U3-049.女, 55 岁。上腹不适, 纳差 3 年, 胃镜及胃黏膜活组织病理检查:慢性萎缩性胃炎, 重度肠上皮化生。最适合的随访检查方法是

- A.胃镜
- B.血清肿瘤标志物
- C.腹部 B 超
- D.腹部 CT
- E.上消化道 X 线钡剂造影

RXCS-U3-050.女, 21 岁。关节疼痛、口腔溃疡 4 个月, 双手指遇冷变白、变紫 2 个月, 发热、下肢水肿 2 周。实验室检查:血 Hb 89 g/L, WBC $2.3 \times 10^9/L$, PLT $80 \times 10^9/L$; 尿蛋白(++); 尿红细胞(++). 最可能的诊断是

- A.再生障碍性贫血
- B.肾结核
- C.系统性红斑狼疮
- D.急性肾小球炎
- E.类风湿性关节炎

RXCS-U3-051.女,35岁。发热、牙龈出血 20 天。查体:左侧颈部触及一个 2 cm×2 cm 大小淋巴结,质韧,无压痛。胸骨压痛(+),肝肋下未触及,脾肋下 2 cm。血常规:Hb 105 g/L,WBC $3.6 \times 10^9/L$,骨髓细胞学检查示大的原始细胞占 0.80,细胞大小均一,胞浆内可见明显空泡,PAS 细胞(+)。该患者最可能的诊断是

- A.急性髓细胞白血病(ML)
- B.急性淋巴细胞白血病(L1)
- C.急性细胞白血病(M2)
- D.急性淋巴细胞白血病(L2)
- E.急性淋巴细胞白血病(L3)

RXCS-U3-052.男,32岁。大量呕吐、腹泻、少尿 1 天。查体:T 36.5 °C, P 110 次/分, R 24 次/分, BP 85/55 mmHg, 体重 70 kg,脉搏细速,双肺呼吸音清,未闻及干湿啰音,心律 110 次/分,心律齐,腹软,无压痛。估计液体丢失量至少是

- A.2 100 mL
- B.4 900 mL
- C.4 200 mL
- D.2 800 mL
- E.3 500 mL

RXCS-U3-053.男,45岁。食欲减退 6 天。实验室检查:血 ALT 438 U/L,TbIL 56 $\mu\text{mol/L}$,PTA 88%,HBVDNA 4.5×10^6 拷贝/mL。其肝脏最可能的病理表现是

- A.肝细胞大块坏死
- B.淋巴细胞浸润
- C.肝细胞点状、灶状坏死
- D.中性粒细胞聚集
- E.肝细胞水肿

RXCS-U3-054.男,45岁。右上腹胀痛伴间断发热 4 个月。1 年前曾因“菌痢”住院治疗缓解。曾于粪便中发现有叶状伪足的滋养体。腹部 B 超示肝右叶单发直径 10 cm 囊肿,此病原体从肠道感染至肝的途径是

- A.从腹腔经淋巴系统入肝
- B.从结肠经门静脉入肝
- C.从小肠经门静脉入肝
- D.从胆道上行入肝
- E.从胃经门静脉入肝

RXCS-U3-055.男 55 岁。被重物砸伤双下肢 2 小时。查体: P 108 次/分, BP 113/64 mmHg,神志清楚,双肺呼吸音清未闻及干湿性啰音,心律齐,腹软,无压痛,双下肢肿胀,广泛软组织挫裂伤,最佳处理方法是

- A.快速输平衡盐溶液
- B.输血
- B.使用升压药
- C.输葡萄糖溶液

D.输血浆代用品

RXCS-U3-056.男, 32 岁。腹泻 3 个月。大便每日 7~10 次, 稀便, 无脓血黏液, 伴乏力, 体重减轻 5 kg。患者 7 年前曾到东南亚某国打工 3 年。查体:慢性病容, 肛门周围有疱疹, 疱疹内容物镜检查偶见白细胞。最可能的诊断是

- A.艾滋病
- B.慢性菌痢
- C.溃疡性结肠炎
- D.慢性肠炎
- E.结肠癌

RXCS-U3-057.男, 72 岁。胃大部切除毕 I 式吻合术后 6 天, 有肛门排气后开始进流质物质饮食, 进食后腹胀并呕吐, 呕吐物中含胆汁。查体:心肺未见明显异常, 腹部可见胃型, 无蠕动波。腹部 X 线片示残胃内大量液体潴留。最可能的原因是

- A.残胃蠕动功能障碍
- B.吻合口不全梗阻
- C.吻合口水肿
- D.近端空肠逆流
- E.远端空肠梗阻

RXCS-U3-058.女, 21 岁。早晨被发现昏睡不醒, 枕头旁边有呕吐物。同寝室人有头晕、乏力、恶心症状, 房间用煤炉取暖。既往体健。查体: T 35.6 °C, P 100 次/分, R 26 次/分, BP 120/75 mmHg。神志不清, 双侧瞳孔等圆等大, 对光反射存在, 心、肺检查未见异常, 无颈强直, 病理反射未引出。为明确诊断, 最有意义的检查是

- A.脑脊液常规检查
- B.头颅 CT
- C.血碳氧血红蛋白浓度测定
- D.血及呕吐物毒物检查
- E.全血胆碱酯酶活力测定

RXCS-U3-059.女, 55 岁。恶心、呕吐、少尿 6 小时, 呕吐量大, 无口渴。2 年前有腹部手术史。此时患者最可能出现的水电解质紊乱是

- A.高渗性脱水
- B.稀释性低钠血症
- C.高钾血症
- D.低渗性缺水
- E.等渗性缺水

RXCS-U3-060.女, 45 岁。茶色尿伴腰背痛 1 个月。查体:贫血貌, 巩膜黄染, 肝肋下未触及, 脾肋下 2 cm, 腹部移动性浊音 (-)。血常规: Hb 72 g/L, PLT 126×10⁹/L, 网织红细胞 0.12, Coombs 试验 (+), Ham 试验 (-)。该患者最可能的诊断是

- A.自身免疫性溶血性贫血
- B.巨幼细胞贫血
- C.脾功能亢进
- D.骨髓增生异常综合征
- E.阵发性睡眠性血红蛋白尿

RXCS-U3-061.男, 32 岁。聚餐后出现右上腹疼痛 2 天, 向右肩胛区放射。查体: T 37.5 °C, P 90 次/分, R 22 次/分, BP 130/80 mmHg, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿啰音, 心率 90 次/分, 心律齐, 右上腹肌紧张, 压痛 (+), Murphy 征 (+)。最可能的诊断是

- A.急性胃炎
- B.右肾结石
- C.十二指肠球部溃疡
- D.急性胰腺炎
- E.急性胆囊炎

RXCS-U3-062.男, 62 岁。全麻下腹膜后肿瘤切除术后 3 日,晨起剧烈咳嗽后觉腹部切口剧痛。查体: 生命体征平稳, 切口敷料湿透。检查切口更换敷料发现小肠自伤口膨出。在病房中的紧急处理措施正确的是

- A.局麻下全层缝合伤口
- B.立即还纳小肠
- C.无菌盐水清洗后还纳小肠
- D.局麻下分层缝合伤口
- E.无菌敷料覆盖小肠及伤口

RXCS-U3-063.男, 55 岁。间断少尿、腹胀 1 年, 腹痛、低烧 1 周。既往肝炎肝硬化病史 15 年。查体: T 37.5 °C, P 84 次/分, R 18 次/分, BP 90/60 mmHg。双肺呼吸音清, 未闻及干湿啰音, 心律齐, 腹膨隆, 全腹轻压痛, 无反跳痛, 移动性浊音阳性。腹水常规: 比重 1.017, 蛋白 28 g/L, 细胞总数 $920 \times 10^6/L$, 白细胞数 $800 \times 10^6/L$, 多形核细胞 0.80。最可能的诊断是

- A.肝肾综合征
- B.自发性腹膜炎
- C.原发性肝癌
- D.门静脉血栓形成
- E.结核性腹膜炎

RXCS-U3-064.男, 45 岁。慢性腹泻 6 年。每日大便 3~4 次, 便中有少量黏液脓血, 抗生素治疗无效。查体: T 36.5 °C, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80 mmHg。双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 腹软, 无压痛。结肠镜检查: 直肠、乙状结肠多发糜烂及浅溃疡。首选的药物是

- A.口服硫唑嘌呤
- B.口服柳氮磺吡啶
- C.静脉应用环孢素
- D.口服泼尼松
- E.静脉应用甲泼尼龙

RXCS-U3-065.男, 32 岁。炸石作业时不慎炸伤右大腿 5 小时。伤后出血约 400 mL。查体: T 36.5 °C, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 110/80 mmHg, 神志清楚, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 腹软, 无压痛。右大腿可见一长约 10 cm 不规则皮肤伤口, 肌肉部分破损。对该患者处理错误的是

- A.清创后一期缝合伤口
- B.扩创、引流后延期缝合
- C.同时应用抗生素和 TAT
- D.清创时探查深部组织损伤情况
- E.伤口近心端扎止血带, 送医院

RXCS-U3-066.女, 21 岁。1 小时前被人发现昏迷, 身边有空瓶, 瓶内有刺激性气味。查体: P 60 次/分, 全身大汗, 呼吸有蒜臭味, 瞳孔针尖大小, 两肺满布湿性啰音。最可能的诊断是

- A.糖尿病酮症酸中毒

B.镇静剂催眠药中毒

C.一氧化碳中毒

D.乙醇中毒

E.有机磷杀虫药中毒

RXCS-U3-067.男, 12 岁, 持续发热 1 周。体温 39 °C 左右, 伴畏寒, 无寒战, 伴有全身不适、乏力, 食欲差, 病情逐渐加重并出现红疹 1 天来诊。查体: 躯干部出现少许淡红色小斑丘疹, 压之褪色。初步考虑诊断为

A.水痘

B.麻疹

C.天花

D.伤寒

E.猩红热

RXCS-U3-068.男, 62 岁。腹痛、腹胀、乏力半年、腹部隐痛阵发性发作, 无恶心、呕吐。查体 36.5 °C, P 88 次/分, R 22 次/分, BP 120/80 mmHg, 贫血貌, 浅表淋巴结无肿大, 巩膜无黄染, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿啰音, 心率 88 次/分, 心率齐, 腹软, 未见肠型, 右下腹可触及一活动性包块。实验室检查:血常规示 Hb 90 g/L,WBC 9.5×10⁹/L,PLT 195×10⁹/L,肝功能正常, CEA20 μg/L。粪隐血实验阳性。最可能的诊断是

A.回盲部肠套叠

B.回盲部结核

C.克罗恩病

D.溃疡性结肠炎

E.回盲部肿瘤

RXCS-U3-069.男, 55 岁。出车祸后 6 小时。6 小时来未排尿, 放置导尿管导出黄色尿液 50 mL。查体: T 36.5 °C, P 140 次/分, R 28 次/分, BP 65/50 mmHg, 意识模糊, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 腹部膨隆, 四肢冰冷。最可能的诊断为

A.轻度休克, 神经源性休克

B.重度休克, 神经源性休克

C.重度休克, 低血容量性休克

D.中度休克, 低容量性休克

E.中度休克, 神经源性休克

RXCS-U3-070.女, 35 岁。肛门周围肿胀伴发热 3 天。排便时疼痛加重。查体:T 38.5 °C,P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80 mmHg, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 腹软, 无压痛。肛门周围皮肤发红、压痛明显。最可能的诊断是

A.肛门周围脓肿

B.直肠下黏膜脓肿

C.肛门括约肌间隙脓肿

D.盆骨直肠间隙脓肿

E.直肠后间隙脓肿

RXCS-U3-071.男 55 岁。右上腹疼痛 3 个月。呈持续性钝痛, 向右肩背部放射, 伴乏力, 发病以来体重减轻 6 kg。查体:T 36.5 °C,P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80 mmHg, 巩膜无黄染、双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 肝肋下 3 cm, 质地稍硬, 有结节感。实验室检查 AFP 900 μg/L,CEA 正常。腹部 B 超: 肝右叶 8 cm×6 cm 占位性病变, 向外生长, 周适血流量增强, 门静脉正常。最理想的治疗方法是

A.肿瘤切除加放疗

B.姑息性肝切除术

C.根治性肝切除术

D.局部射频治疗

E.经肝动脉化疗栓塞

RXCS-U3-072.男, 62 岁。进行性吞咽困难 2 月余。既往体健。查体: T 36.5 °C, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80 mmHg。浅表淋巴结未触及肿大, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 未闻及杂音, 腹软, 无压痛。上消化道 X 线钡剂造影:食管下段黏膜紊乱, 部分管壁僵硬。为明确诊断, 首选的检查是

A.食管 B 超

B.胃镜

C.PET-CT

D.胸部增强 CT

E.食管拉网细胞学检查

RXCS-U3-073.男, 62 岁。半日前进食苹果后呕鲜血约 300 mL, 随后排黑便约 400 g。慢性乙型肝炎病史 30 余年。查体:P 112 次/分, BP 100/60 mmHg。神志清楚, 腹软, 无压痛, 肠鸣音 12 次/分。该患者消化道出血最有可能的原因是

A.糜烂性胃炎

B.食管贲门黏膜撕裂综合征

C.胃癌

D.消化性溃疡

E.胃底静脉曲张破裂

RXCS-U3-074.女, 45 岁。间断胸骨后疼痛、反酸、烧心 1 年。饮酒后加重。查体:T 36.5 °C, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80 mmHg。浅表淋巴结未触及肿大, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿啰音, 心律齐, 腹软, 全腹无压痛及反跳动。胃镜:食管下段可见长约 0.3 cm 纵行黏膜破损。首选的治疗药物是

A.碳酸氢钠

B.奥美拉唑

C.多潘立酮

D.碳酸铝

E.莫沙必利

RXCS-U3-075.男, 72 岁。10 小时前突发昏迷。CT 诊断为脑出血, 2 小时前胃管引流出咖啡色液体约 50 mL,其上消化道出血最可能的原因是

A.缺血性胃病

B.胆汁反流性胃炎

C.感染引起急性胃黏膜病变

D.药物性胃炎

E.应激引起急性胃黏膜病变

RXCS-U3-076.女, 45 岁。肛门肿胀 1 周, 持续性疼痛,逐渐加重, 排便和行走时出现剧痛, 有里急后重感和排便困难, 伴发热, 全身不适。查体: T 39.6 °C, 肛门左侧红肿, 有明显压痛, 直肠指诊:直肠左侧饱满, 压痛 (+), 有波动感。血常规: Hb 102 g/L,WBC 21.0×10⁹/L,N 0.92,PLT 210×10⁹/L,决定立即行切开引流术, 最主要的依据是

A.排便有困难

B.局部饱满有波动感

C.高热, 全身症状

D.血白细胞增高

E.行走时出现剧痛

RXCS-U3-077.女, 55 岁, 上腹隐痛、皮肤巩膜黄染 1 个月, 呈进行性加重, 伴乏力、食欲不振。查体: T 36.5 °C, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80 mmHg。双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心率 80 次/分, 心律齐, 腹部膨隆, 腹软, 未触及包块, 肠鸣音减弱。血 CA199 和 CEA 增高。为明确诊断和设计手术方案, 最有意义的检查方法是

A.腹部 B 超

B.腹部 MRI

C.上消化道钡剂造影

D.腹部增强 CT

E.ERCP

RXCS-U3-078.男, 45 岁。上腹痛伴烧心 4 年。多在餐后约 1 小时出现剑突下疼痛, 1~2 小时后可缓解。内科规范治疗 1 年, 症状反复发作, 曾有 2 次黑便。胃镜及 X 线钡剂造影均在胃角处见直径 1.6 cm 大小溃疡, 决定手术治疗。首选的术式为

A.胃大部切除毕 I 式吻合术

B.选择性迷走神经切断术加引流术

C.Roux-en-Y 吻合术加迷走神经干切断术

D.胃大部切除毕 II 式吻合术

E.高选择性迷走神经切断术加引流术

RXCS-U3-079.女, 55 岁。上腹胀痛 8 个月, 突发剧痛 2 小时。查体: T 36.5 °C, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80 mmHg, 消瘦、贫血貌, 左锁骨上淋巴结肿大 1.8 cm×1.5 cm, 质硬, 无压痛。双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 全腹肌紧张, 上腹明显压痛、反跳痛。立位腹部 X 线平片可见膈下游离气体。下一步治疗最合理的术式为

A.姑息性胃大部切除术

B.胃造瘘术

C.胃癌根治术

D.穿孔修补术

E.胃空肠吻合术

RXCS-U3-080.男, 32 岁。左上腹被撞伤后钝痛 1 天, 突发腹痛加重 3 小时。查体: P 140 次/分, BP 60/45 mmHg, 面色苍白, 四肢厥冷, 双肺呼吸音清, 心率 140 次/分, 上腹中度压痛, 肌紧张, 移动性浊音 (+)。腹腔穿刺抽出不凝血。最可能的诊断是

A.肝破裂

B.脾破裂

C.结肠破裂

D.小肠破裂

E.胃破裂

RXCS-U3-081.男, 45 岁, 行走时右小腿和足部出现间歇性疼痛 1 年余。近 3 个月夜间呈持续性疼痛, 足趾呈紫黑色、干冷。吸烟史 20 余年, 每日 2 包。该患者不应该选择的治疗措施是

A.严格戒烟

B.手术治疗

C.高压氧舱治疗

D.热疗

E.给予止痛剂及镇静剂

RXCS-U3-082.女, 21 岁。腹痛、呕吐 3 小时。进食生冷食物后出现上腹痛伴恶心、剧烈呕吐, 呕吐物初为胃内容物, 后为少量鲜血。引起呕血最可能的原因是

- A.急性糜烂出血性胃炎
- B.食管贲门黏膜撕裂综合征
- C.应激性溃疡
- D.十二指肠合并出血
- E.反流性食管炎合并出血

RXCS-U3-083.女, 35 岁。颈前包块 8 年, 心慌、气短、怕热、多汗半年。查体: P 110 次/分, BP 160/70 mmHg,无突眼, 甲状腺触及多个结节, 中等硬度, 表面光滑, 随吞咽可上下移动。实验室检查: T₃、T₄ 增高, TSH 降低, TPOAb 及 TGA_b 均阴性。最可能的诊断是

- A.慢性淋巴细胞性甲状腺炎
- B.结节性甲状腺肿继发甲亢
- C.甲状腺自主高功能腺瘤
- D.单纯性甲状腺肿
- E.原发性甲状腺功能亢进症

RXCS-U3-084.男, 32 岁。右上臂刀割伤 16 小时, 查体: T 36.5 °C, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80 mmHg, 神志清楚, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿啰音, 心律齐, 腹软, 无压痛, 右上臂外侧纵行伤口, 长约 4 cm, 边缘尚整齐。清创后, 伤口不缝合, 此时伤口内应放置的引流物是

- A.烟卷纱布
- B.生理盐水纱条
- C.硅胶管
- D.乳胶管
- E.乳胶片

RXCS-U3-085.女, 28 岁。发热、皮肤出血点 2 周。查体:贫血貌, 四肢皮肤散在出血点, 胸骨压痛(+), 左肺可闻及少许湿啰音, 腹软, 脾肋下 1 cm。血常规: Hb 71 g/L, WBC 3.0×10⁹/L, PLT 6×10⁹/L。骨髓细胞学检查见原始细胞占比 0.90, 细胞化学染色: MPO(-), PAS(+), 骨髓染色体检查为正常核型。应首选的治疗是

- A.全反式维 A 酸口服液
- B.VDLP 方案化疗
- C.甲磺酸伊马替尼口服
- D.DA 方案化疗
- E.环孢素口服

RXCS-U3-086.女, 65 岁。阵发性腹痛、腹胀、停止排气排便 2 天。既往有类似发作, 程度较轻, 未诊治。查体: P 100 次/分, BP 110/70 mmHg, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心率 100 次/分, 心律齐。腹肌紧张, 压痛明显, 反跳痛阳性, 移动性浊音阳性。最可能的诊断是

- A.不全性粘连性肠梗阻
- B.单纯性机械性肠梗阻
- C.绞窄性肠梗阻
- D.麻痹性肠梗阻
- E.完全性高位肠梗阻

RXCS-U3-087.男, 32 岁。肛门肿胀伴畏寒、发热 4 周。症状反复发作并逐渐加重, 伴有排尿不适, 肛门旁出现局部红肿疼痛, 继之破溃流出脓液。确保疗效的关键步骤是

- A. 瘻管切开，形成敞开的创面
- B. 抗感染治疗后手术
- C. 1 : 5 000 高锰酸钾溶液坐浴
- D. 明确破溃外口和内口的位置
- E. 首先充分扩肛

RXCS-U3-088. 女, 45 岁, 厨师。头痛半年, 加重伴呕吐 1 个月。无高血压, 心脏病病史。查体: BP 130/86 mmHg, 颈无抵抗, 眼底检查发现视乳头水肿, 头颅 CT 检查提示脑实质多个低密度病灶, 最可能的诊断是

- A. 脑肿瘤
- B. 囊尾蚴病
- C. 腔隙性脑梗死
- D. 脑出血
- E. 脑脓肿

RXCS-U3-089. 女, 65 岁。乏力, 胸痛 1 个月, 既往体健, 查体: 轻度贫血貌, 双侧肋骨有局部压痛, 实验室检查: 血常规: Hb 80 g/L, WBC $5.6 \times 10^9/L$, PLT $120 \times 10^9/L$, 血清总蛋白 100 g/L, 白蛋白 27 g/L, Scr $190 \mu\text{mol/L}$, 骨髓细胞学检查时骨髓中幼浆细胞占 0.45。为明确诊断, 最重要的检查是

- A. 血、尿免疫固定电泳
- B. 血清微球蛋白测定
- C. 尿常规
- D. 尿本周蛋白
- E. 血沉

RXCS-U3-090. 女, 65 岁。食用坚果后突发呕血 4 小时, 伴心悸。胸闷、气短。既往慢性乙型肝炎病史 20 年, 冠心病病史 8 年。查体: T 36.5°C , P 100 次/分, R 24 次/分, BP 90/50 mmHg, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心率不齐, 可闻及早搏 10 次/分, 腹软, 无压痛。最适合的治疗药物是

- A. 西咪替丁
- B. 硝酸甘油
- C. 血管加压素
- D. 普萘洛尔
- E. 生长抑素

RXCS-U3-091. 男, 26 岁。因肠系膜血管缺血性疾病行小肠近全切除术后 2 个月, 术后第 2 天开始接受全胃肠外营养支持治疗。现患者出现皮肤干燥、鳞状脱屑、脱发及伤口愈合延迟。其最可能的原因是营养液中缺乏

- A. 维生素
- B. 电解质
- C. 微量元素
- D. 必需脂肪酸
- E. 氨基酸

RXCS-U3-092. 女, 72 岁。腹痛 6 小时进食油腻食物后突发腹痛, 以中上腹部为著。查体: P 110 次/分, BP 110/60 mmHg。右上腹部可触及表面光滑包块, 有压痛。首选的检查是

- A. 逆行胰胆管造影
- B. 腹部 B 超
- C. 上消化道 X 线钡剂造影

D.腹部 X 线平片

E.胃镜

RXCS-U3-093.男, 45 岁。不明原因发热半个月。查体:T 38 °C, 两侧颈部、腋窝和腹股沟区均可触及淋巴结肿大, 最大者 3 cm×2 cm, 均质硬、活动、无压痛, 肝肋下 2 cm, 脾肋下 4 cm。颈部淋巴结活检诊断为非霍奇金淋巴瘤, 要确定该患者的临床分期, 所需的辅助检查不包括

A.腹部 B 超

B.骨髓细胞学检查

C.浅表淋巴结 B 超

D.盆腔 CT

E.胸部 CT

RXCS-U3-094.女, 72 岁。腹部绞痛 4 小时, 伴腹胀, 无呕吐、发热。下消化道 X 线钡剂造影见直肠上段钡剂受阻, 钡影尖端呈“鸟嘴”形。最可能的诊断是

A.直肠癌

B.乙状结肠癌

C.小肠扭转

D.乙状结肠扭转

E.肠套叠

RXCS-U3-095.男, 32 岁。多次于饮酒后关节红肿疼痛发作, 累及的关节包括第一跖趾关节、踝或膝关节。该患者最可能出现的检查结果是

A.血 HLA-B27 (+)

B.尿酸水平升高

C.X 线片示骶骨关节炎

D.尿渗透压降低

E.关节腔穿刺液呈脓性

RXCS-U3-096.女, 55 岁。里急后重伴排便不尽感 5 个月, 大便带血近 1 个月, 查体:T 36.5 °C, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80 mmHg, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿啰音, 心率 80 次/分, 心律齐, 腹软, 无压痛, 直肠指诊: 膝胸位, 进指 6 cm, 于直肠右侧壁触及柔软光滑有包块。对于诊断最有意义的检查是

A.经阴道 B 超

B.盆腔 CT

C.结肠 X 线钡剂灌肠检查

D.经直肠 B 超

E.结肠镜

RXCS-U3-097.男, 32 岁。因十二指肠溃疡行毕 II 式胃大部切除术后 6 个月。术后出现反酸、烧心症状。应用抑酸剂治疗无效。上述症状逐渐加重, 并呕吐胆汁样物, 上腹部及胸骨后灼烧样疼痛, 体重减轻。查体: T 36.5 °C, P 80 次/分, BP 120/80 mmHg, 贫血貌, 消瘦, 营养不良, 巩膜无黄染, 心肺查体未见异常。胃镜检查见黏膜充血、水肿、糜烂, 胃液中无游离酸, 最适当的治疗措施是

A.采取少食多餐方式

B.行 Roux-en-Y 胃空肠吻合术

C.长期应用消胆胺治疗

D.应用 H₂ 受体拮抗剂

E.注意餐后平卧

RXCS-U3-098.男, 7岁。发热、头痛、恶心、呕吐 2 天, 嗜睡 1 天。查体:T 39.5 °C,浅昏迷, 瞳孔等大, 对光反射存在, 腹部可见多个出血点, 颈抵抗(+), 克氏症 (+)。实验室检查: 血 WBC 19×10⁹/L, N 0.85。最可能的诊断是

- A.结核性脑膜炎
- B.流行性脑脊髓膜炎
- C.流行性乙脑炎
- D.中毒型细菌性痢疾
- E.肾综合征出血热

RXCS-U3-099.女, 35岁。右下腹痛、便秘 1 年。查体: T 36.5 °C,P 80 次/分, R 16 次/分, BP 110/70 mmHg。双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心率齐, 腹软, 无压痛。结肠镜检查: 回肠末端及升结肠起始部多发纵行溃疡, 溃疡间黏膜大致正常, 病变呈节段性。PPD 试验阴性。最可能的诊断是

- A.克罗恩病
- B.阿米巴肠病
- C.肠结核
- D.溃疡性结肠炎
- E.结肠癌

RXCS-U3-100.女, 45岁。突发右下腹痛伴呕吐, 停止排气排便 7 小时, 查体: P 110 次/分, BP 130/80 mmHg, 右侧腹股沟韧带下方卵圆窝处可触及半球形包块, 压痛明显, 不能还纳。正确的处理是

- A.立即扩容补液
- B.手法还纳包块
- C.应用吗啡, 缓解疼痛
- D.密切观察病情变化
- E.立即手术治疗

RXCS-U3-101.男, 62岁。上腹胀、隐痛 2 个月, 伴食欲减退、乏力、消瘦、大便发黑。查体: 消瘦, 浅表淋巴结无肿大, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿啰音, 心律齐, 腹软, 无压痛。上消化道钡剂造影见胃窦部小弯侧黏膜紊乱, 可见直径 3.5 cm, 不规则充盈缺损, 胃壁僵直。其最常见的扩散转移途径是

- A.直接浸润
- B.腹腔内种植
- C.胃肠道内转移
- D.淋巴结转移
- E.血行转移

RXCS-U3-102.男, 62岁。上腹痛 10 天。既往高血压病史 10 余年, 反复心前区疼痛发作 2 个月, 口服阿司匹林 100 mg/d、降压药物、他汀类降脂药等治疗。查体: T 36.5 °C,P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80 mmHg, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿啰音, 心率齐, 腹软, 无压痛。上消化道 X 线钡剂造影: 胃角切迹壁外龛影。13C 尿素呼气试验阴性。最适宜的治疗药物是

- A.氢氧化铝
- B.雷尼替丁
- C.枸橼酸铋钾
- D.多潘立酮
- E.奥美拉唑

RXCS-U3-103.男, 45 岁。骑车时摔倒。左前臂可见皮肤破损、肿胀。查体: T 36.5 °C, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80 mmHg, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿啰音, 心率齐, 腹软, 无压痛。血常规: Hb 120 g/L, WBC $9.6 \times 10^9/L$ 。X 线提示左前臂桡骨中段骨折。其创伤按伤情分类是

- A. 中度闭合伤
- B. 轻度开放伤
- C. 重度闭合伤
- D. 中度开放伤
- E. 轻度闭合伤

RXCS-U3-104.女, 28 岁。阴道分泌物增多 5 天。有不洁性病史。检查: 右侧大阴唇可见: 1.0 cm × 1.0 cm、质硬、无痛隆起物。本例最可能的诊断是

- A. 巨细胞病毒感染
- B. 淋病
- C. 生殖器疱疹
- D. 尖锐湿疣
- E. 梅毒

RXCS-U3-105.男, 55 岁。10 年前诊断为肝炎肝硬化, 3 年前行门腔静脉分流术, 2 天前出现睡眠倒错、计算能力下降。该患者不宜进食的食物种类是

- A. 淀粉类食物
- B. 低脂饮食
- C. 高维生素食物
- D. 高纤维素食物
- E. 高蛋白饮食

A3/A4 型题

(106~107 题共用题干)

男, 32 岁。后背及双上臂沸水烫伤 4 小时, 查体: T 37.4 °C, P 100 次/分, R 20 次/分, BP 130/90 mmHg, 意识清楚, 后背及双上臂背侧红肿明显, 大量水疱, 基底发红, 疼痛明显。

RXCS-U3-106.该患者皮肤烧成的深度和分度

- A. 浅 II° 中度烧伤
- B. 深 II° 轻度烧伤
- C. 深 II° 重度烧伤
- D. 浅 II° 轻度烧伤
- E. 深 II° 中度烧伤

RXCS-U3-107.对该患者创面的处理措施正确的是

- A. 干燥无菌纱布覆盖包扎
- B. 70%酒精消毒创面
- C. 剪除水疱的皮
- D. 患肢包扎固定
- E. 穿刺抽出疱液

(108~109 题共用题干)

男, 45 岁。1 个月前出现腹胀, 无呕吐, 伴发热, 体温最高 38 °C, 夜间盗汗, 12 小时前突发腹部绞痛, 未排气排便, 查体: T 37.7 °C, P 88 次/分, R 16 次/分, BP 110/80 mmHg, 心肺查体未见异常, 腹部呈揉面感, 可见肠型及蠕动波, 肠鸣音亢进。

RXCS-U3-108.该患者最可能的诊断是

- A.淋巴瘤合并肠梗阻
- B.家族性息肉病
- C.溃疡性结肠炎
- D.结肠癌合并肠梗阻
- E.结核性腹膜炎合并肠梗阻

RXCS-U3-109.目前该患者首选的检查是

- A.血沉
- B.结肠镜
- C.立位腹部 X 线平片
- D.腹部 B 超
- E.腹部 CT

(110~112 题共用题干)

女, 72 岁, 胃癌根治术后第 6 天, 出现上腹剧烈疼痛, 逐渐加重, 伴恶心, 呕吐, 腹胀, 腹腔引流管引出咖啡色浑浊液体。查体: 腹膜刺激征 (+)。腹部 B 超提示腹腔积液。

RXCS-U3-110.最可能的诊断是

- A.肠系膜血管缺血性疾病
- B.急性胰腺炎
- C.急性胆囊炎
- D.急性梗阻性化脓性胆管炎
- E.吻合口漏

RXCS-U3-111.应采取的治疗措施中不包括

- A.进食
- B.应用生长抑素
- C.肠外营养支持
- D.吗啡止痛
- E.胃肠减压

RXCS-U3-112.针对该患者, 非手术中最重要的措施是

- A.低压灌肠
- B.止痛
- C.胃肠减压
- D.洗胃
- E.抗生素治疗

(113~114 题共用题干)

男, 45 岁。因急性坏疽性阑尾炎行阑尾切除术后第 10 天, 出现发热, 体温 39.2 °C。伴腹胀、恶心, 肛门有下坠感, 里急后重, 曾排便 4 次, 为黏液样便。

RXCS-U3-113.此时首先应选用的检查是

- A.腹部 X 线平片
- B.粪培养
- C.血常规
- D.腹部 B 超
- E.直肠指检

RXCS-U3-114.诊断明确后, 除抗感染和支持疗法外, 以下处理措施首选

- A.腹部透热理疗
- B.温盐水加甲硝唑保留灌肠

- C.经直肠穿刺抽液定位后切开引流
- D.经原麦氏切口进入腹腔引流
- E.经下腹正中切口进入腹腔引流

(115~116 题共用题干)

女, 35 岁。腹泻、纳差、乏力、发热 5 月余。大便为黄色糊状, 无黏液及脓血, 3~5 次/日, 体温 37.5~38.0 °C。发病以来体重减轻约 8 kg。

RXCS-U3-115. 下列辅助检查最有助于明确诊断的是

- A.腹部 CT
- B.结肠镜及黏膜活组织病理检查
- C.胶囊内镜
- D.下消化道 X 线钡剂造影
- E.PPD 试验

RXCS-U3-116. 最可能的诊断是

- A.阿米巴肠病
- B.结肠癌
- C.溃疡性结肠炎
- D.肠结核
- E.克罗恩病

(117~118 题共用题干)

男, 55 岁。颈后肿痛 5 天。疼痛逐渐加重, 伴畏寒、发热。既往糖尿病病史 10 年。查体: T 38.5 °C, P 90 次/分, R 18 次/分, BP 120/80 mmHg, 颈后红肿, 范围约 5 cm, 边界不清, 中央多个脓点。双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐。

RXCS-U3-117. 该患者最可能的诊断是

- A.皮脂腺囊肿感染
- B.痈
- C.疔
- D.急性蜂窝织炎
- E.丹毒

RXCS-U3-118. 若行切开引流术, 下列处理措施错误的是

- A.切口要深达筋膜
- B.切口长度不要超过病变边缘
- C.可行“++”形切口切开引流
- D.未化脓但失活的组织也要清除
- E.术后创面内填塞敷料压迫止血

(119~121 题共用题干)

男, 32 岁。发热、头痛伴呕吐 2 天, 意识障碍半天, 于 8 月 20 日就诊。查体: T 39.6 °C, P 130 次/分, R 23 次/分, BP 125/70 mmHg, 浅昏迷, 皮肤未见瘀点, 颈抵抗 (+), Kernig 征 (+), Babinski 征 (+)。实验室检查: 血 WBC 16.0×10⁹/L, N 0.73, L 0.27。

RXCS-U3-119. 最可能的诊断是

- A.结核性脑膜炎
- B.流行性乙型脑炎
- C.新型隐球菌脑膜炎
- D.病毒性脑炎
- E.流行性脑脊髓膜炎

RXCS-U3-120.对明确诊断最有价值的检查

- A.头颅 CT
- B.血清特异性 IgM
- C.脑脊液培养
- D.隐球菌抗原
- E.血培养

RXCS-U3-121.目前迫切需要采取的措施是

- A.静脉点滴抗生素
- B.物理降温
- C.快速静脉点滴甘露醇
- D.静脉高营养
- E.快速镇静

(122~124 题共用题干)

男，72 岁。1 年来阵发性腹痛，自觉有“气块”在腹中窜动，大便次数增加，近 3 个月腹胀、便秘，近 3 天无肛门排气、排便，呕吐物有粪便臭味，伴乏力、低热。

RXCS-U3-122.根据病史考虑肠梗阻类型为

- A.低位不完全梗阻
- B.高位完全梗阻
- C.高位不完全梗阻
- D.低位完全梗阻
- E.血运性肠梗阻

RXCS-U3-123.引起该患者梗阻的病因最可能的是

- A.粪块
- B.肿瘤
- C.炎性狭窄
- D.肠系膜血栓
- E.粘连带

RXCS-U3-124.禁忌使用的检查是

- A.结肠镜
- B.腹部 CT
- C.腹部 B 超
- D.上消化道 X 线钡剂造影
- E.腹部 X 线平片

(125~126 题共用题干)

男，45 岁。近 3 个月自觉轻度乏力、母亲 HBsAg(+)。实验室检查：血 ALT 420 U/L, TBil 64 μ mol/L, PTA 88%, HBsAg(+), HBeAg(+), 抗 HBe(+), HBVDNA 4.5×10^5 拷贝/mL。

RXCS-U3-125.首选的治疗药物是

- A.恩替卡韦
- B.护肝片
- C.茵栀黄口服液
- D.甘草酸二胺
- E.干扰素

RXCS-U3-126.化验结果正常后的随访问隔时间最好是

- A.30 天

- B.15 天
- C.180 天
- D.60 天
- E.90 天

(127~128 题共用题干)

女, 35 岁。间断腹痛、腹泻 5 年, 发作时大便 3~5 次/日, 带黏液, 无脓血, 便后腹痛缓解, 受凉及紧张后症状加重, 无发热, 抗生素治疗无效, 发病以来体重无明显变化。粪隐血试验阴性。

RXCS-U3-127.为确定诊断,首选的检查是

- A.小肠 X 线钡剂造影
- B.腹部 CT
- C.结肠镜
- D.粪细菌培养
- E.腹部 B 超

RXCS-U3-128.最可能的诊断是

- A.溃疡性结肠炎
- B.克罗恩病
- C.慢性细菌性痢疾
- D.肠结核
- E.肠易激综合征

(129~130 题共用题干)

女, 55 岁。左乳房包块半年。乳房无不适, 有时感左肩背部隐痛。查体: 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 腹软, 无压痛。左乳房外上象限可触及 3 cm×2 cm 包块, 质硬, 不光滑, 活动, 无压痛。左腋窝触及 3 枚肿大淋巴结。乳腺钼靶摄片: 左乳房 2.5 cm×2.0 cm 高密度影, 周边有毛刺, 中央有细沙样钙化点。

RXCS-U3-129.拟行手术治疗, 预防术后感染最重要的措施是

- A.安置有效的术后引流
- B.术前、术中、术后应用广谱抗生素
- C.遵守无菌操作
- D.缝合前彻底冲洗
- E.术前纠正贫血和低蛋白血症

RXCS-U3-130.【假设信息】患者术后 2 年出现腰背部疼痛, 逐渐加重, 为明确诊断首选的主要检查是

- A.血 CEA
- B.血 CA153
- C.免疫指标检测
- D.同位素骨扫描
- E.PET-CT

(131~133 题共用题干)

男, 55 岁。上腹疼痛 8 小时, 进食高脂餐并饮酒后出现上腹痛, 呕吐 2 次后疼痛无缓解。查体:T 37.8 °C, 巩膜轻度黄染, 心肺未见异常, 上腹偏左压痛、反跳痛阳性。

RXCS-U3-131.最有诊断意义的辅助检查是

- A.心电图
- B.血常规

- C.血清脂肪酶
- D.血清淀粉酶
- E.立位腹部 X 线平片

RXCS-U3-132.最可能的诊断是

- A.急性心肌梗死
- B.急性胰腺炎
- C.肠梗阻
- D.急性胃炎
- E.急性胆囊炎

RXCS-U3-133.若血 WBC $17.5 \times 10^9/L$, N 0.85, 抗生素选择的最佳配伍是甲硝唑和

- A.环丙沙星
- B.青霉素
- C.阿奇霉素
- D.克林霉素
- E.亚胺培南

(134~135 题共用题干)

女, 45 岁。双手近端指间关节, 双腕和双踝关节肿痛 5 个月。查体: 双手近端指间关节压痛 (+), 实验室检查: ESR 45 mm/h, RF 阳性, 抗环瓜氨酸肽抗体阳性。

RXCS-U3-134.最可能的诊断是

- A.骨关节炎
- B.类风湿关节炎
- C.痛风关节炎
- D.脊柱关节炎
- E.系统性红斑狼疮

RXCS-U3-135.控制病情进展首选的药物是

- A.甲氨蝶呤
- B.布洛芬
- C.阿司匹林
- D.环磷酰胺
- E.泼尼松

(136~138 题共用题干)

男, 32 岁。反复皮肤紫癜 1 个月, 加重并腹痛 2 天。查体: 四肢皮肤散在紫癜, 心肺未见异常, 腹平软, 脐周轻压痛, 无反跳痛和肌紧张, 肝脾肋下未触及, 肠鸣音 6 次/分。临床诊断为过敏性紫癜。

RXCS-U3-136.根据目前的临床资料, 首选考虑最可能的临床类型是

- A.单纯型
- B.肾型
- C.混合型
- D.Schonlein 型
- E.Henoch 型

RXCS-U3-137.可证实上述诊断类型的检查结果是

- A.大关节肿胀, 有压痛
- B.尿常规异常(血尿、蛋白尿、管型尿)
- C.粪常规异常(有红细胞, 隐血阳性)

D.粪隐血阳性、尿沉渣镜检红细胞 6~8/HP

E.毛细血管脆性试验

RXCS-U3-138.该患者目前不适合的治疗药物是

A.维生素 C

B.泼尼松

C.芦丁片

D.山莨菪碱

E.低分子肝素

B1 型题

(139~140 题共用备选答案)

A.血间接胆红素升高，直接胆红素正常

B.尿胆原弱阳性，尿胆红素阴性

C.尿含铁血黄素阳性

D.血直接、间接胆红素均升高，尿胆原阳性

E.血直接胆红素升高，尿胆原阴性

RXCS-U3-139.与肝细胞性黄疸检查结果符合的是

RXCS-U3-140.与梗阻性黄疸检查结果符合的是

(141~142 题共用备选答案)

A.苍白密螺旋体

B.淋病奈瑟菌

C.人乳头瘤病毒

D.沙眼衣原体

E.单纯疱疹病毒

RXCS-U3-141.导致生殖道尖锐湿疣并且与宫颈癌发病有关的病原体是

RXCS-U3-142.引起生殖器水泡样病变的病原体是

(143~144 题共用备选答案)

A.羊

B.犬

C.啮齿动物

D.猪

E.患者

RXCS-U3-143.肾综合征出血热的传染源是

RXCS-U3-144.流行性乙型脑炎的传染源是

(145~146 题共用备选答案)

A.肝左下后间隙

B.肝左上间隙

C.肝右下间隙

D.肝左下前间隙

E.肝右上间隙

RXCS-U3-145.网膜囊位置在

RXCS-U3-146.位于肝胃韧带和胃前方的间隙为

(147~148 题共用备选答案)

A.麻痹性肠梗阻

B.单纯性肠梗阻

- C.痉挛性肠梗阻
- D.绞窄性肠梗阻
- E.机械性肠梗阻

RXCS-U3-147.急性小肠扭转一般应及时手术治疗因为其易发生

RXCS-U3-148.外伤性腹膜后巨大血肿易发生

(149~150 题共用备选答案)

- A.假性粒细胞减少
- B.Felty 综合征
- C.低增生性白细胞
- D.巨幼细胞贫血
- E.骨髓增生异常综合征

RXCS-U3-149.由免疫机制引起中性粒细胞减少的疾病是

RXCS-U3-150.由分布异常引起中性粒细胞减少的疾病是

第四单元

A1 型题

RXCS-U4-001.按计划免疫接种程序, 半岁以内需接种的疫苗不包括

- A.百-白-破三联混合疫苗
- B.乙肝疫苗
- C.卡介苗
- D.麻疹疫苗
- E.脊髓灰质炎减毒活疫苗

RXCS-U4-002.常伴有 AFP 升高的卵巢肿瘤是

- A.卵黄囊瘤
- B.颗粒细胞瘤
- C.成熟性畸胎瘤
- D.无性细胞瘤
- E.上皮性肿瘤

RXCS-U4-003.下列关于胎方位的描述正确的是

- A.指最先进入母体骨盆入口的胎儿部分
- B.指胎儿先露部指示点与母体骨盆的关系
- C.指母体纵轴与胎儿纵轴的关系
- D.指胎儿头部与母体骨盆的关系
- E.指胎儿在腹腔中的各种姿势

RXCS-U4-004.有先兆偏头痛最常见的先兆是

- A.听觉先兆
- B.视觉先兆
- C.感觉先兆
- D.言语先兆
- E.运动先兆

RXCS-U4-005.小儿生长发育的规律不包括

- A.个体差异
- B.各器官系统发育不平衡
- C.连续性、非匀速性、阶段性
- D.自下而上

E.两个高峰期

RXCS-U4-006.妊娠剧吐不能进食者，为预防 Wernicke 综合征，应补充的维生素是

- A.维生素 E
- B.维生素 A
- C.维生素 B1
- D.维生素 B6
- E.维生素 C

RXCS-U4-007.下列提示胎盘功能正常的情况是

- A.血清胎盘生乳素突然降低 50%
- B.NST 试验无反应型
- C.胎动<10 次/12 小时
- D.OCT 试验阳性
- E.尿雌激素/肌酐比值>15

RXCS-U4-008.外阴阴道假丝酵母菌病最主要传染途径是

- A.直接传染
- B.血行传染
- C.间接传染
- D.内源性传染
- E.性交传染

RXCS-U4-009.下列提示颅后窝骨折的临床表现是

- A.视神经损伤
- B.Battle 征
- C.嗅神经损伤
- D.眼镜征
- E.脑脊液鼻漏

RXCS-U4-010.判断新生儿缺血缺氧性脑病严重程度的主要依据是

- A.血清 CPK-BB
- B.脑电图
- C.颅脑超声
- D.临床表现
- E.头颅 CT

RXCS-U4-011.吉兰-巴雷综合征的脑脊液蛋白-细胞分离是指

- A.蛋白增高，细胞数正常
- B.蛋白增高，细胞数降低
- C.蛋白正常，细胞数正常
- D.蛋白降低，细胞数正常
- E.蛋白正常，细胞数增高

RXCS-U4-012.早产儿出生后立即出现进行性呼吸困难，最可能发生的疾病是

- A.先天性心脏病
- B.胎粪吸入综合征
- C.吸入性肺炎
- D.湿肺
- E.新生儿呼吸窘迫综合征

RXCS-U4-013.不符合神经症性障碍共同特点的是

A. 症状可有相应的器质性病变

B. 患者常有一定的易感素质

C. 与心理社会因素有关

D. 多无明显的精神病性症状

E. 多数患者对疾病有自知力

RXCS-U4-014. 制备洗涤红细胞的主要目的是

A. 去除血小板

B. 去除血浆蛋白

C. 去除细菌

D. 去除红细胞碎片

E. 去除白细胞

RXCS-U4-015. 维生素 D 缺乏性佝偻病早期诊断的可靠指标是

A. 血碱性磷酸酶

B. 血 25-(OH) D₃

C. 血钙

D. 血钙磷乘积

E. 血磷

RXCS-U4-016. 早产的常见病因是

A. 胎儿畸形

B. 下生殖道感染

C. 头盆不称

D. 遗传因素

E. 孕激素水平升高

RXCS-U4-017. 导致输卵管妊娠的主要病因是

A. 输卵管妊娠史

B. 辅助生殖技术

C. 输卵管炎症

D. 输卵管发育不良或功能异常

E. 剖宫产史

RXCS-U4-018. 较少出现精神病性症状的疾病状态是

A. 强迫状态

B. 幻觉状态

C. 兴奋状态

D. 妄想状态

E. 谵妄状态

RXCS-U4-019. 属于正细胞正色素性贫血的疾病是

A. 慢性失血性贫血

B. 营养性巨幼细胞性贫血

C. 缺铁性贫血

D. 地中海贫血

E. 急性溶血性贫血

RXCS-U4-020. 关于子宫内膜癌的描述，正确的是

A. 透明细胞癌是最常见的病理类型

B. 非激素依赖型比激素依赖型预后差

- C.早期患者首选治疗方法是放射治疗
D.肿瘤侵及直肠黏膜时，分期为 IVB
E.血行转移是最常见的转移途径
- RXCS-U4-021.下列导致胎儿生长受限的因素最常见的是
- A.妊娠期糖尿病
B.多次刮宫导致宫腔粘连
C.妊娠期高血压疾病
D.合并卵巢小囊肿
E.羊水过多
- RXCS-U4-022.脑血栓形成最常见的病因是
- A.高血压病
B.脑动脉粥样硬化
C.血压偏低
D.各种脑动脉炎
E.红细胞增多症
- RXCS-U4-023.含铜 IUD 的主要作用机制不包括
- A.压迫局部子宫内膜产生炎症反应
B.影响子宫内膜细胞糖原代谢和雌激素摄入
C.使受精卵运行速度与子宫内膜发育不同步
D.铜离子使精子头尾分离，不得获能
E.使宫颈黏液稠厚，不利于精子穿透
- RXCS-U4-024.苯丙酮尿症患者主要的神经系统异常表现是
- A.智能发育落后
B.肌张力增高
C.腱反射亢进
D.行为异常
E.惊厥
- RXCS-U4-025.出生后即有且终生存在的神经反射是
- A.拥抱反射
B.膝腱反射
C.握持反射
D.觅食反射
E.腹壁反射
- RXCS-U4-026.Fisher 综合征的最主要临床特征是
- A.眼外肌麻痹、共济失调、腱反射消失
B.四肢弛缓性瘫痪伴眼外肌麻痹
C.双侧对称性眼外肌和面肌麻痹
D.由下肢逐渐向上肢进展的对称性弛缓性瘫痪
E.四肢对称性弛缓性瘫痪伴双侧面瘫
- RXCS-U4-027.超低出生体重新生儿的出生体重低于
- A.1 000 g
B.2 500 g
C.1 500 g
D.800 g

E.2 000 g

RXCS-U4-028.既往月经规律，妊娠 42+5 周，下列情况最不可能出现的是

- A.羊水增多
- B.羊水粪染
- C.胎儿生长受限
- D.胎盘功能正常
- E.胎儿过熟综合征

RXCS-U4-029.健康育龄妇女出现恶心、食欲减退等消化道症状，问诊时不应忽视的是

- A.月经史
- B.传染病史
- C.肝炎病史
- D.不洁饮食史
- E.胃炎病史

RXCS-U4-030.对雌激素生理作用的叙述，正确的是

- A.抑制子宫收缩
- B.促进水钠潴留，维持和促进骨基质代谢
- C.抑制输卵管平滑肌节律性收缩的振幅
- D.加快阴道上皮细胞脱落
- E.使宫颈口闭合，黏液分泌减少、变黏稠

RXCS-U4-031.重症肌无力患者应避免应用的药物是

- A.头孢噻肟
- B.免疫球蛋白 G
- C.青霉素
- D.盐酸小檗碱
- E.万古霉素

RXCS-U4-032.蛋白质-能量营养不良患儿最先出现的表现是

- A.身高低于正常
- B.皮下脂肪消失
- C.体重不增
- D.体重减轻
- E.水肿

RXCS-U4-033.水痘最常见的并发症为

- A.败血症
- B.心肌炎
- C.皮肤继发细菌感染
- D.肺炎
- E.脑炎

RXCS-U4-034.导致儿童风湿热的最常见病原体是

- A.肺炎克雷伯杆菌
- B.流感嗜血杆菌
- C.大肠埃希菌
- D.A 组乙型溶血性链球菌
- E.肺炎链球菌

RXCS-U4-035.下列关于小儿免疫系统的说法，错误的是

A. IgM 不能通过胎盘

B. IgG 不能通过胎盘

C. 脐血 IgM 水平过高，提示可能有宫内感染

D. 新生儿时期各种 T 细胞亚群功能均显不足

E. 新生儿 B 淋巴细胞发育已完善，但不成熟

RXCS-U4-036. 心境障碍临床类型不包括

A. 环性心境障碍

B. 恶劣心境障碍

C. 躁狂发作

D. 抑郁发作

E. 惊恐发作

RXCS-U4-037. 小儿生理性贫血发生的时期是在出生后

A. 7~8 个月

B. 2~3 个月

C. 6~7 个月

D. 1 个月内

E. 4~5 个月

RXCS-U4-038. 新生儿窒息复苏评估的三大指标是

A. 呼吸，心率，哭声

B. 心率，呼吸，皮肤颜色

C. 呼吸，皮肤颜色，哭声

D. 心率，呼吸，肌张力

E. 心率，皮肤颜色，肌张力

RXCS-U4-039. 诊断脑出血最迅速、最可靠的检查是

A. 脑电图

B. 脑血管造影

C. 脑脊液检测

D. 头颅 CT

E. 头颅 MRI

RXCS-U4-040. 下列关于 PPD 试验的说法最准确的是

A. 卡介苗接种成功，PPD 试验呈强阳性

B. 粟粒型肺结核 PPD 试验有时可呈阴性

C. 凡是 PPD 试验阴性可除外结核病

D. PPD 试验阳性可肯定有结核病

E. 初次感染结核菌后 2 周，PPD 试验呈阳性

A2 型题

RXCS-U4-041. 男，20 岁，大二学生。两周来突然兴奋话多，言语夸大，说自己是中国的乔布斯，开了很多家公司，每个都可以进入世界 500 强。连夜搞发明创造，吃饭都狼吞虎咽，说要分秒必争，家人朋友劝阻他就发脾气，说他们弱智，不配与自己说话。针对该患者宜首选的药物是

A. 米氮平

B. 布普品

C. 曲唑酮

D. 碳酸锂

E. 氯氮平

RXCS-U4-042. 女, 31 岁。初孕妇, 妊娠 34 周, 查体: T 36 °C, P 90 次/分, R 18 次/分, BP 120/80 mmHg, 叩诊心浊音界稍向左扩大, 心尖部闻及 2/6 级收缩期吹风样杂音。踝部轻度水肿, 最可能的诊断是

- A. 风湿性心脏病合并妊娠
- B. 正常妊娠改变
- C. 妊娠期高血压疾病性心脏病
- D. 围生期心肌病
- E. 原发性心肌病合并妊娠

RXCS-U4-043. 女, 31 岁。月经不规律 3 年, 闭经 7 月, 溢乳 2 个月。对诊断最有价值的测定项目是

- A. 孕激素
- B. 甲状腺素
- C. 雌激素
- D. 催乳素
- E. 雄激素

RXCS-U4-044. 女, 22 岁。半年前诊断为精神分裂症, 平时服用利培酮治疗。病情稳定, 半月前因与男朋友分手, 情绪低落, 话少。近 3 天加重, 整日躺在床上, 不语不动, 拒绝进食, 常双眼含泪, 家人反复询问下有时能用点头、摇头表示。患者目前首要的处理方法是

- A. 暗示疗法
- B. 认知疗法
- C. 加用抗抑郁药
- D. 电抽搐治疗
- E. 抗精神病药加量

RXCS-U4-045. 男, 12 岁。患再生障碍性贫血半年, 因重度贫血, 需要反复输血, 应输注的血液成分是

- A. 冰冻红细胞
- B. 洗涤红细胞
- C. 去除白细胞的红细胞
- D. 浓缩红细胞
- E. 悬浮红细胞

RXCS-U4-046. 男, 45 岁。行脊柱肿瘤切除术, 术中给予输血, 输注悬浮红细胞 15 分钟后, 血压下降到 70/40 mmHg, 导尿管中的尿液呈酱油色, 患者最可能发生的不良反应是

- A. 严重过敏反应
- B. 输血相关急性肺损伤
- C. 细菌污染反应
- D. 急性溶血性输血反应
- E. 输血相关循环超负荷

RXCS-U4-047. 女, 31 岁。停经 21 周。剧烈腹痛、发热 1 天, 伴恶心、呕吐, 无阴道流血。查体: 宫底平脐, 子宫前壁压痛, 胎心 156 次/分。血 WBC $13 \times 10^9/L$, N 0.78。彩色超声提示单胎妊娠合并子宫肌壁间肌瘤, 肌瘤直径 7 cm。最可能是子宫肌瘤发生

- A. 感染
- B. 肉瘤样变
- C. 玻璃样变

D.红色样变

E.囊性变

RXCS-U4-048.女婴, 8个月。母乳喂养, 未添加辅食。查体: 面色苍白, 肝脾肿大。外周血象: Hb 75 g/L, RBC $3.5 \times 10^{12}/L$, MCV 70 fL, MCH 26 pg, MCHC 30%。其贫血的细胞形态是

A.大细胞性

B.正细胞正色素性

C.正细胞低色素性

D.小细胞低色素性

E.单纯小细胞性

RXCS-U4-049.女, 18岁。未婚, 月经规律, 无停经史, 突发下腹部疼痛伴恶心、呕吐 8 小时。查体: P 78 次/分, BP 100/70 mmHg。直肠腹部触诊: 子宫前位, 正常大, 右侧附件区触及一个 $6\text{ cm} \times 5\text{ cm} \times 5\text{ cm}$ 囊实性包块, 边界清楚, 触痛明显。最可能的诊断是

A.浆膜下子宫肌瘤

B.急性阑尾炎

C.输卵管妊娠破裂

D.卵巢肿瘤蒂扭转

E.卵巢黄体破裂

RXCS-U4-050.男, 31岁。头痛进行性加重 1 个月。入院前 3 天出现喷射状呕吐 3 次, 抽搐 1 次。查体: 神志清楚, 双侧视神经乳头水肿, 颈软。最可能的诊断是

A.蛛网膜下腔出血

B.脑血管畸形

C.脑软化

D.颅内压增高

E.陈旧性脑梗死

RXCS-U4-051.女婴, 10个月。动作发育倒退 2 个月。人工喂养, 未正规添加辅食。查体: 面色蜡黄, 哭时无泪, 舌颤。最可能的诊断是

A.营养性巨幼细胞性贫血

B.脑性瘫痪

C.营养性维生素 D 缺乏性佝偻病

D.蛋白质-能量营养不良

E.缺铁性贫血

RXCS-U4-052.女孩, 2岁。发热 3 天。最高体温 $39\text{ }^{\circ}\text{C}$, 伴流涎、厌食、呕吐。查体: 急性热病容, 咽部充血, 在咽腭弓的黏膜上可见多个 $2\sim 4\text{ mm}$ 大小疱疹, 有的破溃成小溃疡, 该患儿最可能的诊断是

A.疱疹性咽峡炎

B.流行性感

C.疱疹性口腔炎

D.咽结膜热

E.化脓性扁桃体炎

RXCS-U4-053.女, 40岁。瘢痕子宫, 妊娠 39 周, 规律宫缩 8 小时。宫口 6 cm, 先露 S₊1, 突然腹痛加剧。查体: T $37.5\text{ }^{\circ}\text{C}$, P 100 次/分, BP 90/60 mmHg, 宫口 4 cm, 先露 S₋2, 胎心 60 次/分, 2 分钟后胎心消失。最可能的诊断是

A.腹腔感染

B.子宫破裂

- C. 胎盘早剥
- D. 羊水栓塞
- E. 先兆子宫破裂

RXCS-U4-054. 男, 56 岁。近半年工作压力大, 经常出现差错, 刚做过的事就记不起来, 性格变得古怪, 喜怒无常, 有时情绪低落。一次喝了 50 mL 啤酒后, 找不到家而露宿街头。最可能的诊断是

- A. 阿尔茨海默症
- B. 分离(转换)性障碍
- C. 酒精所致遗忘综合征
- D. 躁狂发作
- E. 抑郁发作

RXCS-U4-055. 女婴, 10 天。拒乳 4 天。查体: 周身皮肤明显黄染, 脐部少许脓性分泌物, 前囟平软。实验室检查: 血白细胞 $25.0 \times 10^9/L$, 中性粒细胞 0.80, 淋巴细胞 0.20。该患儿最重要的诊断是

- A. 新生儿肝炎
- B. 新生儿颅内出血
- C. 新生儿脐炎
- D. 新生儿化脓性脑膜炎
- E. 新生儿败血症

RXCS-U4-056. 女婴, 一个月, 生后间断呕吐, 呕吐物为奶液, 体重增长不满意。查体: 可见胃蠕动波, 右上腹触及包块。最可能的诊断是

- A. 先天性巨结肠
- B. 先天性肥厚性幽门狭窄
- C. 胃扭转
- D. 胃食管反流
- E. 幽门痉挛

RXCS-U4-057. 女, 56 岁, G4P2。绝经 5 年, 阴道脱出肿物 4 年, 脱出肿物增大 3 个月。不能自行回缩, 伴排尿困难。妇科检查见宫颈及部分宫体已脱出于阴道口外。妇科超声及泌尿系统超声均未提示异常。适宜的处理为

- A. 阴道全封闭术
- B. 阴道半封闭术
- C. 盆底修复及子宫切除术
- D. 经腹圆韧带缩短术
- E. Manchester 手术

RXCS-U4-058. 男孩, 7 岁。水肿 4 天, 伴血尿、尿少 2 天。查体: P 112 次/分, R 33 次分, BP 120/85 mmHg, 颜面、双下肢明显水肿, 烦躁不安、气促, 双肺底可闻及湿啰音, 肝肋下 1.5 cm。尿常规: 蛋白 (+)。尿沉渣镜检: RBC 25/HP。目前应首选的药物是

- A. 毛花苷丙
- B. 呋塞米
- C. 硝普钠
- D. 地西洋
- E. 青霉素

RXCS-U4-059. 男孩, 6 岁。咳嗽伴喘息 1 天, 无发热。既往有反复喘息发作 4~5 次。其外祖父患有支气管哮喘。查体: 呼吸急促, 可见轻度三凹征, 呼气相延长, 双肺满布哮鸣音。目

前应首选的治疗是

- A.吸入沙丁胺醇
- B.静脉滴注青霉素
- C.口服白三烯调节剂
- D.静脉注射地塞米松
- E.口服西替利嗪

RXCS-U4-060.女, 28岁。初产妇, 妊娠39周, 规律宫缩10小时, 查宫口扩张6cm, LOA, 先露S₊+1, 胎心140次/分, 胎儿监护NST有反应型, 需要进一步的处理是

- A.给予宫颈封闭
- B.催产素加强宫缩
- C.超声评估胎儿大小
- D.严密观察产程
- E.肌注哌替啶

RXCS-U4-061.女, 35岁。妊娠35+2周, 2周前血压升高至160/100mmHg, 未治疗。现突然持续腹痛、逐渐加重, 感头晕、恶心, 阴道有少量流血。查体: T 36.8℃, P 120次/分, BP 100/60mmHg, 呼吸急促。面色苍白, 腹部隆起, 板状腹, 胎方位不清, 未闻及胎心。最可能的诊断是

- A.胎盘早剥
- B.先兆子宫破裂
- C.早产临产
- D.临产伴急性阑尾炎
- E.妊娠合并急性胰腺炎

RXCS-U4-062.女, 35岁。G6P1, 月经量增多3年, 经期及周期正常。妇科检查: 子宫前位, 饱满, 活动度差, 无压痛, 推荐该患者最佳的避孕方法是

- A.避孕套
- B.短效口服避孕药
- C.紧急避孕药
- D.体外排精
- E.惰性宫内节育器

RXCS-U4-063.女, 24岁。经产妇。阴道分娩后72小时, 自觉乳房胀痛, 发热, T 37.5℃, 下腹部阵发性疼痛伴少量阴道流血。正确的处理是

- A.口服镇痛剂
- B.排空乳房
- C.应用抗生素
- D.局部理疗
- E.静脉滴注缩宫素

RXCS-U4-064.男孩, 3岁。剧烈活动后伴气促, 青紫不明显。自幼反复呼吸道感染。查体: BP 90/40mmHg, 胸骨左缘第2肋间可闻及粗糙响亮的连续机器样杂音, 第4肋间可闻及4/6级粗糙的收缩期杂音伴震颤, 心尖区可闻及舒张期隆隆样杂音, P2亢进, 闻及股动脉枪击音, 胸部X线片示左心房及左、右心室增大, 肺动脉段膨隆, 最可能的诊断是

- A.法洛三联症
- B.室间隔缺损+动脉导管未闭
- C.房间隔缺损
- D.动脉导管未闭

E. 室间隔缺损

RXCS-U4-065. 男孩, 1 岁。因身材矮小, 智能发育迟缓就诊。查体: 身高 63 cm, 表情呆滞, 四肢肌张力低下, 眼距宽, 鼻梁低平, 眼外眦上斜, 四肢短, 手指短, 小指内弯。对明确诊断最有意义的检查是

- A. 血氨基酸分析
- B. 染色体核型分析
- C. 血 T3、T4、TSH 测定
- D. 尿三氯化铁试验
- E. 血钙、磷、碱性磷酸酶检测

RXCS-U4-066. 一正常婴儿, 体重 7.5 kg, 身高 68 cm。前囟 1.0 cm, 头围 44 cm, 出牙 4 个。能独坐并能以拇指、示指拿取小球, 该儿最可能的是月龄是

- A. 24 个月
- B. 5 个月
- C. 12 个月
- D. 8 个月
- E. 18 个月

RXCS-U4-067. 女孩, 8 岁。发热, 关节肿痛 2 周, 查体: 皮肤出现环形红斑, 心率 120 次/分, 奔马律。实验室检查提示血沉增快, 经治疗, 上述症状、体征消失。预防复发的方法是

- A. 减少体育运动
- B. 长效青霉素肌注
- C. 忌海鲜
- D. 避免关节损伤
- E. 激素吸入维持

RXCS-U4-068. 女, 56 岁。子宫内膜癌术后 10 天, 病理示低分化子宫内膜样腺癌, 侵及深肌层, 淋巴结无转移, 手术病理分期 I b, 患者合并高血压, 药物控制后血压 120~130/70~80 mmHg, 该患者术后首选的处理是

- A. 中药治疗
- B. 生物治疗
- C. 放射治疗
- D. 随访观察
- E. 内分泌治疗

RXCS-U4-069. 男, 28 岁。头部摔伤, 着力点位于右侧颞枕, 就医时出现“熊猫眼”征, 鼻孔流出血性液体, 最可能的诊断是

- A. 脑震荡
- B. 双眼眼睑挫伤
- C. 颅前窝骨折
- D. 双睑结膜出血
- E. 双侧视神经损伤

RXCS-U4-070. 女, 28 岁。妊娠 38 周, B 超示胎儿脐带绕颈 2 周, 拟行剖宫产术。4 年前曾因外伤住院, 接受输血后出现严重过敏反应, 孕妇一般状况好, 心、肝、肾功能正常。化验 Hb 100 g/L, 术前拟申请备血 400 mL, 应选择的血液成分是

- A. 新鲜冰冻血浆
- B. 冷沉淀
- C. 悬浮红细胞

D.洗涤红细胞

E.浓缩血小板

RXCS-U4-071.女, 31岁。G3P1, 剖宫产史。因妊娠50天行人工流产负压吸引术, 术中患者突感胸闷、头晕、大汗淋漓、下腹坠痛伴恶心。查体: P 49次/分, BP 90/60 mmHg, 面色苍白, 阴道少量流血。首先应考虑的诊断是

A.子宫穿孔

B.羊水栓塞

C.人工流产综合反应

D.失血性休克

E.急性腹膜炎

RXCS-U4-072.女, 22岁。妊娠34周, 剧烈头痛伴抽搐1次, 查体: BP 180/120 mmHg, 全身水肿, 无宫缩, LOA, 胎心150次/分。尿蛋白(++), 首选的处理方法是

A.静脉滴注白蛋白

B.静脉滴注小剂量缩宫素

C.静脉注射呋塞米

D.静脉注射西地兰

E.静脉滴注硫酸镁

RXCS-U4-073.男, 31岁。夏天突然四肢抽搐, 强直, 口吐白沫, 小便失禁。整个发作约3分钟, 事后无回忆。发作间歇期查体无异常, 最可能的诊断是

A.癔症

B.癫痫

C.晕厥

D.脑血管意外

E.中暑

RXCS-U4-074.女, 56岁。下腹不适、腹胀半年, 发现腰部包块1个月, 3年前行胃癌根治术, 病理为胃窦部腺癌。妇科检查: 外阴、阴道正常, 宫颈光滑, 萎缩, 子宫正常大小, 双侧附件区各触及一个约8 cm×6 cm×5 cm大小的椭圆形包块, 移动性浊音(-)。最可能的诊断是

A.卵巢无性细胞瘤

B.卵巢畸胎瘤

C.卵巢上皮性癌

D.卵巢纤维瘤

E.库肯勃瘤

RXCS-U4-075.男孩, 5岁。持续高热1周。查体: T 39℃, P 128次/分, R 36次/分。热病容, 双眼结合膜出血, 口唇干裂, 可见草莓舌, 皮肤呈弥漫性红斑, 颈部浅表淋巴结肿大, 心音有力, 手足指趾硬性水肿。最可能的诊断是

A.败血症

B.手足口病

C.川崎病

D.风湿热

E.猩红热

RXCS-U4-076.女, 31岁。G0P0。停经85天, 阴道不规则流血10余天。恶心、呕吐较重, 伴下腹隐痛, 无咳嗽、咯血。妇科检查: 阴道黏膜未见异常, 宫颈光滑, 宫口可见血液流出, 宫底平脐, 质软, 未触及胎体, 未闻及胎心。血hCG 100 000 U/L。应首先考虑的诊断是

- A.先兆流产
- B.葡萄胎
- C.侵蚀性葡萄胎
- D.绒癌
- E.死胎

RXCS-U4-077.女, 28岁。初孕妇, 身高 147 cm。妊娠 41 周, 规律宫缩 12 小时后孕妇紧张、乏力, BP 140/90 mmHg, 胎心率 140 次/分, 枕左前位, 先露 S=-1, 宫口开大 9 cm, 羊水清亮, 坐骨棘间径 8 cm。该患者正确的处理是

- A.人工破膜加速胎头下降
- B.胎头吸引
- C.剖宫产
- D.徒手旋转胎头
- E.产钳助娩

RXCS-U4-078.女, 28岁。初产妇。双胎妊娠, 妊娠 39 周临产。P 90 次/分, BP 140/80 mmHg。规律宫缩 10 小时后宫口开全, 第一胎儿头位娩出, 新生儿体重 2 600g。第二胎儿为单臀先露, 已衔接, 胎心正常。本例恰当的处理措施是

- A.行外转胎位术
- B.产钳牵引术
- C.等待臀助娩
- D.行内转胎位术
- E.立即剖宫产术

RXCS-U4-079.女, 28岁。初孕妇。妊娠 40 周, 规律宫缩 8 小时, 查体: P 90 次/分, BP 140/80 mmHg, 宫口 7 cm, 先露 S=+1, 胎心 140 次/分。10 分钟后胎膜破裂, 流出清亮液体。正确的处理方法是

- A.立即静脉滴注地塞米松
- B.立即行剖宫产术
- C.立即听胎心
- D.立即静脉滴注硫酸镁
- E.立即静脉滴注缩宫素

RXCS-U4-080.男孩, 6岁。头痛、呕吐, 站立不稳、行走左右摇晃 2 个月。查体: 神志清楚, 精神差, 双侧视乳头水肿。最可能的诊断是

- A.顶叶恶性淋巴瘤
- B.原叶胶质母细胞瘤
- C.小脑髓母细胞瘤
- D.矢状宽旁脑膜瘤
- E.枕叶星形细胞瘤

RXCS-U4-081.女, 16岁。月经初潮后 2 年, 月经周期 1~4 个月, 经量多, 伴血块, 此次阴道流血已 10 天, 仍有大血块, 伴头晕, 血 Hb 70 g/L。妇科超声提示子宫内膜厚度 0.5 cm, 双侧附件未见异常。首选的止血措施是

- A.大剂量雌激素
- B.大剂量雄激素
- C.抗纤溶及促凝药物
- D.诊断性刮宫术
- E.大剂量孕激素

RXCS-U4-082.女, 31 岁。婚后 3 年不孕, 患者平素月经规律, 妇科检查未发现异常, 内分泌检查正常, 造影示双侧输卵管堵塞, 适宜的辅助生育技术是

- A. 植入前遗传学诊断技术
- B. 配子输卵管内移植
- C. 胞浆内单精子注射
- D. 体外受精与胚胎移植
- E. 人工授精

RXCS-U4-083.女, 22 岁。一年来反复洗手、洗衣服, 总担心洗不干净或者碰到脏东西。明知道担心过分却不能自己。为此不能正常工作和做家务, 苦恼万分。该患者最可能的诊断是

- A. 广泛性焦虑障碍
- B. 强迫障碍
- C. 疑病障碍
- D. 恐惧性焦虑障碍
- E. 妄想性障碍

RXCS-U4-084.男, 65 岁。突发头痛、头晕和行走困难 10 小时。既往有高血压和糖尿病史 10 年。查体: 神志清, 颈直抵抗, 对答尚清晰, 双眼可见眼震, 瞳孔等大, 对光反射存在, 无明确面舌瘫和肢体瘫痪, 听力正常, 腱反射对称, 无深浅反射异常, 未引出病理征, 行走步基宽大不稳, 直线行走不能, 该患者的最可能的诊断是

- A. 延髓出血破入脑室
- B. 丘脑出血破入脑室
- C. 小脑出血破入脑室
- D. 原发性脑室出血
- E. 脑桥出血破入脑室

RXCS-U4-085.男, 71 岁。进行性右手震颤、动作迟缓 3 年, 翻身困难 1 年。查体: 面具脸, 右手静止性震颤、四肢肌张力增高, 行走缓慢, 有前列腺增生、轻度肾功能不全和房颤病史。对该患者最恰当的治疗药物是

- A. 复方左旋多巴
- B. 金刚烷胺
- C. 溴隐亭
- D. 丙炔苯丙胺
- E. 安坦

RXCS-U4-086.男, 31 岁。2 天前突发胸背部痛, 继而下肢无力, 麻木, 排尿困难, 无视物双、饮水呛咳、吞咽困难。起病前 1 周有上呼吸道感染史。既往史无特殊。查体: 神清语利。脑神经检查未见异常。双上肢肌力 5 级, 肌张力正常。双下肢肌力 2 级, 肌张力低, 腱反射未引出, 病理征阴性。T4 以下针刺觉减退。最可能的诊断是

- A. 周期性麻痹
- B. 多发性肌炎
- C. 重症肌无力
- D. 急性脊髓炎
- E. 吉兰-巴雷综合征

RXCS-U4-087.女, 35 岁。丈夫嗜赌, 瞒着患者欠下高利贷 200 多万, 被人逼债, 不辞而别。债主上门讨债, 患者得知原委后, 表现与平素判若两人, 口中念念有词, 似神鬼附体, 称自己是大仙, 要为债主摸骨看病, 一会儿又流利地唱着平时不常唱的戏曲唱段, 事后对经过不能完全回忆。未找到器能性疾病证据。发病前性格外向热情。该患者最可能的诊断是

A. 创伤后应激障碍

B. 惊恐障碍

C. 躁狂发作

D. 分离（转换）性障碍

E. 急性短暂性精神病

RXCS-U4-088. 男, 31 岁。突发剧烈头痛 1 小时, 以枕部为著, 伴喷射状呕吐 3 次。查体: 痛苦面容, 全身大汗, 脑膜刺激征阳性。最可能的诊断是

A. 脑脓肿

B. 脑栓塞

C. 脑梗死

D. 蛛网膜下腔出血

E. 急性病毒性脑炎。

RXCS-U4-089. 男, 28 岁。近 1 年来认为自己的五脏六腑已经腐烂、变空了。患者的症状是

A. 幻觉

B. 虚构

C. 虚无妄想

D. 感知综合障碍

E. 错觉

RXCS-U4-090. 女, 31 岁。初产妇。妊娠 40+2 周临产后 1 小时分娩一活婴, 胎儿娩出 35 分钟, 胎盘未娩出, 无阴道流血。查体: P 80 次/分, BP 130/80 mmHg, 子宫轮廓清。此时不恰当的处理方法是

A. 按摩子宫

B. 给予缩宫素

C. 探查宫腔和胎盘

D. 下压宫底并用力牵拉脐带

E. 建立静脉通道

RXCS-U4-091. 初产妇, 28 岁。在家中自然分娩后 15 天, 阴道多量流血 1 天。无寒战、高热。查体: T 37 °C, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 90/60 mmHg, 子宫如妊娠 3 个月大, 质软, 压痛不明显, 宫口松, 能容 2 指。其阴道流血最可能的原因是

A. 胎盘、胎膜残留

B. 子宫脱垂

C. 子宫肌炎

D. 子宫颈裂伤

E. 子宫内膜炎

RXCS-U4-092. 女, 40 岁。当听到家中房子因洪水倒塌的消息后, 突然顿足哭喊, 表情恐惧而紧张, 拿砖头打砸旁边的房子, 反复喊叫“我没有房子啦, 我没有房子啦……”, 1 天后开始逐渐恢复平静。该患者最可能的诊断是

A. 分离（转换）性障碍

B. 急性短暂性精神病性障碍

C. 适应障碍

D. 急性应激障碍

E. 创伤后应激障碍

RXCS-U4-093. 男婴, 3 天。2 天前出现皮肤黄染, 逐渐加重, 1 天来嗜睡拒奶。查体: 反应差, 皮肤重度黄染, 心肺未见异常, 肝肋下 3 cm, 肌张力低下。血 RBC $3.9 \times 10^{12}/L$, Hb 120 g/L,

网织红细胞 0.09，血清总胆红素 359 $\mu\text{mol/L}$ 。最可能的诊断是

- A. 新生儿缺氧缺血性脑病
- B. 新生儿败血症
- C. 新生儿化脓性脑膜炎
- D. 新生儿肝炎
- E. 新生儿溶血病

RXCS-U4-094. 女婴，5 个月。今晨突然面肌、口角及眼角抽动约半分钟，抽后精神好，不发热，不吐。冬季出生，混合喂养，未加辅食。查体：体重 7 kg，会笑，前囟平，有枕秃，双侧巴氏征阳性。最可能的诊断及进一步检查是

- A. 癫痫，做脑电图
- B. 中枢神经系统感染，做腰穿
- C. 低血糖，查血糖
- D. 败血症，做血培养
- E. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症，查血钙

RXCS-U4-095. 女，45 岁。车祸中头部受伤后出现短暂昏迷。1.5 小时后剧烈头痛，频繁呕吐。急诊查体：神志清楚，双侧瞳孔大小多变对光反射迟钝，肢体活动正常。行头颅 CT 检查过程中，发生呼吸骤停。其呼吸骤停最可能的原因是

- A. 脑挫裂伤
- B. 急性颅内血肿并发小脑幕切迹疝
- C. 急性颅后窝血肿并发枕骨大孔疝
- D. 脑干损伤
- E. 脑震荡

RXCS-U4-096. 女孩，2 岁。身材矮小，语言、运动发育落后，平素纳差，便秘。查体：T 36 $^{\circ}\text{C}$ ，P 80 次/分，神志清楚，反应淡漠，眼睑水肿，眼距宽，鼻梁低平，舌大而厚，皮肤粗糙，腹膨隆，未触及包块，四肢短小。心脏超声示心包积液。对诊断最有帮助的检查是

- A. 立位腹部 X 线平片
- B. 骨龄片
- C. 甲状腺功能检查
- D. 血苯丙氨酸测定
- E. 染色体核型分析

RXCS-U4-097. 男婴，5 个月。咳嗽 1 天，发热 3 小时。就诊过程中突然双目凝视，口吐白沫，四肢强直，呼之不应，持续 1~2 分钟缓解。查体：T 39.3 $^{\circ}\text{C}$ 。咽红，心肺腹及神经系统无异常。最可能诊断是

- A. 低钙惊厥
- B. 中毒性脑病
- C. 瘧病
- D. 化脓性脑膜炎
- E. 热性惊厥

RXCS-U4-098. 男孩，3 岁半。发热 2 周，头痛、呕吐 1 周，惊厥 1 次。查体：颈抵抗 (+)，双膝腱反射亢进，巴氏征 (+)。脑脊液检查：WBC $265 \times 106/\text{L}$ ，单核 0.76，多核 0.24，蛋白 1.5 g/L，糖 1.2 mmol/L，氯化物 92 mmol/L。目前最适宜的治疗是

- A. 阿昔洛韦
- B. 头孢曲松+万古霉素
- C. 四联抗结核药物

- D.泼尼松龙
- E.大剂量丙种球蛋白

RXCS-U4-099.男, 31 岁。精神分裂症急性发作入院, 因兴奋躁动、敌对攻击严重, 给予氟哌啶醇 5 mg 一天 2 次肌肉注射。次日患者出现双眼上翻、斜颈、面肌痉挛、角弓反张。此时首选的处理方法是

- A.口服普萘洛尔
- B.口服苯二氮类药物
- C.电抽搐治疗
- D.立即停药
- E.肌肉注射东莨菪碱

A3/A4 型题

(100~102 题共用题干)

男, 45 岁。车祸致左枕部着地, 当即意识丧失, 送至附近医院途中右侧肢体间断性抽搐伴喷射状呕吐 3 次。查体: P 56 次/分, BP 160/95 mmHg, 浅昏迷、躁动, 右侧瞳孔直径约 4 mm, 左侧 2 mm; 对光反射: 左侧存在, 右侧消失; 左侧肌力 3 级, 右侧肌力 5 级; 左枕部头皮血肿, 颈项强直。

RXCS-U4-100.最主要的诊断是

- A.右额急性硬脑膜下血肿伴左小脑幕切迹疝
- B.左额广泛脑挫裂伤伴左小脑幕切迹疝
- C.右额急性硬脑膜下血肿伴右小脑幕切迹疝
- D.左额急性硬脑膜下血肿伴右小脑幕切迹疝
- E.左额急性硬脑膜下血肿伴左小脑幕切迹疝

RXCS-U4-101.颅内出血的来源是

- A.脑表面小血管
- B.板障静脉
- C.硬脑膜中动脉
- D.横窦
- E.下矢状窦

RXCS-U4-102.优先采取的处理措施是

- A.维持呼吸道通畅
- B.注射止血剂和输血
- C.制动并注射镇静剂
- D.给予消炎药和神经营养药
- E.适量输液和给予脱水剂

(103~105 题共用题干)

男孩, 1 岁。发热 3 天, 呕吐 1 次, 抽搐 1 次。既往 6 个月时曾热性惊厥 1 次。按时预防接种, 出生史无特殊。查体: T 38.2 °C, R 30 次/分, BP 90/55 mmHg, 颈抵抗 (+), 双肺听诊未见异常, 心率 130 次/分, 律齐, 腹软, 肝脾肋下未触及, 四肢暖, 肌力、肌张力正常, Babinski 征 (+)。

RXCS-U4-103.初步诊断首先考虑

- A.手足搐搦症
- B.中毒型细菌性痢疾
- C.热性惊厥
- D.发育不全

E.中枢神经系统感染

RXCS-U4-104.为明确诊断，首先进行的检查是

- A.并发脑室管膜炎
- A.腰穿检查脑脊液
- B.粪镜检及培养
- C.脑电图
- D.血培养加药物敏感试验
- E.血钙、磷测定

RXCS-U4-105.【假设信息】抗生素静脉滴注 3 天热退，精神好转。但 1 周后又发热至 38.5 °C 左右，并呕吐，惊厥 1 次，最可能出现的情况是

- A.疾病复发
- B.并发硬膜下积液
- C.院内上呼吸道感染
- D.并发脑脓肿
- E.并发脑积水

（106~108 题共用题干）

女，45 岁，G4P2。月经规律，白带增多半年，性交后阴道流血 2 个月。近 3 年未体检。妇科检查发现宫颈重度糜烂状，触血（+），子宫附件未见明显异常。宫颈活松组织病理报告为宫颈鳞状细胞癌，浸润深度为 7 mm。

RXCS-U4-106.该患者的临床分期是

- A.IB1
- B.IA2
- C.IB2
- D.IA1
- E.IIA

RXCS-U4-107.宜选择的手术方案是

- A.筋膜内全子宫切除术+盆腔淋巴结切除术
- B.筋膜外全子宫切除术+盆腔淋巴结切除术
- C.改良广泛子宫切除术+盆腔淋巴结切除术
- D.广泛宫颈切除术+盆腔淋巴结切除术
- E.广泛子宫切除术+盆腔淋巴结切除术

RXCS-U4-108.如术后组织病理学证实右侧外淋巴结转移，最恰当的处理是

- A.放化疗
- B.观察随访
- C.生物治疗
- D.物理治疗
- E.性激素治疗

（109~112 题共用题干）

女孩，3 岁。生后发现口唇青紫，活动后加剧。平时喜蹲踞，哭吵时有突发呼吸急促，青紫加重，严重时伴晕厥，曾半年内晕厥 2 次，均于清晨或哭吵后发作，经 2~3 分钟自行恢复。今晨又出现晕厥，持续 5 分钟，即来急诊，查体：T 37.0 °C，P 100 次/分，R 22 次/分，BP 82/55 mmHg。神志不清，双肺听诊未见异常，胸骨左缘第 2~4 肋间闻及收缩期杂音，无震颤，肺动脉第二心音减弱。口唇青紫，指、趾甲青紫。杵状指、趾，颈软，神经系统查体无异常

RXCS-U4-109.最可能的诊断为

- A. 房间隔缺损伴轻度肺动脉瓣狭窄
- B. 室间隔缺损伴重度肺动脉高压
- C. 法洛三联症
- D. 完全性大动脉转位
- E. 单纯肺动脉瓣狭窄

RXCS-U4-110. 该疾病最典型的心电图改变是

- A. 右心房扩大
- B. 左心室肥厚
- C. 右心室肥厚
- D. 预激综合征
- E. 不完全性右束支传导阻滞

RXCS-U4-111. 患儿晕厥的原因是

- A. 长期缺氧
- B. 脑血栓形成
- C. 血液黏稠
- D. 肺动脉漏斗部痉挛
- E. 血流缓慢

RXCS-U4-112. 下列抢救措施中不合适的是

- A. 皮下注射吗啡
- B. 静脉注射普萘洛尔
- C. 静脉滴注碳酸氢钠
- D. 口服普萘洛尔
- E. 取胸膝位

(113~115 题共用题干)

男孩，3岁。水肿1周。尿中有泡沫，尿量减少。查体：T 36.7℃，P 120次/分，R 25次/分，BP 90/60 mmHg，眼睑水肿，双下肢凹陷性水肿，双肺呼吸音粗，未闻及啰音，心前区未闻及杂音，腹膨隆，移动性浊音(+)。尿常规：蛋白(3+)，尿沉渣镜检：RBC 0~3/HP，WBC 0~3/HP。血清白蛋白 20 g/L，胆固醇 8.7 mmol/L

RXCS-U4-113. 最可能的诊断是

- A. 泌尿道感染
- B. 急进性肾炎
- C. 肾炎型肾病综合征
- D. 单纯型肾病综合征
- E. 急性肾小球肾炎

RXCS-U4-114. 以下治疗方式不合适的是

- A. 降脂治疗
- B. 少盐饮食
- C. 给予泼尼松治疗
- D. 给予氢氯噻嗪利尿
- E. 给予青霉素抗感染

RXCS-U4-115. 患儿在治疗中出现发热，最常见的原因是

- A. 胃肠炎
- B. 尿路感染
- C. 皮肤丹毒

D.腹膜炎

E.呼吸道感染

(116~118 题共用题干)

女, 28 岁。初孕妇, 平素月经规律。妊娠 40 周, 孕期检查正常, 今自觉胎动减少。查体: T 36.0 °C, P 70 次/分, R 20 次/分, BP 110/70 mmHg。超声检查: 羊水最大暗区 2.5 cm, 指数 7.0 cm。检查: 宫颈管未消失, 宫口未开, 先露-3, 胎心率 120 次/分。

RXCS-U4-116.应进行的检查中不包括

A.胎儿生物物理评分

B.胎儿电子监护

C.MRI

D.尿雌激素/肌酐比值

E.B 超复查

RXCS-U4-117.对该孕妇首选的处理措施是

A.静脉注射地西洋

B.催产素激惹试验 (OCT)

C.米索前列醇引产

D.人工破膜

E.静脉滴注缩宫素引产

RXCS-U4-118.该孕妇临产开始后, 胎心监护示有频繁晚期减速, 最恰当的处理措施是

A.加压给氧

B.待宫口开全产钳助产

C.剖宫产

D.继续观察产程

E.抑制宫缩

(119~120 题共用题干)

女, 22 岁, 在读大学生。于半年前觉得其身材不够苗条, 开始极端的限制饮食, 每餐只吃青菜、水果及极少量米饭, 喝水较少, 称水喝多了会浮肿。体型日渐消瘦, 但其仍认为偏胖。近 1 个月暴饮暴食, 进食后为避免体重反弹而自行催吐, 每周 4~5 次并出现失眠整夜难以入睡情绪低落, 不能坚持上课。

RXCS-U4-119.该患者最可能的诊断是

A.抑郁症伴贪食

B.非器质性失眠症

C.神经性呕吐

D.神经性贪食症

E.神经性厌食症

RXCS-U4-120.对患者的治疗措施不包括

A.小剂量抗精神病药物治疗

B.认知行为治疗

C.抗抑郁药物治疗

D.电抽搐治疗

E.躯体支持治疗

(121~122 题共用题干)

女, 28 岁。婚后 4 年未孕。月经周期 4~5 天/2~3 个月, 量偏少, 身高 156 cm, 体重 75 kg, 面部可见痤疮, 阴毛分布呈男性型。妇科检查: 子宫未见异常, 双侧卵巢稍大。基础体温单

相。

RXCS-U4-121.该患者最可能的诊断是

- A.生殖器结核
- B.多囊卵巢综合征
- C.子宫内膜异位症
- D.黄体功能不足
- E.卵巢早衰

RXCS-U4-122.该患者用氯米酚治疗，最需要注意防止的并发症是

- A.卵巢过度刺激综合征
- B.肝肾功能损害
- C.黄素化卵泡不破裂综合征
- D.卵巢早衰
- E.盆腔炎性疾病

(123~125 题共用题干)

女，31岁。产后5个月，哺乳期，阴道不规则流血半月余，其间咳嗽10天。妇科检查：宫颈前唇有一个2cm×1cm×1cm的紫蓝色结节，子宫如50天妊娠大小，质软，无压痛。双侧附件区各触及一囊性包块，均约6cm×5cm×5cm大小，表面光滑。胸部X线片示双肺中下部多发棉絮状阴影。

RXCS-U4-123.对诊断意义最大的辅助检查是

- A.胸腔镜检查
- B.盆腔B超检查
- C.血清hCG测定
- D.腹部CT检查
- E.血、尿常规检查

RXCS-U4-124.最可能的诊断是

- A.胎盘残留
- B.侵蚀性葡萄胎
- C.绒癌
- D.卵巢肿瘤
- E.肺癌

RXCS-U4-125.首选的治疗方案是

- A.卵巢肿瘤切除术
- B.清宫术
- C.化学治疗
- D.子宫切除术
- E.放射治疗

(126~127 题共用题干)

男，56岁。饮酒史30余年。20年前下岗后饮酒量逐渐增加，每天白酒1斤，从未间断，进食少，体型消瘦。能间断外出打零工，生活基本正常。10余年前常无故怀疑妻子有外遇。近2年记忆力明显下降，易忘事。4天前患者被摩托车撞伤致胫骨骨折，住院拟行手术治疗，故停酒3天。昨晚患者看见地板上有各种虫子在爬，大喊大叫称床底下着火了，紧张害怕。不认识爱人，不知道自己在什么地方。

RXCS-U4-126.该患者目前处于

- A.谵妄状态

- B.幻觉状态
- C.躁狂状态
- D.妄想状态
- E.痴呆状态

RXCS-U4-127.对患者的治疗不正确的是

- A.输液营养支持治疗
- B.苯二氮类药物替代治疗
- C.补充大量 B 族维生素
- D.大剂量抗精神病药物治疗
- E.给予保护性约束

(128~130 题共用题干)

女孩, 1 岁。腹泻 4 天。每日大便 10 余次, 蛋花汤水样便, 伴呕吐、尿少。查体: T 38.5 °C, 前囟、眼窝凹陷, 皮肤弹性差。实验室检查: 血 WBC $6.0 \times 10^9/L$, $Na^{+} 127 \text{ mmol/L}$, $K^{+} 3.7 \text{ mmol/L}$, $BE -5 \text{ mmol/L}$ 。

RXCS-U4-128.最可能的诊断是腹泻病伴

- A.轻度等渗性脱水, 代谢性酸中毒
- B.中度低渗性脱水, 代谢性酸中毒
- C.中度等渗性脱水, 代谢性碱中毒
- D.轻度低渗性脱水, 代谢性碱中毒
- E.重度等渗性脱水, 代谢性碱中毒

RXCS-U4-129.最可能的病原体是

- A.产毒性大肠埃希菌
- B.侵袭性大肠埃希菌
- C.白色念珠菌
- D.金黄色葡萄球菌
- E.轮状病毒

RXCS-U4-130.补液过程中, 患儿突然惊厥, 此时首选的辅助检查是

- A.头颅 CT
- B.头颅 MRI
- C.血电解质
- D.脑脊液
- E.血糖

(131~133 题共用题干)

男, 56 岁。2 年来表现为烦渴多食、多饮、多尿, 体重下降, 疲倦无力, 注意力不集中, 失眠, 情绪低落, 主动性差, 反应迟钝。1 周前出现兴奋不安、言语紊乱而住院。

RXCS-U4-131.下列最有诊断价值的检查是

- A.血常规
- B.尿常规
- C.血糖测定
- D.T3、T4、TSH 测定
- E.ACTH 兴奋试验

RXCS-U4-132.该患者最可能的诊断是

- A.肾上腺皮质功能亢进所致精神障碍
- B.甲状腺功能减退所致精神障碍

- C. 糖尿病所致精神障碍
- D. 肾上腺皮质功能减退所致精神障碍
- E. 甲状腺功能亢进所致精神障碍

RXCS-U4-133. 该患者最重要的治疗是

- A. 控制血糖
- B. 补充雌激素
- C. 补充甲状腺素
- D. 控制精神症状
- E. 应用肾上腺皮质激素

(134~136 题共用题干)

女, 28 岁。经产妇, 人工流产 2 次。妊娠 37 周, 晨起发现阴道流血, 多于月经量, 无腹痛。查体: P 80 次/分, BP 110/70 mmHg, 胎方位 LOA, 头浮, 胎心率 150 次/分, 耻骨联合上可闻及血管音。

RXCS-U4-134. 最可能的诊断是

- A. 前置胎盘
- B. 子宫破裂
- C. 先兆临产
- D. 胎盘早剥
- E. 先兆早产

RXCS-U4-135. 为明确诊断应首先进行的检查是

- A. 肛门指诊
- B. MRI 扫描
- C. 催产素激惹试验 (OCT)
- D. 超声检查
- E. 阴道双合诊

RXCS-U4-136. 本例最适合的处理是

- A. 行剖宫产术
- B. 给予子宫收缩剂
- C. 产钳助娩
- D. 人工破膜
- E. 严密观察, 等待自然临产

B1 型题

(137~138 题共用备选答案)

- A. 猩红热
- B. 水痘
- C. 川崎病
- D. 麻疹
- E. 幼儿急疹

RXCS-U4-137. 男婴, 6 个月。发热 4 天, 热退后出疹。查体: 精神好, 咽部轻度充血, 躯干有较密集红色小丘疹, 疹间皮肤正常, 左侧颈部可触及一个 0.5 cm × 0.5 cm 大小的淋巴结。诊断是

RXCS-U4-138. 男孩, 6 岁。发热伴皮疹 2 天。查体: 咽部充血, 双扁桃体 II 度肿大, 可见脓性分泌物, 杨梅舌, 全身红色鸡皮样疹, 疹间皮肤潮红, 双颌下各可触及一个 1.0 cm × 0.5 cm 大小的淋巴结, 有触痛。诊断是

(139~140 题共用备选答案)

- A.盆腔炎性疾病
- B.子宫内膜异位症
- C.卵巢上皮癌
- D.生殖器结核
- E.输卵管妊娠

RXCS-U4-139.女, 31 岁。取环后 10 天, 发热 3 天。查体: T 38.6 °C, P 98 次/分, R 23 次/分, BP 100/80 mmHg, 宫颈举痛 (+), 子宫压痛, 右侧附件区可触及腊肠型肿物, 触痛明显, 活动度差。该患者最可能的诊断是

RXCS-U4-140.女, 31 岁。婚后 2 年未孕, 性生活正常。既往痛经 5 年。妇科检查: 子宫后倾后屈位, 正常大小, 活动度差, 后穹隆有触痛结节, 子宫左侧可触及直径 5 cm 包块。该患者最可能的诊断是

(141~142 题共用备选答案)

- A.多为稽留热, 肺部体征出现晚
- B.嗜酸细胞增高
- C.X 线检查示肺部片状阴影, 呈云雾状或游走性
- D.肺部体征出现较早, 易引起肺脓肿肺大疱
- E.体温一般不高, 喘憋为主, 肺部听诊有哮鸣音

RXCS-U4-141.金黄色葡萄球菌肺炎的主要临床特点

RXCS-U4-142.腺病毒肺炎可出现

(143~145 题共用备选答案)

- A.出生后 2 个月
- B.出生后 10~12 个月
- C.出生后 7~9 个月
- D.出生后 4~6 个月
- E.出生后 2 周

RXCS-U4-143.足月儿开始添加维生素 D 的时间是

RXCS-U4-144.足月儿开始添加米粉的时间是

RXCS-U4-145.足月儿开始添加肉末、菜末的时间

(146~147 题共用备选答案)

- A.保胎治疗
- B.肌肉注射麦角新碱
- C.肌肉注射苯巴比妥钠
- D.立即行清宫术
- E.肌肉注射缩宫素

RXCS-U4-146.女, 35 岁, 已婚。停经 70 天, 阴道中等量流血 1 天。妇科检查: 宫口可见组织物堵塞, 子宫稍大、软, 双侧附件区未触及异常, 本例首选的处理措施是

RXCS-U4-147.女, 31 岁, 已婚。停经 58 天, 阴道少量流血、下腹隐痛 4 天。妇科检查: 宫口闭, 子宫如孕 50 天大, 质软, 双附件区未触及异常, B 超显示有心血管搏动。本例首选的处理措施是

(148~150 题共用备选答案)

- A.睑裂变小, 瞳孔扩大, 直接对光反射消失
- B.睑裂正常, 瞳孔扩大, 直接对光反射迟钝
- C.睑裂扩大, 瞳孔缩小, 直接对光反射正常

D.睑裂变小，瞳孔正常，直接对光反射正常

E.睑裂变小，瞳孔缩小，直接对光反射正常

RXCS-U4-148.动脉瘤性动眼神经麻痹的临床表现是

RXCS-U4-149.霍纳综合征的临床表现是

RXCS-U4-150.重症肌无力眼肌型的临床表现是