

实时更新 此版本 2021 年 4 月 17 日 18:19:06

## 主管护师下午（二）

男，53岁。慢性迁延性肝炎2。余年，近1个月来感全身明显乏力，食欲缺乏，腹胀、腹泻而入院。入院时查体：面色晦暗，体型消瘦，皮肤巩膜轻度黄染，腹部膨隆，叩诊有移动性浊音。

85. 经确诊该病人已处于肝硬化失代偿期，其

腹水形成主要原因是

A 肝门] 静脉高压

B 低蛋白血症

C 肝淋巴液生成过少

D 有效循环血容量不足

E 抗利尿激素减少

急性肾功能衰竭患者，少尿期或无尿期最

关键的治疗措施是

A 注意补钾

B 纠正酸中毒

C 补充血容量

**D 严格限制**

E 增加胶体渗透压

护士给心衰患者发放地高辛之前，应先数

心率，若心率低于多少时应暂停给药

A 100 次/分

B 90 次/分

C 80 次/分

D 70 次/分

**E 60 次/分**

青紫型先天性心脏病患儿缺氧发作时，应采取的体位是

A 半卧位

B 端坐位

C 仰卧位

**D 谈胸蹲**

E 头低足高位

癫痫大发作时护理措施错误的是

A 扶持患者卧倒

- B 解开患者的衣领、衣扣和腰带
- C 在患者上下臼齿间放压舌板
- D 将患者的头部侧向一边

### 肢体

放置宫内节育器后常见的并发症不包括

- A 感应**
- B 感染
- C 子宫穿孔
- D 节育器异位
- E 节育器嵌顿

患者，女，32岁。婚后5年未孕，采用辅助生殖技术助孕，当注射绒毛膜促性腺激素3天后，出现腹胀痛，呼吸受限，B超提示：有腹水，卵巢直径16cm，可能的诊断为

### **A 卵巢过度刺激综合征**

- B 输卵管癌
- C 子宫癌
- D 卵巢癌
- E 肝硬化

安装人工心脏起搏器的病人沙袋压迫伤口

的时间是

- A 2~4小时

### **B 4~6】对**

- C 6~12小时

- D 12~24小时

- E 24~72小时

下列乙肝病毒标志物检查结果中，提示病毒复制活跃的是

- A) HBSAg(+)，HBeAg(-)，抗-HBc(+)

- B) HBsAg(+)，HBeAg(-)，抗-HBe(+)

### **CHBSAg(+), HBeAg(+)**

- D 抗-HBc(+)

- E 抗-HBS(+)

男，53岁。慢性迁延性肝炎2余年，近1个月来感全身明显，乏力，食欲缺乏，腹胀、腹泻而入院。入院时查体：面色晦暗，体型消瘦，皮肤巩膜轻度黄染，腹部膨隆，叩诊有移动性浊音。

85. 经确诊该病人已处于肝硬化失代偿期，其腹水形成主要原因是

### **A 肝静脉高压**

- B 低蛋白血症

- C 肝淋巴生成过少

- D 有效循环血容量不足

E 抗利尿激素减少

典型麻疹最先出现皮疹的部位是

A 面部

**B 耳后颞**

C 颈部

D 前胸

E 四肢

青紫型先天性心脏病患儿缺氧发作时，应采取的体位是

A 半卧位

B 端坐位

C 仰卧位

D 膝胸卧位

**高位**

3岁女孩，平日活动后气短，易患肺炎，发育落后于同龄儿，胸骨左缘第二肋间闻及连续性机器样杂音，股动脉有枪击音，考虑疾病是

**A 动脉导管未闭**

B 室间隔缺损

C 房间隔缺损

D 法洛四联症

E 主动脉瓣关闭不全

腰椎间盘突出症早期的基本治疗是

A 止痛药物

B 理疗

C 腰背肌锻炼

**D 朝卧林息**

E 推拿按摩

急性肾功能衰竭患者，少尿期或无尿期最关键的治疗措施

是

A 注意补钾

B 纠正酸中毒

C 补充血容量

**D 严格限制**

E 增加胶体渗透压

患者，女，32岁。婚后5年未孕，采用辅助生殖技术助孕，当注射绒毛膜促性腺激素3天后，出现腹胀痛，呼吸受限，B超提示：有腹水，卵巢直径16cm，可能的诊断为

**A 卵巢过度刺激综合征**

B 输卵管癌

C 子宫癌

D 卵巢癌

E 肝硬化

食管癌进展期主要的临床表现是

B 进行性消瘦

C 进食后呕吐

D 进食后胸骨疼痛

E 进食后呛咳

放置宫内节育器后常见的并发症不包括

**A 感**

B 感染

C 子宫穿孔

D 节育器异位

E 节育器嵌顿

子宫峡部下界为

**A 组织学内口**

B 组织学外口

C 解剖学内口

D 解剖学外口

E 移行带区

患者，男，48岁。肺癌术后化疗，当血白细胞降至

3×10<sup>9</sup>/L，首先要

A 用生血药

**B 停**

C 加强营养

D 少量输血

E 减少抗癌药量

护士给心衰患者发放地高辛之前，应先数心率，若心率低于多少时应暂停给药

A 100 次/分

B 90 次/分

C 80 次/分

D 70 次/分

**E 60 次/分**

癫痫大发作时护理措施错误的是

A 扶持患者卧倒

- B 解开患者的衣领、衣扣和腰带
- C 在患者.上下臼齿间放压舌板
- D 将患者的头部侧向一边

#### 肢体

术后需去枕平卧 6 小时的麻醉方式是

- A 吸入麻醉
- B 硬膜外阻滞麻醉
- C 蛛网膜下隙阻滞稀**
- D 静脉麻醉
- E 吸入麻醉

原发性肝癌最常见的首发症状是

#### **A 肝区疼痛**

- B 肝大
- C 肝性脑病
- D 乏力、消瘦
- E 黄疸

阅读材料，回答下面的题

(92~94 共用題干)

- A. 右心室前负荷加重
- B. 右心室后负荷加重
- C 左心室前负荷加重
- D 左心室后负荷加重
- E. 两心室前负荷加重

93. 肺心病

- A 右心室前负荷加重
- B 右心室后负荷加重
- C 左心室前负荷加重
- D 左心室后负荷加重
- E 两心室前负荷加重

阅读材料，回答下面的题

(84~87 題共用題干)

男，75 岁。心绞痛发作持续 3 小时，伴恶心、呕吐、出冷汗，含服硝酸甘油无效。心电图示 I|、I、aVF 导联 ST 段呈弓背样抬高 6mm，VIW3 导联 ST 段压低 4mm，偶发室性期前收缩 1 次，诊断为急性心肌梗死。2 小时后随访心电图 I、TT、avF 字联出现病理性 Q 波，其 心肌梗死部位可能在

- A) 广泛前壁
- B 前壁
- C 下壁
- D 右侧壁
- E 正后壁

患者，女，35岁。因高热2日未能进食，自诉口渴、口干，尿少呈黄。查体：口唇、舌干燥，皮肤弹性差，眼窝凹陷，实验室检查尿比重1.028，血清钠浓度为155mmol/L，该患者最可能出现了

- A 等渗性脱水
- B 轻度低渗性脱水
- C 中度低渗性脱水
- D 轻度高渗性脱水
- E 中度高渗性脱水

