

终极押题卷中西医执业第四单元

A1/A2 型选择题

0. 治疗外科疮疡半阴半阳证，应首选

- A. 阳和膏
- B. 回阳玉龙膏
- C. 冲和膏
- D. 太乙膏
- E. 千捶膏

答案:C

解析:冲和膏有活血止痛、疏风祛寒、消肿软坚的作用，适用于半阴、半阳证；阳和膏用于疮形不红不热、漫肿无头之阴证疮疡未溃者；回阳玉龙膏有温经散寒、活血化瘀的作用，适用于阴证；太乙膏性偏清凉，功用消肿、清火、解毒、生肌；千捶膏性偏寒凉，功用消肿、解毒、提脓、祛腐、止痛，二者均可用于红肿热痛明显之阳证疮疡，为肿疡、溃疡的通用方。故选C。

标签:

应用

简单

精华

1. 不属于外科致病因素的是

- A. 六淫邪毒
- B. 外来伤害
- C. 感受特殊之毒
- D. 气血凝滞
- E. 房室损伤

答案:D

解析:中医外科疾病致病因素包括外因与内因两个方面。其中，外因者有外感六淫邪毒、感受特殊之毒、外来伤害等，内因者有情志内伤、饮食不节、房室损伤等。

标签:

记忆

简单

精华

2. 中医外科内治法的总则是

- A. 温、托、补
- B. 清、消、补
- C. 清、补、托

D. 消、通、补

E. 消、托、补

答案:E

解析:根据外科疾病的发生发展过程,按照疮疡初起、成脓、溃后三个不同发展阶段,立出消、托、补三大法则。

标签:

记忆

简单

精华

3. 高压蒸汽消毒后的物品,超过多长时间不能使用

A. 3 天

B. 5 天

C. 7 天

D. 14 天

E. 10 天

答案:D

解析:高压蒸汽消毒后的物品,超过 14 天不能使用。

标签:

记忆

简单

精华

4. 硬膜外麻醉最严重的并发症是

A. 全脊髓麻醉

B. 硬膜外出血

C. 休克

D. 硬膜外感染

E. 脊髓损伤

答案:A

解析:硬膜外麻醉最严重的并发症是全脊髓麻醉,病人可呼吸、心跳骤停。

标签:

记忆

简单

精华

5. 下列各项不属于肠外营养支持适应证的是

A. 胃肠道外瘘及短肠综合征

B. 消化道广泛炎症性疾病

C. 严重贫血

D. 胃肠道梗阻

E. 大手术围手术期营养

答案:C

解析:肠外营养支持的适应证:胃肠道梗阻;胃肠道外瘘及短肠综合征;消化道广泛炎症性疾病;高代谢状态;肿瘤患者接受化疗和大面积放疗;肝、肾衰竭;大手术围手术期营养。

标签:

记忆

简单

精华

6. 慢性疼痛最常用的治疗方法是

A. 神经阻滞

B. 痛点注射

C. 药物治疗

D. 按摩疗法

E. 物理疗法

答案:C

解析:

标签:

应用

简单

精华

7. 急性淋巴管炎相当于中医学的

A. 烂疔

B. 疫疔

C. 红丝疔

D. 蛇头疔

E. 蛇眼疔

答案:C

解析:烂疔相当于西医的气性坏疽;疫疔相当于西医的皮肤炭疽;蛇头疔相当于西医的脓性指头炎;蛇眼疔相当于西医的甲沟炎及甲下脓肿;急性淋巴管炎为皮肤的一到数条红丝线,故中医称红丝疔,选C。

标签:

记忆

简单

精华

8. 下列哪项不是丹毒的临床特点

A. 病起缓慢,恶寒发热

B. 局部皮肤焮热肿胀,迅速扩大

- C. 局部皮肤忽然变赤
- D. 好发于小腿部
- E. 容易复发

答案:A

解析:丹毒系由火毒侵犯,郁于肌肤而发的一种急性感染性疾病。病起皮肤突然发红,色如丹涂,焮热肿胀,迅速扩大,一般好发于小腿及头面部,数日内可逐渐痊愈,但常易复发。

标签:

记忆

简单

精华

9. 烧伤患者,局部创面痛觉迟钝,有水泡,基底苍白,间有红色斑点,潮湿。其烧伤程度为

- A. I 度
- B. 浅II度
- C. 深II度
- D. III度
- E. 以上均非

答案:C

解析:烧伤普遍采用三度四分法:I度烧伤:仅伤及表皮浅层,生发层健在,再生能力强,表面呈红斑状,干燥无渗出,有烧灼感;浅II度烧伤:伤及表皮的生发层、真皮乳头层,有薄壁大水疱形成,疼痛明显;深II度烧伤:伤及皮肤真皮层,可有水疱,但去疱后创面微湿,红白相间,痛觉较迟钝;III度烧伤:全皮层烧伤甚至达皮下、肌肉或骨骼,创面无水疱,呈蜡白或焦黄色,甚至炭化,痛觉消失。故选C。

标签:

记忆

简单

精华

10. 急性阑尾炎热毒证者宜用
- A. 大黄牡丹皮汤合红藤煎加减
 - B. 大柴胡汤
 - C. 大黄牡丹皮汤合透脓散加减
 - D. 大陷胸汤
 - E. 龙胆泻肝汤

答案:C

解析:急性阑尾炎热毒证。①证候:穿孔腹膜炎,腹痛剧烈,全腹压痛、反跳痛、肌紧张,高热恶寒,恶心纳差,便秘、腹泻,舌红绛,苔黄厚,脉洪

数或细数；②治法：通腑排毒，养阴清热。③方药：大黄牡丹皮汤合透脓散加减。

标签：

应用

简单

精华

11. 知柏地黄汤合当归六黄汤适用于甲状腺功能亢进症的哪种证型

- A. 心肝阴虚
- B. 阴虚火旺
- C. 心脾两虚
- D. 肝火亢盛
- E. 痰热瘀阻

答案：B

解析：知柏地黄汤合当归六黄汤，功能滋肾清热、化痰软坚，用以治疗甲亢的阴虚火旺证。故选 B。

标签：

记忆

简单

精华

12. 为预防甲亢术后出现甲状腺危象，下列哪一项是最关键的措施

- A. 术后用冬眠合剂镇静
- B. 吸氧
- C. 术前使基础代谢率降至正常范围
- D. 术后补钙
- E. 术后给予氢化可的松

答案：C

解析：甲状腺危象是甲亢的严重合并症，为预防甲亢术后出现甲状腺危象，最关键的措施是术前使基础代谢率降至正常范围。

标签：

记忆

简单

精华

13. 下列哪一项是消化性溃疡致瘢痕性幽门梗阻最典型的临床表现

- A. 腹胀
- B. 呕吐
- C. 消瘦
- D. 贫血
- E. 脱水

答案:B

解析:幽门括约肌的痉挛或幽门区水肿,由此发生的梗阻,称为幽门不完全性梗阻,是暂时的。但由于溃疡愈合后形成的瘢痕组织造成幽门区狭窄而出现梗阻,为完全性梗阻。五个选项均为幽门梗阻的临床表现,但C说明宿食在胃中囤积了一段时间,而不像更高位的梗阻进食后会立刻呕吐。瘢痕性幽门梗阻为完全性梗阻。几乎无法排空所摄入的食物。所以只能通过呕吐的方式排除。其他的选项不够典型。

标签:

记忆

简单

精华

14. 下列哪一项是门静脉高压症的主要原因

- A. 门静脉主干先天性畸形
- B. 肝静脉血栓形成、狭窄
- C. 肝硬化
- D. 肝段下腔静脉阻塞
- E. 各种原因致脾静脉血流量过大

答案:C

解析:肝硬化是门静脉高压症的主要原因。

标签:

记忆

简单

精华

15. 下列哪一项是鉴别腹股沟斜疝与直疝最有价值的临床特点

- A. 疝块的形状
- B. 疝块的位置
- C. 发生年龄
- D. 是否容易嵌顿
- E. 回纳疝块后压住深(内)环,增加腹压是否脱出

答案:E

解析:鉴别腹股沟斜疝或直疝时,最有意义的鉴别点是还纳疝内容物、压迫深环后疝内容物是否再突出。

标签:

记忆

简单

精华

16. 男性老年人排尿困难,最常见于

- A. 尿道结石

- B. 前列腺炎
- C. 膀胱肿瘤
- D. 前列腺增生症
- E. 尿路感染

答案:D

解析:前列腺增生症多见于老年男性,主要表现为进行性尿频和排尿困难;膀胱肿瘤多见无痛性肉眼血尿;尿道结石多伴有疼痛,尿频、尿急,时有尿流中断;前列腺炎清晨排尿末或大便时尿道口溢出白色黏液;尿路感染常有尿频尿急尿痛,无排尿困难。

标签:

记忆
简单
精华

17. 能判断血尿来自何处尿路的检查方法是

- A. B型超声波
- B. CT
- C. X线摄片
- D. 膀胱镜检查
- E. 尿三杯试验

答案:E

解析:尿三杯试验可初步判断镜下血尿的来源和病变部位,以最初10~15ml尿为第一杯,以排尿最后10ml为第三杯,中间部分为第二杯。第一杯尿液异常提示病变在尿道或膀胱颈部;第三杯异常提示病变在后尿道、膀胱颈部或三角区;若三杯均异常提示病变在膀胱或以上部位。

标签:

记忆
简单
精华

18. 肾输尿管结石血尿的特点是

- A. 血尿伴排尿困难
- B. 运动后出现腰痛和血尿
- C. 血尿伴膀胱刺激征
- D. 无痛性肉眼血尿
- E. 终末血尿

答案:B

解析:肾、输尿管结石的主要症状是绞痛和血尿,常见并发症是梗阻和感染。

标签:

记忆

简单
精华

19. 下列哪一项是肛裂的主要特点

- A. 无痛性血便
- B. 肛门部位下坠感
- C. 肛门口有分泌物
- D. 肛门疼痛伴血便
- E. 粪便上附有新鲜血液

答案:D

解析:肛裂是齿状线下肛管皮肤层裂伤后形成的小溃疡。绝大多数肛裂位于肛管后正中线上,和排便时因肛管后壁承受压力最大有关,典型的临床表现是排便时肛门剧烈疼痛,也可有少量血迹。

标签:

超纲

记忆

简单

精华

20. 下列外治法中,不属于痔的外治法的是

- A. 熏洗法
- B. 挂线法
- C. 外敷法
- D. 塞药法
- E. 枯痔法

答案:B

解析:挂线法属于肛痿的外治法。

标签:

超纲

记忆

简单

精华

21. 最符合带状疱疹临床表现的是

- A. 神经痛,丘疱疹,单侧分布,病程2~3周
- B. 神经痛,斑疹,双侧分布,病程2~3周
- C. 神经痛,结节,单侧分布,病程2~3周
- D. 神经痛,斑块,单侧分布,病程2~3周
- E. 神经痛,丘疱疹,双侧分布,病程2~3周

答案:A

解析:最符合带状疱疹临床表现的是神经痛—丘疱疹—单侧分布—病程2~3周。

标签:

记忆

简单

精华

22. 淋病的临床特点是

- A. 尿频、尿急、尿痛
- B. 尿频、尿急，尿道刺痛或尿道溢脓
- C. 排尿困难和尿潴留
- D. 小腹疼痛
- E. 生殖器溃疡

答案:B

解析:淋病是由淋病双球菌所引起的泌尿生殖系感染的性传播疾病。临床上以尿道刺痛、尿道口排出脓性分泌物为特征。主要通过性交传染，极少数也通过污染的衣物等间接传染。属于中医淋证、淋浊的范畴。

标签:

记忆

简单

精华

23. 中医古籍中的“四边”指的是

- A. 阴道口
- B. 子宫
- C. 宫颈口
- D. 外阴
- E. 处女膜

答案:D

解析:重点记忆中医古籍中的解剖部位的名称与西医解剖学名称的对应。要了解同一解剖部位在中医古籍中的不同的别名。

标签:

记忆

简单

精华

24. 孕激素的生理作用下述哪项是正确的()

- A. 使阴道上皮角化，糖原增加
- B. 使子宫肌肉对催产素的敏感性增强
- C. 单独使子宫内膜呈分泌期变化
- D. 使宫颈口闭合，黏液减少变稠，拉丝度减少
- E. 促进骨中钙的沉积

答案:D

解析：孕激素的主要作用有：1)使子宫肌肉松弛，活动能力降低，对外界刺激的反应能力低落，降低妊娠子宫对催产素的敏感性，有利于孕卵在子宫腔内生长发育。2)使增生期子宫内膜转化为分泌期内膜，为受精卵着床作好准备。3)使子宫颈口闭合，粘液减少，变稠，拉丝度降低。4)抑制输卵管肌肉节律性收缩的振幅。5)使阴道上皮细胞脱落加快。6)在雌激素影响的基础上，促进乳腺腺泡的发育。7)通过对丘脑下部的负反馈作用，影响脑垂体促性腺激素的分泌。8)孕激素能通过中枢神经系统起到升温作用，正常妇女在排卵后基础体温可升高 $0.3^{\circ}\text{C}\sim 0.5^{\circ}\text{C}$ ，这种基础体温的改变，可以作为排卵的重要指标，也即排卵前基础体温低，排卵后由于孕激素作用基础体温升高。9)孕激素在新陈代谢方面能促进水与钠的排泄。

标签：

中等

记忆

精华

25. 关于妊娠宫颈的变化，下列哪项是错误的

- A. 宫颈肥、着色、变软
- B. 表面可出现糜烂面
- C. 全部柱状上皮交界处内移
- D. 宫颈腺体肥大，黏液分泌增多，形成黏液栓
- E. 近预产期时宫颈变短，轻度扩张

答案：C

解析：妊娠宫颈的变化应该是宫颈鳞状上皮的交界部向外推移，宫颈表面外观色红如糜烂状，称假性糜烂。

标签：

中等

记忆

精华

26. 听诊胎心音在胎儿哪个部位最清楚

- A. 胎背
- B. 胎背下方
- C. 胎背上方
- D. 胎儿胸部
- E. 胎儿腹部

答案：C

解析：胎心音在孕妇腹壁靠近胎背上方听得最清楚，枕先露时，胎心音在脐左或右下方，臀先露时，胎心音在脐左或右上方，肩先露时，胎心音在靠近脐部下方听得最清楚。

标签：

中等
记忆
精华

27. 胎头衔接指的是()

- A. 顶骨进入骨盆入口，双顶径接近或达到坐骨棘水平
- B. 双顶径进入骨盆入口，颅骨最低点接近或达到坐骨棘水平
- C. 枕骨进入骨盆入口，双顶径接近或达到坐骨棘水平
- D. 双顶径进入骨盆入口，双顶径到达坐骨棘水平
- E. 双顶径进入骨盆入口，双顶径到达坐骨结节水平

答案:B

解析:

标签:

中等
记忆
精华

28. 关于产后恶露，错误的是

- A. 血性恶露持续 3~4 日
- B. 浆液性恶露持续 10 日左右
- C. 正常恶露持续 2~3 周干净
- D. 白色恶露持续 3 周左右
- E. 正常恶露总量为 250~500ml，个体差异较大

答案:C

解析:正常恶露有血腥味，但无臭味，持续 4~6 周，总量为 250~500ml，个体差异较大。血性恶露约持续 3 日，逐渐转为浆液恶露，约 2 周后变为白色恶露，约持续 3 周干净。

标签:

中等
记忆
精华

29. 身体无病，每三月一行经者，称为()

- A. 激经
- B. 暗经
- C. 居经
- D. 避年
- E. 并月

答案:C

解析:身体无病而定期两个月来潮一次者，古人称为“并月”；三个月一潮者，称为“居经”或“季经”；一年一行者称为“避年”；还有终生不潮却能受孕者，

称为“暗经”。受孕初期仍按月有少量月经而无损于胎儿者，称为“激经”，亦称“盛胎”或“垢胎”。均是个别的特殊生理现象。这些个别的特殊月经现象，应进行妇科检查，如无明显异常，一般可不视为病理现象。

标签:

记忆

简单

精华

30. 经行后期，量少，色淡，质稀，属

- A. 气虚证
- B. 血寒证
- C. 血虚证
- D. 气血两虚证
- E. 气滞证

答案:C

解析:

标签:

中等

记忆

精华

31. 患者女性，系慢性盆腔炎，可选择下列哪种外治法()

- A. 坐浴法
- B. 冲洗法
- C. 熏洗法
- D. 中药保留灌肠
- E. 纳药法

答案:D

解析:中药保留灌肠一则针对其病机清热解毒，活血化瘀，二则局部用药直达病灶，通过肠黏膜吸收直接进入盆腔组织，使血管扩张，改善局部血液循环，促进药物吸收，使盆腔组织的药物浓度增高，并能直接渗透到病变部位，改善组织营养，有利于抑制结缔组织增生，促进炎症消散吸收，并避免了口服中药的不适与胃肠道反应。

标签:

记忆

简单

精华

32. 因冲气上逆而导致的妊娠病有()

- A. 恶阻与子嗽
- B. 子悬与恶阻

- C. 子烦与子悬
- D. 子嗽与子悬
- E. 子烦与子嗽

答案:B

解析:妊娠期,胸腹胀满,甚或喘急,烦躁不安者,称为“胎气上逆”。亦名“胎气上逼”、“子悬”。妊娠呕吐即怀孕后出现恶心、呕吐、头晕、厌食或食入即吐的现象。中医称之为“恶阻”、“子病”、“病儿”、“阻病”等。其主要由于胎气上逆,胃失和降所致。

标签:

中等

记忆

精华

33. 妊娠剧吐需终止妊娠的指征是

- A. 持续出现黄疸
- B. 呕吐有胆汁
- C. 体温高于 37.5℃
- D. 出现尿酮体
- E. 出现低钾

答案:A

解析:体温升高(持续在 38℃ 以上)、心动过速(≥ 120 次/分)、黄疸、持续蛋白尿、伴发 Wernicke 综合征等,危及孕妇生命时,需考虑终止妊娠。

标签:

34. 有关妊娠合并心脏病,下述哪项是错误的

- A. 宫口开全后应防止产妇用力屏气
- B. 胎儿娩出后给予镇静剂如哌替啶或吗啡
- C. 胎儿娩出后,若子宫收缩不佳,可肌注麦角新碱
- D. 如有产后出血,可以输血,但需要注意输血速度
- E. 产前、产时有心力衰竭的产妇产后继续用强心药

答案:C

解析:在胎盘未剥离娩出前不用,否则可使胎盘嵌留宫腔内。如胎儿娩出前使用谈品,可能发生子宫强直收缩,以致胎儿缺氧或颅内出血,应禁用。

标签:

困难

记忆

精华

35. 下列哪一项是导致慢性胎儿窘迫的原因

- A. 脐带受压
- B. 胎盘早剥

- C. 孕妇休克
- D. 宫缩过强或持续时间过长
- E. 胎盘功能不全

答案:E

解析:胎儿窘迫病因包括母体血氧含量不足、胎盘病变、脐带血运受阻、胎儿疾病等。最常见原因为胎盘功能减退,脐带脱垂和脐带先露不常见,妊娠高血压和羊水过少均与胎盘功能减退有关。

标签:

中等

记忆

精华

36. 下列各项关于产后出血的描述, 错误的是

- A. 软产道损伤是引起产后出血最常见的原因
- B. 凝血功能障碍也是引起产后出血的原因
- C. 胎儿娩出后 24 小时内失血量超过 500ml 称产后出血
- D. 胎盘和胎膜残留可行钳刮术或刮宫术
- E. 胎盘完全植入时, 需做子宫次全切除

答案:A

解析:本题考查产后出血相关知识点。产后出血是指胎儿娩出后 24 小时内失血量超过 500ml。其病因包括子宫收缩乏力、胎盘因素、软产道损伤、凝血功能障碍。其中强调子宫收缩乏力是引起产后出血最常见的原因。对于处理指出胎盘完全植入时, 需做子宫次全切除。

标签:

中等

记忆

精华

37. 下列哪一项是羊水栓塞最早出现的症状

- A. 急性肾衰竭
- B. 急性左心衰
- C. 急性呼吸衰竭
- D. 急性 DIC
- E. 急性肝功能衰竭

答案:C

解析:略

标签:

中等

记忆

精华

38. 下列哪一项是子宫破裂的最典型表现

- A. 产妇在胎儿娩出后，阴道立即流血
- B. 产后突然休克
- C. 子宫出现病理性缩复环
- D. 宫缩消失，腹壁下可触及胎儿肢体
- E. 胎动消失伴阴道大流血

答案:D

解析:子宫破裂的最典型表现是宫缩消失，腹壁下可触及胎儿肢体。

标签:

中等

记忆

精华

39. 产褥感染是指()

- A. 产褥期所发生的感染
- B. 分娩后生殖道的感染
- C. 产褥期生殖道感染
- D. 分娩后体温升高，达到或超过 38℃
- E. 产后所发生的一切感染

答案:C

解析:产褥感染是指分娩时及产褥期生殖道受病原体感染，引起局部和全身的炎性应化。发病率为 1%~7.2%，是产妇死亡的四大原因之一。产褥病率是指分娩 24 小时以后的 10 日内用口表每日测量 4 次，体温有 2 次达到或超过 38℃。可见产褥感染与产褥病率的含义不同。虽造成产褥病率的原因以产褥感染为主，但也包括产后生殖道以外的其他感染与发热，如泌尿系感染、乳腺炎、上呼吸道感染等。

标签:

记忆

简单

精华

40. 治疗肝肾阴虚型外阴硬化性苔癣首选的方剂是

- A. 五味消毒饮
- B. 易黄汤
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 归肾丸合二至丸
- E. 二妙散

答案:D

解析:

标签:

中等
记忆
精华

41. 滴虫阴道炎带下的特点是

- A. 白色乳酪样
- B. 黄绿色脓性
- C. 赤白带相兼
- D. 灰黄色泡沫样
- E. 匀质稀薄状

答案:D

解析:白带多呈灰黄色泡沫状为滴虫阴道炎的带下表现,白色豆腐渣样白带多为念珠菌阴道炎特点,带下匀质稀薄状多为细菌性阴道病特点,赤白带相兼多见于老年性阴道炎。

标签:

中等
记忆
精华

42. 外阴炎之湿毒浸渍证,治法宜选用

- A. 清热利湿,杀虫止痒
- B. 清热解毒,除湿止痒
- C. 滋肾降火,调补肝肾
- D. 清热解毒,燥湿止带
- E. 健脾益气,升阳除湿

答案:B

解析:外阴炎之湿毒浸渍证证候:外阴灼痛,肿胀,充血,溃疡,渗流脓水,带下增多,色黄秽臭,尿黄便秘;舌红,苔黄糙,脉滑数。治法:清热解毒,除湿止痒。方药:五味消毒饮加土茯苓、蚤休、薏苡仁、萹藨。

标签:

43. 假丝酵母菌阴道炎在分泌物中找到假菌丝,治疗可用

- A. 酸性洗剂冲洗
- B. 碱性洗剂冲洗
- C. 甲硝唑栓塞入阴道
- D. 口服甲硝唑
- E. 口服己烯雌酚

答案:B

解析:假丝酵母菌阴道炎治疗:2%~3%苏打液外阴及阴道冲洗或坐浴。制霉菌素、酮康唑、克霉唑、咪康唑栓等外用。口服伊曲康唑、氟康唑。A和C用于滴虫性阴道炎或萎缩性阴道炎。E用于萎缩性阴道炎。

标签:

44. 月经病的治疗原则是

- A. 治本调经
- B. 清热利湿
- C. 化瘀止痛
- D. 补肾调经
- E. 清热解毒

答案:A

解析:月经病的治疗原则是重在治本调经。

标签:

45. 无排卵性异常子宫出血的中医治疗原则

- A. 塞流、澄源、复旧
- B. 止血固冲，以防脱证
- C. 滋阴清热，止血调经
- D. 止血，调整月经周期，促进排卵
- E. 急则治其标，缓则治其本

答案:E

解析:无排卵型功血即崩漏，三法是塞流、澄源、复旧。原则是急则治标，缓则之本。D是西医治疗原则。

标签:

46. 治疗月经先期阴虚血热型应首选

- A. 清经散
- B. 两地汤
- C. 加味逍遥散
- D. 固阴煎
- E. 知柏地黄汤

答案:B

解析:清经散用于实热(阳盛血热)，固阴煎用于肾气不固，两地汤是生地、熟地。

标签:

47. 下列关于女性生殖器官肿瘤的叙述，正确的是

- A. 高危型 HPV 持续感染是子宫颈癌的主要危险因素
- B. II 型子宫内膜癌即雌激素相关型，占多数，预后好
- C. 确诊子宫内膜癌的主要依据是宫腔镜检查
- D. 宫颈癌筛查的主要方法是宫颈和宫颈管活组织检查
- E. 子宫肌瘤最常见的变性是红色样变

答案:A

解析:宫颈癌，高危型 HPV 持续感染是主要危险因素，接触性出血是常见早

期表现，宫颈刮片细胞学检查是主要筛查方法，活检是最可靠的诊断方法。子宫肌瘤最常见变形是玻璃样变。子宫内膜癌 I 型即雌激素相关型多见(II 是非雌激素相关型)，分段诊刮是确诊的主要依据。

标签:

48. 下列关于部分性葡萄胎的叙述，错误的是

- A. 停经后阴道流血
- B. 子宫小于停经月份可见
- C. 常出现黄素化囊肿
- D. 易与不全流产相混淆
- E. 较完全性葡萄胎少见

答案:C

解析:部分性葡萄胎可有完全性葡萄胎的大多数症状，但程度较轻。子宫大小与停经月份多数相符或小于停经月份，一般无腹痛，呕吐较轻，多无子痫前期征象，通常不发生卵巢黄素化囊肿。故本题选 C。

标签:

49. 子宫内膜异位症的基本病机是

- A. 寒凝血瘀
- B. 气滞血瘀
- C. 脏腑功能失调
- D. 气血功能失调
- E. 瘀血阻滞冲任胞宫

答案:E

解析:“子宫内膜”异位症，“卵巢”异位最多见，冲任胞宫。

标签:

50. 下列属 I 度子宫脱垂轻型的是

- A. 子宫颈外口距处女膜缘 $< 4\text{cm}$ ，但未达处女膜缘
- B. 宫颈外口已达处女膜缘，在阴道口可见到宫颈
- C. 子宫颈已脱出阴道口，但宫体仍在阴道内
- D. 宫颈及部分宫体已脱出于阴道口
- E. 子宫颈及宫体全部脱出至阴道口外

答案:A

解析:子宫脱垂的分度: I 度:轻型:子宫颈外口距处女膜缘 $< 4\text{cm}$ ，但未达处女膜缘; 重型:宫颈外口已达处女膜缘，在阴道口可见到宫颈。 II 度:轻型:子宫颈已脱出阴道口，但宫体仍在阴道内; 重型:宫颈及部分宫体已脱出于阴道口。 III 度:子宫颈及宫体全部脱出至阴道口外。(这题好像太简单了吧，考一度的话)

标签:

51. 不孕症肾阴虚，中医治法

- A. 补肾益气，温养冲任
- B. 滋阴养血，调冲益精
- C. 温肾养血益气，调补冲任
- D. 疏肝解郁，养血理脾
- E. 燥湿化痰，调理冲任

答案:B

解析:阴-滋阴。其它选项明显不是。

标签:

52. 下列各项，不属药物流产适应症的是

- A. 正常宫内妊娠 7 周之内者
- B. 自愿要求药物终止妊娠的健康妇女
- C. 高危人流对象
- D. 对手术流产有恐惧心理者
- E. 带器妊娠或可疑宫外孕者

答案:E

解析:药物流产的适应证包括:①自愿要求药物终止妊娠的健康妇女;②正常宫内妊娠 7 周之内;③高危人流对象;④对手术流产有恐惧心理者。

标签:

53. 中医学称小儿为“纯阳之体”，含义是

- A. 纯阳无阴
- B. 阳常有余
- C. 发育迅速
- D. 肝常有余
- E. 阴虚阳亢

答案:C

解析:“纯”指小儿先天所禀的元阴元阳未曾耗散,“阳”指小儿的生命力。“纯阳之体”说明小儿生长发育迅速,并非指阳亢阴亏或有阳无阴。而肝常有余、阴虚阳亢是指病理特点。

标签:

中等

记忆

精华

54. 下列描述,不属新生儿黄疸寒湿阻滞证特征的是()

- A. 目黄身黄
- B. 四肢欠温
- C. 神疲倦怠
- D. 黄色鲜明
- E. 舌淡苔白腻

答案:D

解析:

标签:

中等

记忆

精华

55. 新生儿寒冷损伤综合征寒凝血滞证治疗首选方剂是()

- A. 参附汤
- B. 金匱肾气丸
- C. 四逆汤
- D. 当归四逆汤
- E. 血府逐瘀汤

答案:D

解析:略

标签:

中等

记忆

精华

56. 下列各项中, 不属于肺炎合并心力衰竭诊断要点的是

- A. 呼吸突然加快, 超过 60 次 / 分
- B. 突然极度烦躁不安, 发绀
- C. 心率突然超过 180 次 / 分
- D. 心音低钝, 颈静脉怒张
- E. 左肋缘下可扪及脾脏

答案:E

解析:肺炎合并心力衰竭的诊断标准: ①心率突然加快, 超过 180 次 / 分; ②呼吸突然加快, 超过 60 次 / 分; ③突然极度烦躁不安, 明显发绀, 面色苍灰, 指(趾)甲微循环再充盈时间延长; ④肝脏迅速增大; ⑤心音低钝, 或有奔马律, 颈静脉怒张; ⑥尿少或无尿, 颜面、眼睑或下肢水肿。若出现前五项, 即可诊断为心力衰竭。

标签:

中等

记忆

精华

57. 病毒性心肌炎病变过程中的病理产物是()

- A. 瘀血痰浊
- B. 湿热邪毒
- C. 风热邪毒

- D. 痰瘀湿阻
- E. 痰湿内热

答案:A

解析:

标签:

中等

记忆

精华

58. 治疗病毒性心肌炎心阳虚弱证的首选方剂是

- A. 银翘散
- B. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤
- C. 生脉散
- D. 复脉汤
- E. 甘麦大枣汤

答案:B

解析:

标签:

中等

记忆

精华

59. 鹅口疮的病位是()

- A. 肝脾胃
- B. 脾肝肾
- C. 肝胆脾
- D. 心肺肾
- E. 心脾肾

答案:E

解析:

标签:

中等

记忆

精华

60. 疱疹性口炎心火上炎证的首选方剂是

- A. 泻心导赤汤
- B. 清热泻脾散
- C. 凉膈散
- D. 知柏地黄丸
- E. 银翘散



答案:A

解析:

标签:

中等

记忆

精华

61. 急性肾小球肾炎的病位是()

- A. 肺脾肾
- B. 心肺肾
- C. 心肝肾
- D. 脾肾膀胱
- E. 心脾肝

答案:A

解析:

标签:

中等

记忆

精华

62. 小儿肾病综合征脾肾阳虚证的治则是()

- A. 温肾健脾，化气行水
- B. 温阳利水
- C. 清热解毒
- D. 健脾利水
- E. 活血化瘀

答案:A

解析:

标签:

中等

记忆

精华

63. 癫痫持续状态的首选药物是()

- A. 甘露醇
- B. 苯巴比妥钠
- C. 水合氯醛
- D. 苯妥英钠
- E. 地西洋

答案:E

解析:

标签：
中等
记忆
精华

64. 下列各项中，不属于病毒性脑炎的治疗方法的是

- A. 控制惊厥发作
- B. 使用广谱抗生素
- C. 注意营养供给，维持水和电解质平衡
- D. 积极控制脑水肿和颅内高压
- E. 重症患儿应注意呼吸道和心血管功能的监护与支持

答案:B

解析：

标签：

应用
中等
记忆
精华

65. 下列各项中，不属于注意力缺陷多动障碍临床表现的是

- A. 活动过多
- B. 注意力不集中
- C. 智力低下
- D. 冲动任性
- E. 学习困难

答案:C

解析：

标签：

中等
记忆
精华

66. 营养性缺铁性贫血，铁剂治疗后停药指征是()

- A. 血红蛋白及红细胞恢复正常
- B. 面色转红，精神及食欲好转
- C. 血清铁恢复正常
- D. 网织红细胞升高后再用 1~2 个月
- E. 血红蛋白及红细胞恢复正常后再用 6~8 周

答案:E

解析：

标签：

中等
记忆
精华

67. 诊断 3~6 个月小儿贫血，其末梢血血红蛋白值应是()

- A. <100g/L
- B. <110g/L
- C. <90g/L
- D. <120g/L
- E. <130g/L

答案:B

解析:实记题。

标签:

中等
记忆
精华

68. 性早熟是指

- A. 包括真性性早熟、假性性早熟和中性性早熟
- B. 女童在 12 岁以前出现月经初潮，属性早熟
- C. 女童在 8 岁以前出现乳房增大、阴毛、腋毛生长等第二性征的一种或一种以上者，均属于性早熟
- D. 女童在 14 岁以前出现第二性征发育，属性早熟
- E. 由肿瘤引起的假性性早熟

答案:C

解析:

标签:

记忆
简单
精华

69. 风湿性心肌炎的临床表现下列哪项是错误的

- A. 心率增快
- B. 心前区第一心音减弱
- C. 出现早搏和心动过速
- D. 严重时可能出现奔马律
- E. 心尖区可听到隆隆样收缩期杂音

答案:E

解析:考查急性风湿热的临床表现。急性风湿热心肌炎表现为: 1 心率增快在 110~120 次/分以上, 安静与睡眠时无明显减慢。2 心音减弱, 第一心音低钝, 有时出现奔马律。心尖区可听到收缩期吹风样杂音, 多因心脏扩大,

二尖瓣相对性关闭不全所致，故为可逆性。3 心律失常，可见期前收缩，不同程度的房室传导阻滞，以第 1 度最常见。还有 Q-T 间期延长，ST 段下移和 T 波低平等变化。4 心脏扩大，心力衰竭时更甚。

标签：

中等

记忆

精华

70. 下列哪一项是过敏性紫癜血热妄行证的首选方剂

- A. 银翘散
- B. 四妙散
- C. 犀角地黄汤
- D. 葛根黄芩黄连汤合小承气汤
- E. 茜根散

答案：C

解析：过敏性紫癜血热妄行证。①证候：起病急骤，壮热面赤，咽干，心烦，渴喜冷饮，皮肤瘀斑瘀点密集或成片，伴鼻衄、齿衄，大便干燥，小便黄赤，舌质红绛，苔黄燥，脉弦数；②治法：清热解毒，凉血化斑；③方药：犀角地黄汤加减。

标签：

中等

记忆

精华

71. 小儿肥胖的标准为（ ）

- A. 体重高于同年龄、同身高正常小儿标准的 15%
- B. 体重高于同年龄、同身高正常小儿标准的 20%
- C. 体重高于同年龄、同身高正常小儿标准的 10%
- D. 体重高于同年龄、同身高正常小儿标准的 30%
- E. 体重高于同年龄、同身高正常小儿标准的 50%

答案：B

解析：

标签：

中等

记忆

精华

72. 佝偻病后遗症期的最主要表现是（ ）

- A. 睡眠不安及多汗
- B. X 线长骨骺端呈毛刷样改变
- C. 骨骼畸形

- D. 血磷下降，血钙正常
- E. 肌肉韧带松弛

答案:C

解析:

标签:

中等

记忆

精华

73. 流行性腮腺炎并发睾丸炎的中医治法是

- A. 清热解毒，软坚散结
- B. 清热解毒，息风开窍
- C. 疏风清热，散结消肿
- D. 清肝泻火，活血止痛
- E. 平肝泻火，理气通腑

答案:D

解析:考查流行性腮腺炎变证的中医治法。腮腺炎病毒除侵犯腮腺外，尚能引起脑膜炎、脑膜脑炎、睾丸炎、卵巢炎和胰腺炎等。中医辨证论治变证为邪陷心肝证和毒窜睾腹证。邪陷心肝证治法为清热解毒，熄风开窍。毒窜睾腹证治法为清肝泻火，活血止痛。

标签:

中等

记忆

精华

74. 下列哪一项是猩红热的主要病机

- A. 麻疹热毒蕴于脾胃
- B. 麻疹热毒犯于肺卫
- C. 痧毒疫疔蕴于肺胃
- D. 痧毒疫疔侵犯肝胆
- E. 以上都不是

答案:C

解析:猩红热的病因为感受痧毒疫疔之邪，乘时令不正，寒暖不调，邪从口鼻侵入人体，蕴于肺胃二经。

标签:

中等

记忆

精华

75. 下列是风疹的皮疹特点的是

- A. 发热 3~4 天后出疹

- B. 红色丘疹，疹后脱皮
- C. 疹退后有色素沉着
- D. 淡红色斑丘疹，先见于面部，24 小时内波及全身
- E. 全身皮肤充血潮红

答案:D

解析:风疹发热 1 天左右出疹，皮疹以淡红色斑丘疹.先见于面部，24 小时内波及全身，疹退后尤色无脱皮，稍有色素沉着。

标签:

中等

记忆

精华

76. 蛔虫病主要疼痛部位是()

- A. 胃脘部
- B. 左下腹
- C. 痛无定处
- D. 右下腹
- E. 脐周部

答案:E

解析:

标签:

中等

记忆

精华

77. 蛲虫病的预防措施除了

- A. 在集体儿童机构，开展普查普治
- B. 进行卫生宣教工作
- C. 培养良好的卫生习惯
- D. 每年预防性口服灭虫药物
- E. 集体儿童机构勤用湿扫法打扫室内

答案:D

解析:蛲虫病的预防措施: ①在集体儿童机构，开展普查普治及进行卫生宣教工作; ②培养良好的卫生习惯; ③注意环境卫生，对集体儿童机构勤用湿扫法打扫室内或紫外线消毒，玩具消毒。

标签:

中等

记忆

精华

78. 下列各项中，不属于心脏按压有效指征的是

- A. 心率恢复正常
- B. 口唇及甲床颜色转红
- C. 颈动脉搏动，动脉血压>60mmHg
- D. 出现自主呼吸
- E. 肌张力增强

答案:E

解析:胸外按压队有效指征也常常和心肺复苏的有效指征混作一谈，一般如下述：①能扪及大动脉搏动、可测及一较低的血压数值；②末梢循环改善、口唇、颜面、皮肤、指端由苍白发绀转为红润，肢体转温；③瞳孔缩小，并出现对光反射；④自主呼吸恢复；⑤昏迷变浅，出现反射、挣扎或躁动。

标签:

中等

记忆

精华

79. 急惊风的主要病因是()

- A. 内蕴痰热
- B. 暴受惊恐
- C. 外感时邪
- D. 乳食内积
- E. 热病伤阴

答案:C

解析:

标签:

中等

记忆

精华

80. 患者，男，多发性疔肿，红肿热痛，部分溃破流出黄脓，发热口渴，舌苔薄黄，脉数，治疗应首选

- A. 黄连解毒汤
- B. 防风通圣散
- C. 四妙散
- D. 银翘散
- E. 五神汤

答案:B

解析:疔病—祛风清热利湿—防风通圣散加减；证候:好发于项后、背部、臀部等，数个到数十个，反复发作，缠绵经年不愈。阴虚者兼有口渴唇燥，舌红，苔薄，脉细数；脾虚者兼有面色萎黄，纳少便溏，舌淡或有齿痕，苔薄，

脉濡。

标签:

81. 患者疮疡日久，现局部肿势已退，疮口腐肉已尽，而脓水稀薄色灰，新肉不生，状如镜面，光白板亮，不知疼痛；全身热不退，形神委顿，纳食日减，自汗肢冷，气息短促；舌淡，苔薄白，脉沉细，诊断为

- A. 干陷
- B. 火陷
- C. 走黄
- D. 顺证
- E. 虚陷

答案:E

解析:虚陷:局部肿势已退，疮口腐肉已尽，而脓水稀薄色灰，或偶带绿色，新肉不生，状如镜面，光白板亮，不知疼痛；全身热不退，形神委顿，纳食日减，或有腹痛便泻，自汗肢冷，气息短促；舌淡，苔薄白或无苔，脉沉细或虚大无力。

标签:

82. 患者，女，26岁。半年前出现心悸、多食、手抖。现症见口燥咽干、潮热盗汗、心悸、失眠多梦、舌质红，苔少，脉细数。查体:消瘦，心率118次/分，律齐，双侧突眼，双甲状腺II度肿大，应首先考虑的中医是

- A. 瘰病，痰瘀互结证
- B. 瘰病，阴虚火旺证
- C. 瘰病，肝气郁结证
- D. 瘰病，肝肾不足证
- E. 瘰病，痰瘀互结证

答案:B

解析:各选项区别明显，题干阴虚火旺症状明显。方用知柏地黄丸合当归六黄汤。

标签:

83. 患者，女，45岁。1周前发现右乳外上结节，直径约2.5cm，较硬，不易推动，无压痛，乳头轻度内陷，皮肤呈橘皮样，右侧腋下触及一直径0.8cm的淋巴结，表现光滑，活动度差。应首先考虑的中医诊断是

- A. 乳癖
- B. 乳核
- C. 乳岩
- D. 乳癆
- E. 乳痈

答案:C

解析:乳腺癌包块质硬，表面不光滑，边界不清，活动度差，无压痛，局部

皮肤可有酒窝征，橘皮样改变，乳头可内陷、溢液，乳腺癌相当于中医学上的乳岩。乳腺囊性增生病，属于中医乳癖。乳房纤维腺瘤属中医乳核范畴，肿块圆形，表面光滑，边界清楚，活动度大。乳痨是乳房部的慢性化脓性疾病，相当于西医的乳房结核，肿块边界不清，皮肉相连，日久破溃。乳疔是指乳房部的急性化脓性病变。故本题选 C。

标签:

84. 患者，男，29 岁，饱餐后突发上腹剧痛 2 小时，并向全身扩散，疼痛难忍，伴恶心呕吐，面色苍白，体格检查：血压下降，体温升高，呼吸运动变浅，腹式呼吸消失，手足凉，出冷汗，全腹有明显压痛、反跳痛，腹肌强直呈板样硬，肝浊音界缩小，X 线检查，可见游离气腹征，应首先考虑的诊断是

- A. 急性胃炎
- B. 急性胆囊炎
- C. 消化性溃疡并发穿孔
- D. 急性胰腺炎
- E. 胆结石

答案:C

解析:症状:剧烈腹痛(夜间空腹或饱食后突发、持续，上腹刀割样剧痛，迅速波及全腹)。休克症状、恶心呕吐。③体征:腹膜刺激征(板状腹)、积气积液。检查:立位腹部平片提示膈下新月状游离气体，对诊断有重要意义。

标签:

85. 患者，男，32 岁。酗酒后突感左上腹剧痛，并向左腰部放射，伴发热，恶心呕吐。查体:腹平软，左上腹呈束带式压痛，肝、脾不大。应首先考虑的是

- A. 急性胆囊炎
- B. 急性胰腺炎
- C. 急性肠炎
- D. 心肌梗死
- E. 急性胃炎

答案:B

解析:急性胰腺炎腹痛剧烈，起始于中上腹，也可偏重于右上腹或左上腹，放射至背部，累及全胰则呈腰带状向腰背部放射痛，伴恶心、呕吐、腹胀，可有发热、腹膜炎体征、黄疸等。A 表现为右上腹阵发性绞痛。C 伴腹泻。D 腹部无压痛，查心电图及心肌酶谱等可鉴别。E 为中上腹持续性剧痛，与酗酒无关。故本题选 B。

标签:

86. 患者，男性，80 岁，出现便血，伴贫血、腹痛、右下腹肿块 1 个月，无发热，伴明显消瘦、腹胀，应首先考虑的诊断是

- A. 慢性阑尾炎
- B. 阑尾类癌
- C. 结肠癌
- D. 溃疡性结肠炎
- E. 肠结核

答案:C

解析:B、E 首先排除。慢性阑尾炎，不伴明显消瘦，伴右下腹压痛。溃疡性结肠炎主要表现为腹泻、腹痛(便后痛减)、黏液脓血便，重症才伴贫血、消瘦，但无肿块。结肠癌诊断要点:贫血、腹部肿块、腹痛;便血、粘液便、肠梗阻。

标签:

87. 患者，男，32 岁。阴囊潮红，睾丸肿痛 2 天，伴发热恶寒，舌红苔黄腻，脉弦数。治法

- A. 清热利湿，解毒消肿
- B. 疏肝解毒，活血散结
- C. 疏肝解郁，清热消肿
- D. 凉血解毒，活血散结
- E. 扶正托毒，散结解毒

答案:A

解析:据患者症状可诊断为睾丸炎湿热下注证，治宜清热利湿，解毒消肿。

标签:

88. 患者，男，47 岁。3 周前有不洁性交史，近日发现在冠状沟和龟头部位出现一椭圆形溃疡，质硬，边界清楚。右侧腹股沟处可触及质硬的淋巴结，无明显压痛，伴大便秘结，小便黄赤。应首先考虑的诊断是

- A. 二期梅毒
- B. 尖锐湿疣
- C. 生殖器疱疹
- D. 潜伏梅毒
- E. 一期梅毒

答案:E

解析:一期梅毒主要表现为硬下疳，发生于不洁性交后约 2-4 周;二期梅毒主要表现为杨梅疮，一般发生在感染后 7-10 周或硬下疳出现后 6-8 周;三期梅毒除皮肤黏膜损害外，常侵犯多个脏器(粘膜、骨、眼、心血管、神经、脑)。西医治疗青霉素疗效确切。

标签:

89. 患者，女，24 岁，已婚。停经 45 天，已确诊为早孕，10 天来恶心呕吐频繁，食入即吐。吐出物带血丝，精神萎靡，便结尿少，眼眶下陷，脉细滑无力，检查尿酮体阳性，治疗应首选

- A. 生脉散合增液汤
- B. 口服维生素 B6 加生脉散合益胃汤
- C. 输液加生脉散合益胃汤
- D. 输液加苏叶黄连汤合益胃汤
- E. 输液加香砂六君子汤合益胃汤

答案:C

解析:西医治疗:①镇静止呕:维生素 B1、B6、C,小剂量镇静剂(苯巴比妥)对轻症有一定效果。②纠正脱水、电解质紊乱及酸碱失衡:每日补液量不少于 3000mL,尿量维持在 1000mL 以上,酸中毒者,静点碳酸氢钠溶液。经治疗 2~3 日后,病情多迅速好转。③终止妊娠指:治疗无好转,体温持续高于 38℃、心动超过 120 次/分、出现持续黄疸或持续蛋白尿,或伴发 Wernicke 综合征。正常只要求掌握脾虚痰滞和肝胃不和证。此题为考纲后附的加减方,属于变证(重症)

标签:

90. 患者,女,25 岁,已婚,闭经 4 个月,下腹隐痛 1 周,阴道少量流血 3 天,妇科检查宫颈口闭,子宫如孕 6 周大小,双附件无异常,于停经 45 天,曾做尿妊娠试验(+),应首先考虑的是

- A. 稽留流产
- B. 感染性流产
- C. 月经稀发
- D. 先兆流产
- E. 正常妊娠

答案:A

解析:稽留流产(胎死不下、过期流产):胚胎或胎儿已死亡,滞留在宫腔内未及时自然排出。胚胎或胎儿死后子宫不增大反缩小,早孕反应消失。子宫颈口关闭,子宫明显小于停经周数,质地不软,未闻及胎心音。故选 A。

标签:

91. 患者,女,32 岁。带下量明显增多 3 天,色黄质稠,臭秽,外阴瘙痒,小便黄赤,舌红,苔黄,脉滑数。查体:宫颈充血,宫颈口可见脓性分泌物流出,分泌物培养:淋病奈瑟菌(+). 中西医治疗为

- A. 左氧氟沙星+止带方
- B. 头孢曲松+止带方合五味消毒饮
- C. 头孢噻肟+龙胆泻肝汤
- D. 阿奇霉素+完带汤
- E. 多西环素+内补丸

答案:B

解析:淋病奈瑟菌、宫口脓性分泌物,诊断为宫颈炎。淋病奈瑟菌性宫颈炎常用药如头孢曲松钠、头孢克肟、氨基糖苷类。治疗沙眼衣原体有四环素类

和多西环素，红霉素类如阿奇霉素，喹诺酮类如氧氟沙星。故排除 ACDE。苔黄辨为热毒蕴结证用止带方合五味消毒饮，苔黄腻为湿热蕴结证用龙胆泻肝汤。完带汤用于脾虚湿盛证、内补丸用于肾阳虚损证，故排除 CDE。

标签：

92. 患者，女，34 岁，月经周期 20-22 天一行，量少，色淡黯，腰膝酸软，头晕耳鸣，夜尿频多，舌质淡黯，苔薄白，脉沉细，曾 2 次发现怀孕不足 40 天时流产，现测基础体温双相，其病证结合诊断是

- A. 排卵性月经过多，肾气不固证
- B. 排卵期出血，肾气不固证
- C. 黄体功能不足，肾气不固证
- D. 黄体功能不足，脾气虚弱证
- E. 无排卵性异常子宫出血，肾虚证

答案:C

解析:体温双向，有排卵，排除 E。月经量少排除 A，无时间提示排除 B。月经周期缩短、月经量少，尤其伴有流产，考虑黄体功能不足。腰膝酸软肾气不足。

标签：

93. 患者，女，32 岁。1 年前人流后，至今闭经，测基础体温为双相型，诊刮宫内无组织刮出。首先应考虑的诊断是

- A. 下丘脑性闭经
- B. 垂体性闭经
- C. 卵巢性闭经
- D. 子宫性闭经
- E. 原发性闭经

答案:D

解析:本题人流后出现为继发性闭经，基础体温双相卵巢功能正常。无 FSH、LH 异常提示、诊刮无子宫内膜增生，考虑为子宫性闭经。值得注意的是人流、产后出血造成子宫内膜损伤则不能对卵巢激素产生发应为子宫性，产后大出血致垂体缺血坏死功能减退为垂体性闭经。

标签：

94. 患者，女，51 岁，已婚。月经紊乱 2 年。近半年，常感颜面烘热，汗出恶风，腰背冷痛，头晕耳鸣，舌质淡，苔薄白，脉沉细。其治法是

- A. 滋肾养肝，佐以潜阳
- B. 滋肾柔肝，育阴潜阳
- C. 滋肾育阴，宁心安神
- D. 滋阴补肾，调补冲任
- E. 温肾扶阳

答案:D

解析:本患者已婚, 月经紊乱, 常感颜面烘热, 汗出恶风, 腰背冷痛, 苔薄白, 脉沉细, 属于肾阳虚症候; 头晕耳鸣, 为肾阴虚症候; 故可以判断为阴阳两虚, 治疗应该益阴扶阳(滋阴补肾, 调补冲任)。故本题选D。

标签:

95. 患儿, 3岁。发热, 恶风, 有汗, 鼻流浊涕, 咽红肿痛, 舌红, 苔薄黄, 指纹浮紫, 兼见咳嗽较剧, 痰多, 喉间痰鸣。其中医治法是

- A. 辛凉解表, 清肺化痰
- B. 辛温解表, 清肺化痰
- C. 清暑解表, 清肺化痰
- D. 清热解毒, 清肺化痰
- E. 辛凉解表, 消食导滞

答案:A

解析:患儿发热, 恶风, 有汗, 鼻流浊涕, 咽红肿痛, 舌红, 苔薄黄, 指纹浮紫, 考虑风热感冒, 治宜辛凉解表, 又兼咳嗽, 痰多考虑感冒夹痰故应在辛凉解表同时清肺化痰。

标签:

96. 患儿, 3岁。发热, 上颚、齿龈、口角溃烂, 周围粘膜色红, 拒食, 口臭, 涎多, 大便秘结, 舌红, 苔腻黄, 指纹紫。其中医证候是

- A. 虚火上炎证
- B. 心火上炎证
- C. 风热乘脾证
- D. 胃肠结热证
- E. 肝胆湿热证

答案:C

解析:本病以口疮为突出症状, 上颚、齿龈、口角溃烂, 周围粘膜色红, 可诊断为疱疹性口炎。疱疹性口炎多由于风热乘脾、心脾积热, 或虚火上炎所致。本病的心火上炎证见舌上、舌边溃烂。虚火上炎证见口腔溃疡较少, 呈灰白色, 周围色不红或微红。

标签:

97. 患儿, 女, 8个月。腹泻4天, 每日泻下近10次, 泻下急迫, 质稀如水, 色黄臭秽, 肛门灼热, 小便黄短, 伴发热, 舌质红, 苔薄白, 指纹紫。目前最容易出现的变证是

- A. 邪陷厥阴证
- B. 气阴两伤证
- C. 阴竭阳脱证
- D. 虚阳外越证
- E. 内闭外脱证

答案:B

解析:气阴两伤证症状见泻下过度,质稀如水,精神委软或心烦不安,目眶及凶门凹陷,皮肤干燥或枯瘪,啼哭无泪,口渴引饮,小便短少,甚至无尿,唇红而干,舌红少津,苔少或无苔,脉细数。

标签:

98. 患儿,男,7岁,4周前曾发热,咽痛,诊断为急性化脓性扁桃体炎。1天前出现双眼睑水肿,继而下肢水肿,按指凹陷即起,尿少色赤,恶风,咳嗽,舌质淡,苔薄黄,脉浮。治疗应首选的方剂是

- A. 三仁汤和猪苓汤
- B. 己椒苈黄汤和参附汤
- C. 参苓白术散和三仁汤
- D. 五味消毒饮和小蓟饮子
- E. 麻黄连翘赤小豆汤合五苓散

答案:E

解析:患儿曾有化脓性扁桃体炎病史,现出现水肿尿少等症状,可诊断为急性肾小球肾炎。从症状可推知为风水相搏证,治疗当选麻黄连翘赤小豆汤合五苓散。

标签:

99. 患儿,女,5岁。面色不华,已逾3个月,指甲苍白,纳食不佳,四肢乏力,大便溏泻,舌淡苔薄白,脉细无力。血常规示小细胞低色素性贫血。治疗应首选

- A. 八珍汤
- B. 大补元煎
- C. 六君子汤
- D. 保和丸
- E. 补中益气汤

答案:C

解析:脾胃气虚基础方为四君子汤。补中益气汤用于脾虚气陷和气虚发热证,补气升提有余而补血不足;保和丸用于食滞胃脘证;大补元煎用于年老体虚,中气不足之证;八珍汤用于气血两虚证。故本题选C。

标签:

100. 患儿,10岁。起病急,高热,皮肤出现瘀点、瘀斑,色泽鲜红,伴鼻衄,齿衄,口渴喜饮,大便秘结,小便黄赤,舌红苔黄,脉弦数。其中医治法是

- A. 祛风清热,凉血宁络
- B. 清热解毒,凉血止血
- C. 清热利湿,通络止痛
- D. 滋阴补肾,活血化瘀
- E. 益气活血,化瘀消斑

答案:B

解析:本病为感染后出现皮肤瘀点瘀斑,符合过敏性紫癜的诊断,患儿有鼻衄、齿衄等出血症状,并无腹痛腹胀等胃肠积热症状,可诊断为血热妄行证,治当清热解毒凉血化斑。

标签:

101. 患儿,女,2岁,长期吃不知名的奶粉后,四肢出现凹陷性水肿,四肢欠温;表情淡漠,不喜活动,哭声低微,时有烦躁,诊断为

- A. 营养性缺铁性贫血
- B. 肾病综合征
- C. 小儿肥胖症
- D. 维生素D缺乏性佝偻病
- E. 蛋白质-能量营养不良

答案:E

解析:蛋白质-能量营养不良的水肿型营养不良:又称恶性营养不良病,常伴有能量摄入不足。出现凹陷性水肿。

标签:

102. 患儿,男,6岁。腹痛剧烈,以右上腹为主,疼痛时时发凉,恶心呕吐,并吐出蛔虫。其诊断为

- A. 呕吐
- B. 蛔厥证
- C. 腹痛
- D. 虫瘕证
- E. 肠虫证

答案:B

解析:此患儿表现为蛔虫病之蛔厥证。蛔厥证证候:具有蛔虫证的一般症状。突然右上腹阵发性绞痛,弯腰曲背,辗转不安,恶心、呕吐,肢冷汗出,常吐出蛔虫。重者腹痛持续,时轻时剧,畏寒发热,甚则出现黄疸。舌苔黄腻,脉弦数或滑数。治法:安蛔定痛,继以驱虫。方药:乌梅丸加减。

标签:

103. 患儿,4岁,症见睡中遗尿,小便黄而少,伴见性情急躁,手足心热,面赤唇红,口渴多饮,舌红苔黄腻,脉滑数。治疗方剂宜选用

- A. 缩泉丸
- B. 菟丝子散
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 萆薢渗湿汤
- E. 交泰丸合导赤散

答案:C

解析:根据题干给出的信息,诊断为小儿遗尿之肝经湿热证。证候:睡中遗尿,

小便黄而少，性情急躁，夜梦纷纭，或夜间(齿介)齿；手足心热，面赤唇红，口渴多饮，甚或目睛红赤，舌红苔黄腻，脉滑数。治法：清热利湿，缓急止遗。方药：龙胆泻肝汤加减。

标签：

A3/A4 型选择题

(104-1~104-3 题共用题干)

患儿，男，12 岁。右足底被铁锈钉刺伤 7 天，突然出现张口困难，继之出现苦笑面容，角弓反张，声响及触碰患者可诱发上述症状，患者神志清楚，不发热。

104. 该病致病菌属于下列哪一项

- A. 革兰染色阳性厌氧芽胞杆菌
- B. 革兰染色阴性厌氧拟杆菌
- C. 革兰染色阴性变形杆菌
- D. 革兰染色阳性梭形芽胞杆菌
- E. 革兰染色阴性大肠杆菌

答案：A

解析：根据典型的临床表现可诊断为破伤风，破伤风杆菌为革兰染色阳性厌氧芽胞杆菌。

标签：

超纲

记忆

简单

精华

105. 该病是

- A. 脓毒血症
- B. 菌血症
- C. 败血症
- D. 脓血症
- E. 毒血症

答案：E

解析：破伤风为毒血症，破伤风杆菌并不进入血液循环。

标签：

超纲

记忆

简单

精华

106. 对机体威胁最大的是下列哪一项

- A. 肌肉断裂

- B. 骨折
- C. 持续的呼吸肌痉挛
- D. 尿潴留
- E. 营养障碍

答案:C

解析:持续的呼吸肌痉挛对机体威胁最大,可致窒息。

标签:

超纲

记忆

简单

精华

(107-1~107-3 题共用题干)

患者,女,39岁,已婚,外阴瘙痒1周,带下量多,呈灰白色,质稀薄,有鱼腥味,阴道黏膜无充血,分泌物易从阴道壁拭去,氨臭味实验阳性。

107. 考虑诊断是

- A. 滴虫阴道炎
- B. 外阴阴道假丝酵母菌病
- C. 细菌性阴道病
- D. 萎缩性阴道炎
- E. 老年性阴道炎

答案:C

解析:阴道炎①滴虫阴道炎,分泌物呈灰黄色稀薄泡沫状。②外阴阴道假丝酵母菌,分泌物呈凝乳或豆腐渣样。③细菌性阴道病,分泌物灰白色、均质、稀薄、腥臭。④萎缩性阴道炎,分泌物多呈水样,干涩感。

标签:

108. 致病因素是

- A. 滴虫
- B. 假丝酵母菌
- C. 厌氧菌
- D. 乳杆菌
- E. 淋病奈瑟菌

答案:C

解析:滴虫阴道炎,阴道毛滴虫。外阴阴道假丝酵母菌病,假丝酵母菌。细菌性阴道病,加德纳菌、厌氧菌、人型支原体。

标签:

109. 主要治疗措施

- A. 口服甲硝唑
- B. 冲洗外阴

- C. LEEP 刀技术
- D. 激光疗法
- E. 熏洗

答案:A

解析:厌氧菌, 甲硝唑。

标签:

(110-1~110-3 题共用题干)

患儿, 1 岁, 腹泻 2 天, 泻下过度, 大便如水注, 精神萎靡, 眼眶及囟门凹陷, 皮肤干燥, 啼哭无泪, 口唇干燥, 小便短少, 舌红少津, 脉细数, 血压 70/50mmHg, 大便(-)。

110. 中医治法是

- A. 消食导滞, 和中止泻
- B. 温补脾肾, 固涩止泻
- C. 补脾温肾, 固涩止泻
- D. 健脾益气, 益气养阴
- E. 挽阴回阳, 救逆固脱

答案:D

解析:泄泻之气阴两伤证。证候:泻下过度, 质稀如水, 精神萎软或心烦不安, 眼眶及囟门凹陷, 皮肤干燥或枯瘪, 啼哭无泪, 口渴引饮, 小便短少, 甚至无尿, 唇红而干, 舌红少津, 苔少或无苔, 脉细数。治法:健脾益气, 酸甘敛阴。方药:人参乌梅汤加减。

标签:

111. 首选方剂是

- A. 当归四逆汤
- B. 参苓白术散
- C. 人参乌梅汤
- D. 附子理中汤合四神丸
- E. 生脉散合参附龙牡救逆汤

答案:C

解析:泄泻之气阴两伤证方选人参乌梅汤。生脉散合参附龙牡救逆汤用于阴竭阳脱证。

标签:

112. 若患儿伴低血容量性休克, 扩容时应首选

- A. 2:1 等张含钠液
- B. 2/3 张含钠液
- C. 1/2 张含钠液
- D. 1/3 张含钠液
- E. 1/4 张含钠液

答案:A

解析:对重度脱水伴低血容量休克的患儿,扩容时,用2:1等张含钠液(2份生理盐水和1份1.4%碳酸氢钠)20ml/kg,总量不超过300ml,于30~60分钟静脉推注或快速滴注。

标签:

(113-1~113-3题共用题干)

患者,男,35岁。突感上腹部剧痛。检查:血压130/80mmHg,脉搏110次/分,板样腹。肠鸣音消失。血红蛋白120g/L,血白细胞数 $8.0 \times 10^9/L$ 。

113. 下列哪一项是首先应采取的检查

- A. 腹部CT
- B. 腹部B超
- C. 腹腔穿刺
- D. 腹部MRI
- E. 腹部立位X线平片

答案:E

解析:据临床表现考虑为消化性溃疡穿孔,消化道穿孔时80%的患者立位腹部X线平片可见右隔下游离气体。

标签:

记忆

简单

精华

114. 下列哪一项提示病情危险

- A. 脉搏加快,体温下降
- B. 体温持续升高,寒战
- C. 脉搏加快,体温上升
- D. 腹痛加重,大汗淋漓
- E. 恶心、呕吐频繁

答案:A

解析:脉搏加快,体温下降考虑出现休克。

标签:

超纲

记忆

简单

精华

115. 若腹穿抽出较多液体,应尽早采取的治疗措施是哪一个

- A. 手术探查
- B. 镇痛镇静治疗
- C. 全量应用抗生素

- D. 输液，纠正水、电解质、酸碱失衡
- E. 胃肠减压、输液

答案:A

解析:腹穿抽出较多液体，考虑穿孔破损较大，因此应尽早手术。

标签:

记忆

简单

精华

B1 型选择题

(116-1~116-2 题共用备选答案)

- A. 接触法
- B. 透光法
- C. 点压法
- D. B 超
- E. 穿刺法

116. 诊断浅表脓肿应首选的检查方法

答案:A

解析:解析见下题。

标签:

117. 诊断膈下脓肿应首选的检查方法

答案:E

解析:辨脓的操作方法:有接触法(浅部脓肿)、透光法、穿刺法(膈下脓肿)、点压法、B 超等。

标签:

(118-1~118-2 题共用备选答案)

- A. 停止输血，积极抗休克，维持循环功能，保护肾功能和防治弥散性血管内凝血
- B. 保证血源质量，防止血源污染，严格无菌操作
- C. 主要措施为抗休克、抗感染
- D. 立即停止输血，半坐位，吸氧和利尿
- E. 立即减慢输血速度，严重者停止输血

118. 针对输血后的发热反应，应采取

答案:E

解析:A 为溶血反应处理。B 为细菌污染反应的预防措施。D 为循环超负荷处理

标签:

119. 针对输血的细菌污染反应，应采取

答案:C

解析:注意 B 为预防,而非对并发症的处理。

标签:

(120-1~120-2 题共用备选答案)

- A. 黄连解毒汤
- B. 五味消毒饮
- C. 清营汤
- D. 托里消毒散
- E. 附子理中汤

120. 治疗火陷证,应首选的方剂是

答案:C

解析:A、B 用于疔疮走黄证, D 用于干陷, E 用于虚陷。

标签:

121. 治疗干陷证,应首选的方剂是

答案:D

解析:A、B 用于疔疮走黄证, D 用于干陷, E 用于虚陷。

标签:

(122-1~122-2 题共用备选答案)

- A. 瘙痒
- B. 便血
- C. 便秘
- D. 流脓
- E. 疼痛

122. 内痔的主要临床表现是

答案:B

解析:解析见下题。

标签:

123. 血栓外痔的主要临床表现是

答案:E

解析:内痔临床表现:便血(主要)、坠胀、脱出。外痔:结缔组织性外痔(皮痔),异物感;静脉曲张性外痔(血痔),坠胀;血栓性外痔(葡萄痔),疼痛。

标签:

(124-1~124-2 题共用备选答案)

- A. 滋阴清热,通淋排石
- B. 行气利水,通淋排石
- C. 清热利湿,消石通淋
- D. 行气活血,通淋排石
- E. 补肾益气,通淋排石

124. 患者右肾结石,腰酸坠胀,疲乏无力,尿色赤红,舌淡红苔薄白,脉细。

其治法是

答案:E

解析:肾气不足证,治法应为补肾益气,通淋排石,方选济生肾气丸。

标签:

125. 患者左输尿管结石,停留日久不移,外形不整,腰部胀痛,舌有瘀点,脉沉涩。治法

答案:D

解析:输尿管结石患者证属气滞血瘀,法应行气活血,通淋排石,方用金铃子散合石韦散。

标签:

(126-1~126-2 题共用备选答案)

- A. 逍遥散加减
- B. 二仙汤合开郁散
- C. 清瘟败毒饮合桃红四物汤加减
- D. 人参养荣汤加减
- E. 失笑散合开郁散加减

126. 针对乳腺癌肝郁气滞证者,宜用

答案:A

解析:解析见下题。

标签:

127. 针对乳腺癌冲任失调证者,宜用

答案:B

解析:乳腺癌中医辨证论治,肝郁气滞用逍遥散;冲任失调证用二仙汤;毒热蕴结证用清瘟败毒饮合桃红四物汤;气血两虚证用人参养荣汤。失笑散合开郁散用于乳腺增生-痰瘀凝结证。

标签:

(128-1~128-2 题共用备选答案)

- A. 举元煎
- B. 补中益气汤
- C. 归脾汤
- D. 安冲汤
- E. 固本止崩汤

128. 黄体功能不足脾气虚证

答案:B

解析:解析见下题。

标签:

129. 排卵期出血脾气虚证

答案:C

解析:无排卵性功血,脾虚证,固本止崩汤合举元煎。排卵性月经过多,气虚证,安冲汤。黄体功能不足,脾气虚弱,补中益气汤。子宫内膜不规则脱落,气虚证,举元煎。排卵期出血,脾气虚证,归脾汤。记忆方式:无排卵性功血,中医称崩漏,固本止“崩”汤合举元煎。排卵性月经过多,中医称月经过多,安“冲”汤。黄体功能不足,中医称月经先期,补“中”益气汤。子宫内膜不规则脱落,中医称月经延长,“举”元煎。排卵期出血,中医称经间期出血,“归”脾汤。崩崩多冲,先中长举间归。

标签:

(130-1~130-2 题共用备选答案)

- A. 妊娠 20 周前阴道出血或腹痛
- B. 妊娠 28 周阴道反复无痛性出血
- C. 子宫软,大小与停经月份不相符
- D. 孕晚期反复无痛性阴道出血
- E. 孕晚期或分娩期腹痛伴阴道出血

130. 胎盘早剥 I 度表现出的症状是

答案:E

解析:妊娠 20 周后或分娩期正常位置的胎盘在胎儿娩出前部分或全部从子宫壁剥离。I 度剥离面积小,见于分娩期:轻度腹痛或无腹痛

标签:

131. 前置胎盘孕晚期表现出的症状是

答案:D

解析:妊娠 28 周,胎盘附于子宫下段,胎盘下缘达到宫颈内口,位置低于胎儿先露。无诱因无痛性反复阴道流血

标签:

(132-1~132-2 题共用备选答案)

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 银甲丸
- C. 大黄牡丹皮汤
- D. 黄芪建中汤
- E. 清热调血汤

132. 治疗盆腔炎性疾病湿热瘀结证,应首选的方剂是

答案:B

解析:龙银甲丸或当归芍药散用于湿热瘀结证。

标签:

133. 治疗痛经的湿热瘀阻证,应首选的方剂是

答案:E

解析:痛经湿热瘀阻证用清热调血汤,气血虚弱用黄芪建中汤。

标签:

(134-1~134-2 题共用备选答案)

- A. 宫颈黏液结晶
- B. 阴道脱落细胞检查
- C. 分段诊刮
- D. 宫颈刮片
- E. 阴道镜检查+活检

134. 宫颈癌的筛查的主要方法

答案:D

解析:宫颈刮片细胞学检查:宫颈癌筛查的主要方法。应在宫颈移行区刮片可发现早期病变。

标签:

135. 确诊宫颈癌, 应首选的检查方法是

答案:E

解析:宫颈癌的辅助检查:(1)宫颈刮片细胞学检查是宫颈癌筛查的主要方法。(2)高危型 HPV-DNA 检测需与宫颈细胞学检查结合, 可提高宫颈癌及癌前病变的敏感性。(3)阴道镜检查——宫颈刮片细胞学检查巴氏 3 级及其以上、TBS 分类为鳞状上皮内病变, 均应在阴道镜观察下选择可疑癌变区行宫颈活组织检查。(4)宫颈和宫颈管活组织检查为确诊宫颈癌及宫颈癌前病变的最可靠依据。(5)宫颈锥切术用于当宫颈细胞学检查多次阳性而宫颈活检阴性, 或宫颈活检为原位癌需确诊者。故为确诊宫颈癌, 应在阴道镜观察下选择可疑癌变区行活检查, 本题选 E。

标签:

(136-1~136-2 题共用备选答案)

- A. 补气通乳饮
- B. 济生肾气丸
- C. 加味四物饮
- D. 木桶散
- E. 黄芪当归散

136. 产后尿储留肾虚证, 治疗首选

答案:B

解析:产后尿潴留:肾虚证—补肾温阳, 化气利水—济生肾气丸

标签:

137. 产后尿失禁气虚证, 治疗首选

答案:E

解析:产后小便失禁与频数:气虚证—益气固摄—黄芪当归散加山茱萸、益智仁

标签:

(138-1~138-2 题共用备选答案)

- A. 开郁种玉汤
- B. 六味地黄丸
- C. 养精种玉汤
- D. 少腹逐瘀汤
- E. 右归丸

138. 治疗不孕症肾阴虚证，应首选方剂是

答案:C

解析:肾阴虚证—滋阴养血，调冲益精—养精种玉汤合清骨滋肾汤

标签:

139. 治疗不孕症肝郁证，应首选的方剂是

答案:A

解析:肝郁证—疏肝解郁，养血理脾—开郁种玉汤

标签:

(140-1~140-2 题共用备选答案)

- A. 补肾壮骨，填阴温阳
- B. 补肺益肾，活血祛瘀
- C. 健脾益气，补肺固表
- D. 理气益肺，止咳化痰
- E. 扶正固表，调和营卫

140. 反复呼吸道感染营卫失和，邪毒留恋证的治法是

答案:E

解析:营卫不和—调和营卫。

标签:

141. 反复呼吸道感染肾虚骨弱，精血失充证的治法是

答案:A

解析:肾虚骨弱—补肾壮骨。

标签:

(142-1~142-2 题共用备选答案)

- A. 运脾和胃，消食化滞
- B. 健脾益气，化湿止泻
- C. 疏风散寒，化湿和中
- D. 清热燥湿，分利止泻
- E. 抑肝扶脾，燥湿止泻

142. 患者腹痛肠鸣，泻下粪便臭如败卵，泻后痛减，舌苔厚腻，脉滑实。其中医治法是

答案:A

解析:臭如败卵，伤食泻，运脾和胃，消食化滞。

标签:

143. 患者泄泻清稀，夹有泡沫，臭气不甚，恶寒发热，舌苔白，脉浮紧。其中医治法是

答案:C

解析:泄泻清稀，寒证，恶寒，外感风寒，是寒风寒泻，疏风散寒，化湿和中。

标签:

(144-1~144-2 题共用备选答案)

- A. 高热骤降，涕泪横流，两目红赤
- B. 高热不退，咳嗽气促，鼻翼痰鸣
- C. 壮热起伏，烦躁不安，咳嗽阵作
- D. 高热不退，烦躁谵妄，四肢抽搐
- E. 高热不退，声音嘶哑，声如犬吠

144. 小儿麻疹邪毒闭肺证的证候是

答案:B

解析:解析见下题。

标签:

145. 小儿麻疹麻毒攻喉证的证候是

答案:E

解析:逆证:1)邪毒闭肺，见高热不退，咳嗽气促，喉间痰鸣，鼻翼煽动，口渴烦躁，面色青灰，皮疹稠密，疹色紫暗，大便秘结，小便短赤，舌质红赤，舌苔黄腻，脉数有力。2)麻毒攻喉，见身热不退，咽喉肿痛或溃烂疼痛，声音嘶哑，咳声重浊，声如犬吠，或饮水呛咳，吞咽不利，甚则吸气困难，面唇紫绀，烦躁不安，舌质红赤，舌苔黄腻，脉滑数。3)邪陷心肝，见高热不退，烦躁谵妄，皮疹稠密，聚集成片，色泽紫暗，甚至神昏、抽搐，舌质红绛，苔黄起刺，脉数有力。

标签:

(146-1~146-2 题共用备选答案)

- A. 自汗为主，头部，肩背部明显
- B. 自汗为主，汗出遍身而不温
- C. 盗汗为主，手足心热
- D. 自汗或盗汗，头部，四肢为多
- E. 盗汗为主，头部明显

146. 小儿汗证肺卫不固证的表现是

答案:A

解析:小儿汗证肺卫不固证症状:以自汗为主，以头部、肩背明显，动则益甚，神倦乏力，面色少华，肢端欠温，平素易感，舌质淡，或边有齿印，苔薄，脉象较弱。

标签:

147. 小儿汗证营卫失调证的表现是

答案:B

解析:小儿汗证营卫失调证症状:自汗为主,汗出遍身,畏寒怕风,或伴有低热,精神疲倦,胃纳不振,舌质淡红,苔薄白,脉缓。

标签:

(148-1~148-2 题共用备选答案)

- A. 驱蛔杀虫
- B. 散结下虫
- C. 安蛔定痛
- D. 调理脾胃
- E. 通腑排蛔

148. 治疗蛔厥证的主要方法是()

答案:C

解析:略

标签:

中等

记忆

精华

149. 治疗肠蛔虫病的主要方法是()

答案:A

解析:略

标签:

中等

记忆

精华

