




金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

护士职业资格

学霸养成 记 第22天



30天铸就学霸养成


Students with excellent grades

工欲善其事

必先利其器

1V1咨询
课程了解

考前咨询
专业知识



1. (A1 型题) 住院处护士送病人入病区时其病人的物品应与
- A. 门诊值班医生交接
 - B. 门诊护士长交接
 - C. 病区值班医生交接
 - D. 病区护士长交接
 - E. 病区值班护士交接

1. 答案: E

解析: 住院处收到门诊医生签发的住院证后, 办理入院手续, 由住院处护士送病人入病区, 并与病区的值班护士做好交接(物品)工作。故本题答案为 E。其余选项均不符合。

2. (A2 型题) 对于结核病患者入院时换下的衣物, 正确的处理是

- A. 直接焚烧
- B. 直接存入患者储物柜
- C. 消毒后存放
- D. 直接交给患者家属
- E. 消毒后交给患者

2. 答案: C

解析: 结核病属于传染病, 因此结核病患者入院必须将其衣物进行消毒然后存放。因此答案选 C。

3. (A2 型题) 门诊护士甲接诊到下列患者, 首先应安排入院的是

- A. 急性胃肠炎
- B. 肾绞痛
- C. 急性肾炎
- D. 严重颅脑损伤
- E. 晚期胃癌

3. 答案: D

解析: 门诊护士在接待患者时应按病情轻重缓急来进行安排, 严重颅脑损伤病情严重, 需要立即救治, 应安排提前就诊并做好入院准备。因此答案选 D。

4. (A1 型题) 以下关于出院护理说法错误的是

- A. 协助患者尽快适应原生活和工作
- B. 指导患者办理出院手续
- C. 自动出院者无需告知可自行离院
- D. 停止一切医嘱
- E. 整理病案

4. 答案: C

解析: 自动出院的病人应在出院医嘱上注明“自动出院”, 并要求病人或家属签名认可。因此答案选 C。

5. (A2 型题) 急性心肌梗死患者需住院治疗, 住院处护理人员首先应

- A. 测量生命体征和体重
- B. 介绍病区环境、作息时间及有关规章制度
- C. 填写有关表格
- D. 氧气吸入, 立即用平车送患者入病区
- E. 建立静脉通道, 留血标本送检

5. 答案: D

解析：急性心肌梗死患者病情紧急，在接到病人后应立即吸氧用平车推入病区，准备好急救物品做好抢救准备，E选项在抢救患者过程中可进行操作，待患者抢救过来之后再继续进行ABC几项步骤的进行。因此答案选D。

6. (A1型题) 处理出院病人医疗护理文件的方法，错误的是

- A. 整理病历交病案室保存
- B. 出院病历的最后一页是体温单
- C. 诊断卡、治疗卡夹入病历内
- D. 注销床头卡、饮食卡
- E. 填写病人出院登记本

6. 答案：C

解析：出院后病历排列顺序：住院病历首页、出院记录、入院记录、病史和体格检查单、病程记录、各种检查检验报告单、护理记录单、医嘱单、长期医嘱执行单、体温单。B正确。整理病历交档案室保存，A正确；填写出院病人登记本和出院护理记录，E正确；注销床头卡、饮食卡，D正确；诊断卡、治疗卡应与床头卡、饮食卡一起注销。因此答案选C。

7. (A2型题) 一人搬运患者时，平车与床的位置是

- A. 平行紧靠
- B. 平车头端与床头成锐角
- C. 平车头端与床尾成锐角
- D. 平车头端与床头成钝角
- E. 平车头端与床尾成钝角

7. 答案：E

解析：一人搬运适用于体重较轻或儿科病人，且病情允许的病人。平车头端与床尾呈钝角，便于护士抱起病人后移步转身便可将病人放至平车上。因此答案选E。

8. (A2型题) 用平车运送患者时，做法不正确的是

- A. 冬季注意为患者保暖
- B. 上、下坡时告知患者
- C. 下坡时使患者头在低处一端
- D. 注意观察患者生命体征
- E. 保持行车平稳，维持治疗

8. 答案：C

解析：平车上下坡时，病人的头部应在高处，以防止病人引起不适。因此C项错误，答案选C。

9. (A2型题) 患者，男，46岁，因发热待查住院，护士为其准备床单应

- A. 按其要求准备床位
- B. 根据病情准备
- C. 将其安排在危重病房
- D. 将其安排在隔离病室
- E. 将其安排在办公室旁

9. 答案：B

解析：在接受新入院患者时，要根据新入院患者的病情准备。A、C、D、E选项都是需要确定病情后才能安排，都属于根据病情准备。故选项B是最佳答案。

10. (A2型题) 患者，男，55岁，胃癌大部切除术后34小时，护理等级为

- A. 三级护理

- B. 二级护理
- C. 一级护理
- D. 特别护理
- E. 监护护理

10. 答案：C

解析：一级护理的病情依据是：各种大手术后需严格卧床休息的患者及病情趋于稳定的重症患者，所以选项 C 是正确的。

11. (A2 型题) 患者，女性，74 岁，因慢性心力衰竭，心功能 IV 级入院。经治疗、护理心功能恢复至 II 级，但患者不愿下床活动，护士对其宣教长期卧床的危险，应除外

- A. 活动减少使消化功能减退
- B. 易发生便秘
- C. 易形成深静脉血栓
- D. 易发生扩张性心肌病
- E. 长期卧床，致肌肉萎缩

11. 答案：D

解析：长期卧床活动减少，消化功能减退，易发生便秘，形成深静脉血栓，肌肉萎缩等并发症，A、B、C、E 均正确。D 不是长期卧床的并发症。

12. (A1 型题) 对房颤病人主要应观察

- A. P 波的频率
- B. 病人的主诉
- C. 血压的变化
- D. 心室率的改变
- E. 脉搏的改变

12. 答案：D

解析：心房颤动主要体征是心律绝对不规则、心音强弱不等，患者脉搏次数显著少于心搏数，称为脉搏短绌。快室率房颤和极速型房颤时常致心搏出量明显降低，易导致血流动力学障碍。所以房颤病人主要应观察心室率的改变，本题 D 为正确选项。

13. (A1 型题) 心室颤动的脉搏特征是

- A. 快而规则
- B. 慢而规则
- C. 快而不规则
- D. 慢而不规则
- E. 测不到

13. 答案：E

解析：室颤时，病人意识丧失、抽搐、心音消失、不能触及颈动脉等大动脉搏动与脉搏、无法测到血压、呼吸不规则或停止，以及瞳孔散大、对光反射消失，故本题选 E。

14. (A1 型题) 窦性心动过速不发生于哪种情况

- A. 发热
- B. 甲状腺功能亢进症
- C. 运动
- D. 贫血

E. 甲状腺功能减退症

14. 答案：E

解析：窦性心动过速的原因有：健康人运动和情绪紧张可引起心动过速。酒、茶、咖啡和药物如异丙肾上腺素和阿托品常引起窦性心动过速。在疾病状态中常见的病因为发热、低血压、缺氧、心功能不全、贫血、甲状腺功能亢进和心肌炎。故本题答案应选 E。

15. (A1 型题) 洋地黄与钙剂应避免同时应用，如有必要至少应间隔

- A. 2 小时
- B. 4 小时
- C. 7 小时
- D. 8 小时
- E. 10 小时

15. 答案：B

解析：强心苷类药物正性肌力作用的机制是通过抑制心肌细胞的 (Na^+) ， (K^+) -ATP 泵促进 Ca^{2+} 的内流和细胞内积累来实现，再额外补充钙剂会使得细胞内钙超载，导致心律失常；而且在高血钙的时候也容易发生强心苷类药物的不良反应，包括快速型心律失常、房室传导阻滞、窦性心动过缓等。洋地黄与钙剂应避免同时应用，如有必要至少应间隔 4 小时。故本题选 B。

16. (A1 型题) 下列哪种心律失常不需紧急处理

- A. 一度房室传导阻滞
- B. 室性早搏 R 落在 T 上
- C. 室性早搏呈联律出现
- D. 短阵室性心动过速
- E. 心室颤动

16. 答案：A

解析：第一度房室传导阻滞：每个冲动都能传导至心室，但 PR 间期超过 0.20s 临床表现第一度房室传导阻滞病人通常无症状，听诊第一心音强度减弱。第一度或第二度 I 型房室阻滞心室率不太慢者无需特殊治疗。故选 A。其他室性早搏 R 落在 T 上、室性早搏呈联律出现、心室颤动都是比较严重的心律失常需要紧急处理的。

17. (A1 型题) 心律失常基本的症状是

- A. 胸痛
- B. 呼吸困难
- C. 晕厥
- D. 心悸
- E. 低血压

17. 答案：D

解析：心律失常指心脏冲动的频率、节律、起源部位、传导速度与激动次序的异常。心悸是基本的症状。故选 D。心律失常可导致晕厥、出现低血压。但不是基本症状。

18. (A1 型题) 心电图表现为提前出现 QRS 波，宽大畸形，其前无 P 波，代偿间歇完全的心律失常为

- A. 室性逸搏
- B. 房性逸搏

- C. 房性期前收缩
- D. 室性期前收缩
- E. 房室交界期前收缩

18. 答案：D

解析：室性期前收缩（室早）心电图的特征：①提前发生的 QRS 波群，宽大畸形，时限通常大于 0.12s，ST 段与 T 波的方向与 QRS 主波方向相反。②室性期前收缩与其前面的窦性搏动之间期（称为配对期）恒定。③室性期前收缩后可见一完全性代偿间歇。④室性期前收缩的类型：室性期前收缩可孤立或规律出现。二联律指每个窦性搏动后跟随一个室性期前收缩；三联律指每两个窦性搏动后出现一个室性期前收缩，如此类推；连续发生两个室性期前收缩称为成对室性期前收缩；同一导联内室性期前收缩形态相同者为单形性室性期前收缩，形态不同者称多形性或多源性室性期前收缩

19. (A1 型题) 有可能危及生命的心律失常是

- A. 心房颤动
- B. 阵发性室上性心动过速
- C. 窦性心动过缓
- D. 阵发性室性心动过速
- E. 频发单源性室性早搏

19. 答案：D

解析：室性阵发性心动过速在发作时可严重影响心脏排血量，使心、脑、肾等重要脏器血供明显减少，造成血液动力学障碍而出现心绞痛、低血压、晕厥甚至猝死。由于室性阵发性心动过速容易发展成为心室颤动，因此，必须紧急处理，药物首选利多卡因。

20. (A1 型题) 下列哪种心律失常应视为危急情况

- A. 心房颤动
- B. 窦性心动过速
- C. 室性早搏，“R”落在“T”上
- D. 室性早搏，2~4 次/分
- E. 窦性心律不齐

20. 答案：C

解析：本题中 C 选项提示病人发生了室性阵发性心动过速，室性阵发性心动过速容易发展成为心室颤动，甚至猝死。相对于其它几个选项，室性阵发性心动过速最为危急，严重威胁病人生命，必须紧急处理。

21. (A2 型题) 消化性溃疡患者的疼痛节律改变或消失，常提示患者其可能的原因是

- A. 晨起
- B. 饮酒过度
- C. 夜晚
- D. 癌变
- E. 过度劳累

21. 答案：D

解析：ABCE 均加重疼痛，如果疼痛失去了上述规律性，变为不定时发作，或成为持续性隐痛，或疼痛性质与以往相比发生了明显的改变，则应警惕为癌变的先兆。故本题选 D。

22. (A1 型题) 关于消化性溃疡用药的叙述，不正确的是

- A. 氢氧化铝凝胶应在餐后 1 小时服用
- B. 服用西咪替丁应注意观察有无头晕、皮疹
- C. 硫糖铝片应在餐前 1 小时服用
- D. 奥美拉唑可引起头晕，用药时不可开车
- E. 甲硝唑应在餐前半小时服用

22. 答案: E

解析: 氢氧化铝凝胶等应在餐后 1 小时或睡前服用, A 正确; 西咪替丁不良反应引起头晕皮疹, B 正确; 硫糖铝在酸性环境下起作用, 应在餐前 1 小时给药, C 正确; 奥美拉唑可引起头晕, 特别是用药初期, 因此初次服用应减少活动, D 正确。甲硝唑饭后半小时服用, 故本题选 E。

23. (A1 型题) 服用胃黏膜保护剂硫糖铝后最常见的不良反应是

- A. 头晕
- B. 皮疹
- C. 乏力
- D. 便秘
- E. 口干

23. 答案: D

解析: 服用硫糖铝后, 抑制肠道运动增加水分吸收, 引起便秘, 故本题选 D。

24. (A2 型题) 执行慢性胃炎患者的医嘱时, 使用前应着重与医生进行沟通的药物是

- A. 消胆胺
- B. 山莨菪碱
- C. 雷尼替丁
- D. 强的松
- E. 多潘立酮

24. 答案: D

解析: 强的松片最主要的副作用是降低免疫力, 其次是对胃肠道有刺激, 容易造成上消化道出血、大剂量易引起糖尿病。故本题选 D。

25. (A1 型题) 下列不是外科治疗胃十二指肠溃疡的适应证的是

- A. 并发急性穿孔
- B. 并发急性大出血
- C. 胃溃疡恶变
- D. 慢性萎缩性胃炎
- E. 并发瘢痕性幽门梗阻

25. 答案: D

解析: 外科治疗胃十二指肠溃疡的适应证: ①胃溃疡经过短期(4~6 周)内科治疗无效或愈合后复发者, 应在第二次复发前手术; ②年龄已超过 45 岁的胃溃疡患者; ③经 X 线或胃镜证实为较大溃疡(直径 2.5cm 以上)或高位溃疡; ④不能排除或已证实有恶变者。⑤以往有一次急性穿孔或大出血病史者。所以选项 D 是错误的。

26. (A1 型题) 消化性溃疡病在何种条件下疼痛节律会改变或消失

- A. 疲劳时
- B. 饮酒时

- C. 受凉时
- D. 焦虑时
- E. 癌变时

26. 答案：E

解析：消化性溃疡在癌变时疼痛节律会改变或消失，疼痛常因精神刺激、过度疲劳、饮食不慎、饮酒、药物影响、气候变化等因素诱发或加重；因休息、进食、服制酸药、以手按压疼痛部位、呕吐等方法而减轻或缓解。而溃疡疼痛节律性改变或消失可能是癌变的征兆，故选 E。

27. (A2 型题) 胃溃疡合并幽门梗阻患者的术前准备，下列哪项可减轻胃黏膜水肿

- A. 术前数日每晚用温等渗盐水洗胃
- B. 纠正脱水
- C. 纠正碱中毒
- D. 术前给予流质饮食
- E. 术前晚灌肠

27. 答案：A

解析：合并幽门梗阻病人的护理：非完全性梗阻者可进无渣半流质，输液、输血，纠正营养不良及低氯、低钾性碱中毒。持续性胃肠减压和温生理盐水洗胃有助于减轻胃组织水肿，利于术后愈合。故本题 A 是正确的。

28. (A2 型题) 消化性溃疡患者，原有疼痛节律消失，变为持续上腹痛，伴频繁呕吐，呕吐物含发酵性宿食。此时最可能的并发症是

- A. 幽门梗阻
- B. 急性胰腺炎
- C. 穿孔
- D. 胃癌
- E. 上消化道出血

28. 答案：A

解析：幽门梗阻使胃排空延迟，病人可感上腹饱胀不适，疼痛于餐后力重，且有反复大量呕吐，呕吐物为酸腐味的宿食，大量呕吐后疼痛可暂缓解。故正确答案为 A。

29. (A2 型题) 患者，男，24 岁，饮酒后中上腹部闷痛不适，排柏油样大便 1 次。为进一步明确病情，宜选择哪项检查

- A. 血常规检查
- B. 大便常规和隐血试验
- C. 钡餐 X 线检查
- D. 急诊胃镜检查
- E. 插胃管，取胃液检查

29. 答案：D

解析：患者上腹不适，且排柏油样便，提示有上消化道出血。而胃镜检查是上消化道出血定位、定性诊断的首选检查方法。故本题选 D。

30. (A2 型题) 患者男，45 岁。十二指肠球部溃疡并发幽门梗阻。医嘱中出现下列哪种药物时，护士应提出质疑

- A. 氢氧化铝凝胶
- B. 口服补液盐

- C. 奥美拉唑
- D. 枸橼酸铋钾
- E. 克拉霉素

30. 答案：B

解析：氢氧化铝是碱性药物，可中和胃酸，A 正确；奥美拉唑是质子泵抑制剂，C 正确；枸橼酸铋剂可保护黏膜，D 正确，克拉霉素是抗生素，E 正确；口服补液盐是世界卫生组织推荐的治疗急性腹泻脱水的药物，而幽门梗阻者应禁食，输血、输液、胃肠减压。故本题选 B。