




金英杰医学®  
JINYINGJIE.COM

护士职业资格

# 学霸养成 记 第26天



30天铸就学霸养成

Students with excellent grades

工欲善其事

必先利其器

1V1咨询  
课程了解

考前咨询  
专业知识



1. (A1 型题) 原发性甲亢术前准备的重点是
- A. 降低基础代谢率
  - B. 减慢心率
  - C. 降低血压
  - D. 使甲状腺变小
  - E. 减少血供

1. 答案: A

解析: 降低基础代谢率预防出现甲状腺危象, 甲亢术后甲状腺危象是甲亢术后严重的并发症, 表现为术后 12~36 小时内高热、脉快而弱、大汗、烦躁不安、谵妄甚至昏迷, 常伴呕吐、水泻。处理不及时或不当常很快死亡。故选 A。

2. (A1 型题) 甲状腺功能亢进最可靠、灵敏的检查是
- A. FT<sub>4</sub> 与 FT<sub>3</sub>
  - B. TSH
  - C. TT<sub>4</sub>
  - D. TRH
  - E. 甲状腺<sup>131</sup>I 摄取率

2. 答案: B

解析: TSH 不受 TBG 浓度的影响, 也较少受能够影响 T<sub>3</sub>, T<sub>4</sub> 的非甲状腺疾病的干扰。在甲状腺功能改变时 TSH 的变化较 T<sub>3</sub>, T<sub>4</sub> 更迅速而显著, 所以血中 TSH 是反映下丘脑-垂体-甲状腺轴功能的敏感试验, 尤其是对甲亢的诊断有重要意义。故选 B。

3. (A1 型题) 某甲状腺功能亢进病人, T 39.5℃, P 150 次/分, 伴恶心、呕吐、大汗淋漓、嗜睡等。初步判断为
- A. 抗甲状腺药物中毒
  - B. 甲状腺功能低下
  - C. 甲状腺危象
  - D. 恶性突眼
  - E. <sup>131</sup>I 治疗反应

3. 答案: C

解析: 甲亢危象, 是甲状腺毒症急性加重的一个综合征, 发生原因可能与循环内甲状腺激素水平增高有关。多发生于较重甲亢未予治疗或治疗不充分的患者。常见诱因有感染、手术、创伤、精神刺激等。临床表现有: 高热、大汗、心动过速(140 次/分以上)、烦躁、焦虑不安、谵妄、恶心、呕吐、腹泻, 严重患者可有心衰, 休克及昏迷等。故选 C。

4. (A1 型题) 不符合甲状腺功能减退症的临床表现是
- A. 记忆力减退, 反应迟钝
  - B. 窦性心动过缓
  - C. 女性月经过多
  - D. 寒冷时有暂时性肌强直、痉挛
  - E. 排便次数增加

4. 答案: E

解析: 甲状腺功能减退症消化系统表现为食欲减退, 体重增加, 便秘。

5. (A1 型题) 甲状腺功能下降会出现
- A. 黏液性水肿

- B. 心率增快
- C. 出汗多
- D. 容易激动
- E. 心力衰竭

5. 答案：A

解析：B、C、D 均为甲亢的临床表现。最早的症状表现为出汗减少，畏冷，动作迟缓，易疲劳，智力减退，食少纳差，大便秘结，体重增加、黏液性水肿等才是甲状腺功能下降的临床表现。故选 A。

6. (A1 型题) 上述方法治疗最常见的并发症是

- A. 甲状腺癌
- B. 白血病
- C. 甲状腺功能减退症
- D. 甲亢危象
- E. 白细胞减少症

6. 答案：C

解析：碘 ( $^{131}\text{I}$ ) 治疗甲状腺功能亢进症后大多数病人无不良反应，少数在一周内乏力、食欲减退、恶心等轻微反应，一般在数天内即可消失，个别病人甚至发生甲状腺危象。最重要的并发症是永久性甲状腺功能低下症，也是最常见的并发症。故 3 题答案为 C。

7. (A1 型题) 下列对于皮质醇增多症的特征性表现描述正确的是

- A. 多血脂面容
- B. 生长发育障碍
- C. 免疫力下降
- D. 向心性肥胖
- E. 皮肤黏膜色素沉着

7. 答案：D

解析：皮质醇增多症由于脂肪代谢障碍，体内脂肪分解与合成均受到促进，使脂肪转移重新分布，形成典型的“向心性肥胖”。

8. (A1 型题) Cushing 病的首选治疗方法是

- A. 双侧肾上腺切除术
- B. 服用皮质醇合成抑制药
- C. 口服双氯苯三氯乙烷
- D. 垂体放疗、化疗联合治疗
- E. 切除垂体腺瘤

8. 答案：E

解析：Cushing 病的治疗原则是病因治疗，主要原则是以手术为主，辅以放疗和药物治疗。经蝶窦切除垂体腺瘤是近年治疗 Cushing 病的首选方法。

9. (A1 型题) 库欣综合征是

- A. 腺垂体分泌增强
- B. 促肾上腺皮质激素分泌增多
- C. 甲状腺激素分泌增多
- D. 甲状腺功能低下
- E. 肾上腺髓质分泌增强

9. 答案：B

解析：库欣综合征是由于肾上腺皮质分泌过量糖皮质激素（主要是皮质醇），导致人体代谢明显紊乱，从而出现一系列相应的临床表现。故选 B。

10. (A1 型题) 肾上腺皮质肿瘤引起的库欣综合征与库欣病鉴别，最有意义的试验检查是

- A. 血皮质醇昼夜节律
- B. 24 小时尿 17-羟类固醇
- C. 过夜地塞米松抑制试验
- D. 小剂量地塞米松抑制试验
- E. 大剂量地塞米松抑制试验

10. 答案：E

解析：大剂量地塞米松试验皮质醇抑制超过 50%，提示为垂体性皮质醇增多症，而肾上腺皮质肿瘤或异位 ACTH 综合征不被抑制。故选 E。

11. (A1 型题) 关于胰腺癌的病理，错误的是

- A. 以导管细胞腺癌最多见
- B. 好发部位为胰头颈部
- C. 最多见淋巴转移和浸润
- D. 最早血行转移
- E. 可广泛转移至周围组织

11. 答案：D

解析：胰腺癌的组织类型以导管细胞癌最多见，约占 90%，故 A 正确。胰腺癌一般以胰头部最为多见，占 70%~80%；故 B 正确；最多见淋巴转移和局部浸润，故 C、E 正确，血行转移较晚出现，故 D 错误。

12. (A1 型题) 肝癌非手术治疗首选

- A. 肝动脉插管化疗
- B. 全身化学药物治疗
- C. 放射线治疗
- D. 免疫治疗
- E. 中医药治疗

12. 答案：A

解析：原则上肝癌不作全身化疗，肝动脉栓塞化疗为不能手术切除肝癌者的首选治疗方法；经肝动脉插管化疗，同时作肝动脉结扎，可提高疗效，故选 A。

13. (A1 型题) 下列因素中，可能成为原发性肝癌促进因素的是

- A. 油腻饮食
- B. 乙型肝炎病毒
- C. 亚硝胺类化学物质
- D. 酒精肝
- E. 吸烟

13. 答案：B

解析：目前认为乙肝与肝癌发生密切相关。故答案选 B。

14. (A1 型题) 对原发性肝癌确诊率高而又简便的检查是

- A. 甲胎蛋白测定
- B. 乙肝五项
- C. CT 检查
- D. 肝功能

E. 磁共振

14. 答案：A

解析：AFP(甲胎蛋白)测定是目前诊断原发性肝癌最常用、最重要的方法，故答案选 A。

15. (A1 型题) 原发性肝癌主要的转移途径为

- A. 门静脉系统
- B. 肝外血行转移
- C. 淋巴转移
- D. 直接浸润转移
- E. 腹腔种植性转移

15. 答案：A

解析：原发性肝癌的主要转移为肝内转移即门脉系统。故答案选 A。

16. (A1 型题) 在我国诱发原发性肝癌最主要的疾病是

- A. 肝脓肿
- B. 甲型肝炎
- C. 乙型肝炎
- D. 中毒性肝炎
- E. 肝棘球蚴病

16. 答案：C

解析：乙肝是诱发肝癌的最主要疾病。故答案选 C。

17. (A1 型题) 为明确肝内占位病变的性质，下列检查项目最有意义的是

- A. 谷丙转氨酶
- B. 谷草转氨酶
- C. 甲胎蛋白
- D. 癌胚抗原
- E. 乳酸脱氢酶

17. 答案：C

解析：甲胎蛋白测定可用于普查，有助于发现无症状的早期病人，故答案选 C。

18. (A1 型题) 早期胰腺癌首选的治疗方法是

- A. 胰头十二指肠切除术
- B. 化疗
- C. 放疗
- D. 栓塞治疗
- E. 中西医结合治疗

18. 答案：A

解析：早期胰腺癌，争取手术切除是最有效的方法，常用的根治性手术术式为胰头十二指肠切除术，故选 A。对不能手术切除或不能耐受手术的病人，可选用化疗、放疗、中西医结合治疗等辅助治疗手段，故不选 B、C、D、E。

19. (A1 型题) 胰腺癌最常见的组织类型

- A. 腺泡细胞癌
- B. 多形性腺癌
- C. 纤毛细胞癌
- D. 导管细胞癌
- E. 胰岛细胞癌

19. 答案：D

解析：胰腺癌是恶性程度很高的消化系统肿瘤，组织类型以导管细胞癌最多见，约占 90%。主要由分化不同程度的导管样结构的腺体构成，伴有丰富的纤维间质。故本题选 D。解析：

20. (A1 型题) 胰腺癌的好发部位是

- A. 全胰腺
- B. 胰腺头颈部
- C. 胰腺尾部
- D. 胰腺体尾部
- E. 胰腺颈体部

20. 答案：B

解析：胰腺癌一般以胰头部最为多见，占 70%~80%；故 B 正确；而其次是体尾部，约占 20%；全胰癌较少见，应属于弥漫性或多中心病变；故其余选项均不正确。

21. (A1 型题) 近年来研究发现与胰腺癌发生有密切关系的是

- A. 胆囊炎
- B. 胰腺炎
- C. 肝炎
- D. 酗酒
- E. 吸烟

21. 答案：E

解析：胰腺癌发生与吸烟、饮酒、高脂肪和高蛋白饮食、过量饮用咖啡、环境污染及遗传因素有关，其中已定的首要因素为吸烟。动物试验已证明用烟草酸水饲喂动物可以引起胰腺癌，一部分人中吸烟可诱发胰腺癌发生。其他高危因素还有胆石病，糖尿病以及慢性胰腺炎等。进食精制的面粉食品，胃切除术后 20 年者，也是发生胰腺癌的危险因素。故 E 正确。

22. (A1 型题) 下列贫血中最主要存在网织红细胞减少的是

- A. 缺铁性贫血
- B. 溶血性贫血
- C. 失血性贫血
- D. 地中海贫血
- E. 再生障碍性贫血

22. 答案：E

解析：溶血性贫血网织红细胞明显增加，缺铁性贫血网织红细胞正常或轻度增高，其它几项网织红细胞变化不明显。。

23. (A1 型题) 再生障碍性贫血属于

- A. 小细胞低色素性贫血
- B. 大细胞性贫血
- C. 正常细胞性贫血
- D. 小细胞高色素性贫血
- E. 巨幼细胞性贫血

23. 答案：C

解析：再障患者主要表现为全血细胞的减少，细胞的形态变化不大，因此答案选 C。

24. (A1 型题) 急性再生障碍性贫血病人一般不出现

- A. 进行性贫血
- B. 感染
- C. 出血
- D. 全血细胞减少
- E. 肝、脾淋巴结肿大

24. 答案: E

解析: 再障性贫血是由于多种病因引起的骨髓造血衰竭, 导致红骨髓总容量减少, 代之以脂肪髓, 临床呈全血细胞减少的一组综合症。贫血、出血、反复感染是其三大主要表现, 脾脏和淋巴结一般不肿大。选项 E 是错误的。

25. (A1 型题) 再生障碍性贫血病人口腔护理注意事项是

- A. 取义齿
- B. 加紧棉球
- C. 动作轻柔
- D. 禁止漱口
- E. 患处涂冰硼散

25. 答案: C

解析: 坚持饭后、睡前漱口, 防止口咽部溃疡, 常用漱口液有生理盐水、复方硼酸溶液、1%双氧水、碳酸氢钠溶液等。所以排除选项 D、E, 而 A、B 不是此题最重要的护理。只有选项 C 正确。

26. (A1 型题) 慢性再生障碍性贫血的特点是

- A. 贫血重、出血轻
- B. 贫血与出血一致
- C. 贫血轻、出血重
- D. 有贫血但无出血
- E. 无贫血但有皮下出血

26. 答案: A

解析: 慢性再生障碍性贫血的特点是起病及进展比较缓慢, 贫血往往是首发及主要表现。常常表现倦怠无力, 劳累后气促、心悸、头昏。出血较轻, 以皮肤、黏膜为主。所以选项 A 是正确的。

27. (A1 型题) 某再生障碍性贫血病人, 贫血程度较重, 给予丙酸睾酮治疗。该药的正确使用方法是

- A. 浅部肌内注射
- B. 用药 1 个月见效即可停药
- C. 该药不良反应较少, 用量可以适当加大
- D. 长期用药不会损害肝脏的功能
- E. 需经常更换注射部位, 防止注射处发生肿块

27. 答案: E

解析: 丙酸睾酮是雄激素类药。注射的不良反应大剂量可致女性男性化, 男性睾丸萎缩, 精子减少。浮肿、黄疸、肝功能异常。所以排除 B、C、D。丙酸睾酮为油剂, 需深层肌注。故排除 A。由于吸收慢, 易产生肿块, 要注意注射部位的轮换, 要经常检查注射部位, 发现硬块要及时理疗。所以 E 为正确选项。

28. (A1 型题) 某病人血红蛋白量 40g/L, 白细胞计数  $2.5 \times 10^9$  次方/L, 血小板计数  $20 \times 10^9$  次方/L。该病人最可能的疾病是

- A. 缺铁性贫血
- B. 溶血性贫血
- C. 再生障碍性贫血
- D. 慢性失血性贫血
- E. 急性白血病

28. 答案：C

解析：缺铁性贫血白细胞及血小板多正常，少数病人可出现轻度白细胞、血小板减少。故排除A；失血所致贫血者，血小板计数可增高。故排除D。急性白血病白细胞计数多在 $(10\sim 50)\times 10^9/L$ 。故排除E。根据题干病人最可能的疾病是再生障碍性贫血，故选C。

29. (A1型题) 关于血友病，下列说法错误的是

- A. 血友病甲型缺乏凝血因子VIII
- B. 血友病乙型缺乏凝血因子IX
- C. 甲、乙两型血友病均是伴隐性遗传性疾病
- D. 女性发病，男性传递致病基因
- E. 反复关节腔出血后可留有后遗症

29. 答案：D

解析：其遗传基因位于X染色体上，

30. (A1型题) 关于血友病病人的治疗和护理，下列错误的是

- A. 出现深部组织血肿和关节腔出血时，应避免活动，早期可加压冷敷或压迫止血，并固定患肢
- B. 可以输新鲜血、血浆、抗血友病浓缩剂，补充缺乏的凝血因子
- C. 颈部或喉部软组织出血时，应注意呼吸道是否通畅
- D. 平时活动要适量，行走、慢跑、持重物时间不宜过长
- E. 头痛、发热时可以服用阿司匹林

30. 答案：E

解析：平时在无出血的情况下，作适当的运动，避免剧烈运动，对减少该病复发有利。但有活动性出血时要限制活动，以免加重出血。可以输新鲜血、血浆等补充缺乏的凝血因子。血友病因缺乏凝血因子，故要避免使用对血液凝集有影响，加重出血的药品如阿司匹林等；平时要注意关节、肌肉的科学锻炼适量，行走、慢跑、持重物时间不宜过长。故答案为E。