

# 结核病（中级）

〔专业代码:311〕

- 
- 1、男性患者，28岁。近2年反复发作左下肢，红、肿、痛、热，用抗生素可缓解。查体：二尖瓣区可闻及舒张期隆隆样杂音，左下肢肿胀，压之无痕，局部皮肤发红、皮温高，右下肢无异常。其肿胀的原因是慢性淋巴管炎所致水肿
  - 2、皮肤黏膜出现发绀时，毛细血管血液还原血红蛋白至少超过50g /
  - 3、患者，女，36岁，怕冷，月经期延长，量多，腹胀，全身肿胀，以胫前为甚，较硬。甲状腺B超显示Ⅱ度肿大、肝脏肿大及脂肪肝。其皮肤肿胀的原因可能是黏液性水肿
  - 4、男性患者，50岁，高血压病多年，近日活动后出现呼吸困难伴左胸痛，咳嗽频繁，咳出为粉红色泡沫样血痰，可能的疾病为急性左心衰
  - 5、中年男子，反复上腹隐痛半年，多在空腹出现，有时夜间出现腹痛，进食后缓解，最可能的诊断是十二指肠溃疡
  - 6、女性患者，28岁，晨起呕吐应考虑是早孕
  - 7、血清碱性磷酸酶明显升高，可见于阻塞性黄疸
  - 8、体温39℃以上，一昼夜温差大于2℃，但最低点仍高于正常水平的体温曲线类型属于弛张热
  - 9、男性患者，24岁。主因双下肢紫癜、淤斑入院。实验室检查，束臂试验(+)，出血时间12min，血块退缩不良，凝血时间5min，患者存在血小板质和量异常
  - 10、肝肿大伴扩张性搏动见于三尖瓣关闭不全
  - 11、男性患者，18岁。进食不洁饮食后出现发热、腹泻2天。伴有黏液及脓血的糊状便。诊断首先考虑是细菌性痢疾
  - 12、老年男性，在与人争吵后突然倒地不醒，最可能的病因是脑血管意外
  - 13、呕吐伴腹泻最常见于急性胃肠炎
  - 14、男性患者，58岁，休息时突然出现右侧肢体无力，继而出现呼之不应。查体：深昏迷，

---

压眶无反应，左侧瞳孔大于右侧瞳孔，血压 24 / 12kPa。治疗首先考虑是**降颅压**

15 偏头痛最常见的类型是**普通型偏头痛**

16 正常情况下，肾小管将吸收肾小球滤过液总量的 **99%**

17、男性患者，45 岁，患主动脉瓣关闭不全。在主动脉瓣听诊区及主动脉瓣第 2 听诊区可闻及叹气样舒张期杂音，该杂音处在**前倾坐位**体位时更易听到

18、男性患者，24 岁，低热、盗汗、乏力 6 个月，咳嗽痰中带血，诊断考虑是**肺结核**

19、男性患者，19 岁，昏迷入院，呼吸深大，呼气带有烂苹果味，神经系统检查无阳性定位体征，最重要的检查是**血糖和酮体**

20、女性患者，80 岁，急性结石性胆囊炎术后，因伤口疼痛肌注哌替啶 1 支，半小时后昏睡，呼吸 10 次 / 分，可能原因是**麻醉剂过量**

21、急性心肌梗死患者最常见的血细胞异常为**中性粒细胞增多**

22、平卧位时叩诊移动性浊音阳性，腹水量至少已达 **1000ml**

23、肝硬化腹腔积液患者的腹部外形是**蛙状腹**

24、潮式呼吸的特点为**由浅慢到深快，再由深快到浅慢**

25、咳嗽伴发热不常见于**自发性气胸**

26、柏油样便提示**上消化道出血**

27、大量咯血指的是每日咯血量在 **500ml 以上**

28、女性患者，60 岁，腹胀，食欲不振三个月。出现进行性黄疸一个月，体重减轻 3kg,查体皮肤黄染明显，肝脏肋下未触及，深吸气时可触到肿大胆囊底部，无触痛。化验检查血胆红素  $183\mu\text{mol} / \text{L}(17\text{mg} / \text{dl})$ ，尿检胆红素阳性。最可能的诊断是**胰头癌**

29、尿液呈棕红色或葡萄酒色，镜检无红细胞见于**卟啉尿**

30、肝硬化大量腹腔积液患者，检查肝脏时应采用**冲击触诊法**

- 
- 31、剧烈呕吐后继而呕血，应警惕是**食管贲门撕裂**
- 32、青年女性，参加工作 1 周，未进食早餐，紧张工作后突然晕倒，最可能的原因是**低血糖休克**
- 33、男性患者，21 岁，突发中上腹刀割样剧烈疼痛 30 分钟。为持续性，腹痛迅速波及全腹。查体：腹部呈板状腹，压痛、反跳痛阳性，肝浊音界消失。最可能诊断是**胃、十二指肠穿孔**
- 34、过敏性紫癜最常见的类型为**紫癜型**
- 35、阿米巴痢疾的大便性状为**暗红色果酱样脓血便**
- 36、发绀的决定性因素是**血液中还原血红蛋白的绝对量**
- 37、排便后有鲜红色血液滴下，常见出血部位是**肛管**
- 38、肾源性水肿的特点是**低蛋白血症**
- 39、呕吐宿食常见原因是**幽门梗阻**
- 40、女性患者，38 岁，皮肤巩膜黄染伴皮肤瘙痒 4 个月，加重 20 天，大便灰白色。查体 肝肋下 4cm，质硬，表面光滑，脾大平脐。实验室检查：血清抗线粒体抗体阳性，ALT40U / L。最可能的诊断是**肝外胆道梗阻性黄疸**
- 41、女性患者，25 岁，经常胸闷心悸，经检查诊断为二尖瓣脱垂，其体征应具有**收缩中晚期喀喇音**
- 42、意识障碍是指影响**大脑功能活动的疾病引起的意识改变**
- 43、男性患者，32 岁，入冬以来感中上腹部不适并阵发性隐痛，有空腹痛及夜间痛，近 2 日大便发黑，其诊断可能是**十二指肠球部溃疡出血**
- 44、男性患者，30 岁，因呕血 1 小时入院，查体：脉搏频数微弱、血压下降、呼吸急促，估计出血量达全身血量的**大于 30%**
- 45、咯血最常见的原因是**肺结核**

- 
- 46、检查淋巴结肿大时，应优先注意弄清楚**原发病灶**
- 47、估计血容量最好的指标是**中心静脉压**
- 48、女性患者，25岁，紧张易怒，疲乏无力，怕热多汗，饭量增加，体重下降，初步诊断甲亢，此患者一般不会出现的表现是**血常规白细胞总数增多**
- 49、女性患者，30岁，自幼咳嗽咳痰，近日痰量多，痰白黏稠牵拉成丝难以咳出，提示可能病因为**肺部真菌感染**
- 50、男性患者，32岁，有十二指肠球部溃疡病史8年，一天前出现柏油便。检查：贫血。其贫血的类型为**正细胞正色素性贫血**
- 51、男性患者，32岁，间断性上腹痛3年，时有反酸、嗝气，每于受凉后加重。近3天疼痛加重，今日患者突然呕咖啡样物500ml，同时感头晕、心悸，出汗。出血后腹痛缓解。患者出血的原因考虑为**消化性溃疡**
- 52、某糖尿病患者，女性，58岁，突发高热、寒战、左胸痛，咳嗽，咳多量黄脓性带血丝性痰液。X线显示右下肺叶实变，并多个液气囊腔。最可能的诊断是**葡萄球菌性肺炎**
- 53、偏头痛发作时，常用的药物是**咖啡因麦角胺**
- 54、右上腹剧痛、寒战高热、黄疸，被称为**Charcot三联征**
- 55、由于肠黏膜分泌增多引起的腹泻是**霍乱**
- 56、黏液性水肿患者，水肿主要表现为**眼面**
- 57、女性患者，56岁，肝硬化伴大量腹水，应首选的利尿剂为**螺内酯**
- 58、每分钟肾血流约占心排出量的**1/4**
- 59、男性患者，20岁，受凉后高热5天，咳嗽，咳铁锈色痰。检查：血白细胞数增高，胸片呈右上叶片状阴影，首选抗生素为**青霉素**
- 60、56岁女性，突发腹痛、发热，伴巩膜黄染，最可能的诊断是**急性胆囊炎**

- 
- 61、突发剧烈胸痛伴呼吸困难和发绀常见于**肺梗死**
  - 62、男性，65岁，查体时发现大便隐血阳性，提示消化道出血量至少大于**5ml**
  - 63、四肢对称性紫癜伴关节疼痛见于**血友病**
  - 64、脑膜炎时常见的呼吸变化是**潮式呼吸**
  - 65、左心功能不全呼吸困难产生的最主要因素是**肺淤血使气体弥散功能降低**
  - 66、一患者呼吸表现为有规律的呼吸几次后，突然停止一段时间，又开始呼吸，周而复始，这种呼吸节律称为**Blots呼吸**
  - 67、正常心尖搏动位于第5肋间锁骨中线内侧**0.5~1.0cm**
  - 68、可闻及心包摩擦音的疾病是**急性心肌梗死**
  - 69、一侧额纹和鼻唇沟变浅提示是**面神经病变**
  - 70、舒张早期奔马律与第三心音在产生机制及听诊上不同之处为**出现在心率 $>100$ 次/分**
  - 71、呼吸过缓见于**镇静剂过量**
  - 72、可在胸骨左缘第3~4肋间触及收缩期震颤的疾病是**室间隔缺损**
  - 73、急性呕吐伴上腹痛、发热、皮肤发黄，应考虑是**急性胆囊炎合并胆道梗阻**
  - 74、常作为计数胸椎的体表标志是**第七颈椎棘突**
  - 75、毕奥呼吸常见于**呼吸中枢功能障碍**
  - 76、发热疾病中，常见合并肝脾肿大的是**疟疾**
  - 77、第一心音增强见于**二尖瓣狭窄**
  - 78、外耳道中有血性或清亮液体流出，应考虑是**颅底骨折**
  - 79、瞳孔缩小见于**有机磷中毒**
  - 80、便血合并皮肤黄染、蜘蛛痣及肝掌，首先考虑**胃底食管静脉曲张破裂出血**
  - 81、发热伴皮肤黏膜出血、淋巴结肿大常见于**急性白血病**

---

82、肝硬化腹壁静脉曲张，静脉血流回流方向为**脐上腹壁静脉血流向上回流，脐下的静脉向下回流**

83、面具面容见于**震颤麻痹**

84、女性患者，24岁，入住新居后频繁咳嗽并气喘，查体肺部有哮鸣音，考虑病因为**支气管哮喘**

85、一个患者乙肝 HBsAg 阳性，抗-HBe 阳性，属于**乙肝小三阳**

86、男性患者，24岁，淋雨后发热，咳嗽，并咳铁锈色痰，可能的病因为**肺炎球菌性肺炎**

87、中年男性，心悸、胸闷就诊，查体心脏听诊出现"大炮音"，最可能的诊断是**完全性房室传导阻滞**

88、风湿性主动脉瓣狭窄最主要的特征是**主动脉瓣区收缩期喷射性杂音伴第二心音减弱或消失**

89、女性患者，30岁。体检时测量血压为 150 / 100mmHg，为确诊是否有高血压，进一步应做的检查是**非同日测定血压 2 次**

90、大叶性肺炎最常见的致病菌是**肺炎球菌**

91、服用阿司匹林后出现呕血，其原因是**急性胃黏膜病变**

92、右心衰竭引起呼吸困难的原因为**淤血性肝肿大等使运动受限而减少肺交换面积**

93、青年男性，发热 2 天，体温 37.8~39.1℃，腰部胀痛，尿频、尿急，解黄色稀便 1 次，无咳嗽咳痰，此患者最可能的诊断为**急性肾盂肾炎**

94、器质性二尖瓣狭窄的特点是**常有心房颤动**

95、夜间阵发性呼吸困难常见于**急性左心功能不全**

96、高血压的病理改变正确的是**高血压易导致脑卒中**

97、甲亢患者，FT3 增高，FT4、TT4 正常，应诊断为 **T3 型甲亢**

98、呕吐咖啡样液体最常见于**消化性溃疡**

- 
- 99、心悸伴食欲增加、消瘦、出汗最常见于**甲状腺功能亢进**
- 100、同情和开导病人属于**心理治疗的道德要求**
- 101、在临床诊疗活动中，医务人员收受药品、**医用设备、医用耗材**等生产、经营企业或经销人员以各种名义给予的财物或提成的，医德考评结果应记为**较差**
- 102、临床诊疗工作中最基本的原则是**患者第一的原则**
- 103、医师在执业活动中应履行的义务是**遵守法律、法规，遵守技术规范**
- 104、组织实施医师资格考试的部门是**省级以上人民政府卫生行政部门**
- 105、《医疗机构从业人员行为规范》公布执行的时间为**2012年6月26日**
- 106、遵守医学伦理道德,尊重患者的知情**同意权和隐私权**，为患者保守医疗秘密和健康**隐私**维护患者合法权益
- 107、治疗隐球菌肺炎首选抗生素为**氟康唑**
- 108、慢性阻塞性肺疾病(COPD)患者低氧血症鼻导管吸氧治疗时，吸入氧浓度的计算公式为：  
**吸入氧浓度(%)=21+4×氧流量(L/min)**
- 109、慢性肺源性心脏病降低肺动脉高压的首选治疗是**氧疗**
- 110、预防慢性阻塞性肺疾病(COPD)应首先强调**戒烟**
- 111、对 MRSA 引起的肺炎首选抗生素是**万古霉素**
- 112、慢性支气管炎诊断主要依据于**病史和体征**
- 113、女性患者，30岁。因重度哮喘急性发作住院治疗缓解，平时亦有哮鸣音存在。出院后最有效和推荐长期应用的抗炎剂是**吸入糖皮质激素**
- 114、哮喘维持控制**3个月**，治疗方案可以降级
- 115、哮喘患者急性发作的治疗目的是**缓解支气管平滑肌痉挛**
- 116、胸腔抽液每次不宜超过**1.0L以上**

- 
- 117、慢性阻塞性肺气肿的主要症状为**逐渐加重的呼吸困难**
- 118、支气管哮喘患者以**呼气性呼吸困难**为主
- 119、作为诊断支气管哮喘依据的是反复发作**呼气性呼吸困难伴弥漫性哮鸣音可自行缓解或治疗后缓解**
- 120、肥厚型心肌病心室间隔非对称性肥厚
- 121、高血压合并心肌梗死宜选用**美托洛尔**
- 122、广泛前壁心肌梗死心电图表现在 **V1~V6、I、aVL**
- 123、急性心肌梗死最易发生房室传导阻滞的部位是**下壁心肌梗死**
- 124、左心衰竭时肺部啰音的特点是湿啰音常见于**两肺底**，并随**体位变化而变化**
- 125、高血压病者服用降压药物治疗，降压目标是血压降至**正常范围**，即年轻者血压控制在**120~130/80mmHg**，老年人可降至 **140/90mmHg** 以内
- 126、硝酸异山梨酯的主要作用是扩张**冠状动脉及外周静脉**，降低**心脏前负荷**，减少**心肌氧耗**
- 127、慢性充血性心力衰竭的诱发因素中，最为常见的是**感染**
- 128、二尖瓣狭窄晚期最常见的并发症是**充血性右心衰竭**
- 129、急性心肌梗死时最常见的心律失常是**室性期前收缩及室性心动过速**
- 130、如果急性心肌梗死并发乳头肌断裂，出现的可能性最大的体征是心尖区出现**收缩中晚期喀喇音和响亮的收缩期杂音**
- 131、原发性高血压最常见的并发症是**脑卒中**
- 132、风心病主动脉瓣狭窄的主要体征是**胸骨右缘Ⅱ肋间收缩期吹风样杂音**
- 133、阵发性室上性心动过速患者的最佳治疗措施是**静注毛花苷 C**
- 134、P-R 间期逐渐延长，直到 P 波受阻，QRS 波群脱落诊断为**二度 I 型房室传导阻滞**
- 135、最常应用于治疗冠心病变异型心绞痛发作的是**钙通道阻滞剂**

- 
- 136、左心衰最早出现的症状为**劳累性呼吸困难**
- 137、在风湿性心脏病中，最常见的瓣膜病变是**二尖瓣狭窄合并关闭不全**
- 138、风湿性心瓣膜病时最常被侵犯的瓣膜是**二尖瓣**
- 139、降压作用缓慢，适用于轻中度高血压，降压同时使**心律减慢**的药物是**美托洛尔**
- 140、心律失常在风湿性二尖瓣狭窄中常见的是**心房颤动**
- 141、原发性高血压心脏并发症中首先出现的是**心肌肥厚**
- 142、扩张型心肌病的临床特征是**心室收缩不全**所致的泵功能障碍
- 143、诊断消化性溃疡急性穿孔最有价值的临床表现是**肝浊音区消失**
- 144、肝癌引起的肝区疼痛的特点是**持续性钝痛或胀痛**
- 145、确诊慢性胃炎最可靠的检查方法是**活组织检查**
- 146、急性胰腺炎发病早期最敏感的指标是**血淀粉酶**
- 147、女性患者，50岁。胃病病史10年，半年来消瘦明显，最合适的检查方法是**胃镜**
- 148、消化性溃疡形成的最重要病因是**幽门螺杆菌感染**
- 149、残胃癌发生在胃良性病变施行胃大部切除术后至少**5年**
- 150、胃溃疡常见的部位为**胃角和胃窦小弯侧**