

神经内科学（中级）

〔专业代码:308〕

1、患者，女性，23岁，发作性头痛5年，每次头痛发作前出现眼前异彩，持续约20分钟，继之出现从一侧扩展到另一侧的头部跳痛。头痛睡眠后缓解，头颅CT正常，此时治疗首选药物是**麦角胺咖啡因**

2、服盐类泻药引起腹泻的原因是**肠腔内渗透压增高**

3、尿液呈棕红色或葡萄酒色，镜检无红细胞见于**卟啉尿**

4、患者，男性，30岁，因呕血1小时入院，查体：脉搏频数微弱、血压下降、呼吸急促，估计出血量达全身血量的**大于30%**

5、患者，男性，20岁，受凉后高热5天，咳嗽，咳铁锈色痰。检查：血白细胞数增高，胸片呈右上叶片状阴影，首选抗生素为**青霉素**

6、左心功能不全呼吸困难产生的最主要因素是**肺淤血使气体弥散功能降低**

7、正常成人的尿比重为**1.015~1.025**

8、心力衰竭导致的发绀属于**混合性发绀**

9、患者，女性，30岁，头晕、乏力、发热皮肤出血点半月。查体：全身淋巴结不大，胸骨无压痛，心肺无异常，肝肋下3cm，脾肋下5cm。血常规：血红蛋白68g/L，白细胞 $2 \times 10^9 / L$ ，血小板 $20 \times 10^9 / L$ 。诊断考虑**血小板减少性紫癜**

10、体温在 39°C 以上，波动幅度大，24小时内体温波动范围超过 2°C ，但都在正常水平以上，称为**弛张热**

11、患者，男，50岁，高血压病多年，近日活动后出现呼吸困难伴左胸痛，咳嗽频繁，咳出为粉红色泡沫样血痰，可能的疾病为**急性左心衰**

12、男性患者，32岁，间断性上腹痛3年，时有反酸、嗝气，每于受凉后加重。近3天疼痛加重，今日患者突然呕咖啡样物500ml，同时感头晕、心悸，出汗。出血后腹痛缓解。患者出血的原因考虑为**消化性溃疡**

- 13、正常人每 24 小时进入小肠的液体量约为 9L
- 14、MI C 分型中 M 是指细胞形态学
- 15、上消化道出血最常见于消化性溃疡
- 16、潮式呼吸的特点是由浅慢到深快，再由深快到浅慢
- 17、患者，男性，36 岁，间断性上腹痛 6 年，有空腹、夜间痛，进食后缓解，应考虑消化性溃疡
- 18、患者，女，25 岁，经常胸闷心悸，经检查诊断为二尖瓣脱垂，其体征应具有收缩中晚期喀喇音
- 19、患者，男性，48 岁，肝硬化腹水，近 3 天出现低热伴腹痛，腹水量较前明显增加。腹水常规检查 李凡他实验(+)，细胞总数 $650 \times 10^6 / L$ ，白细胞 $500 \times 10^6 / L$ ，中性粒细胞 90%，最可能的诊断是自发性腹膜炎
- 20、患者，女，26 岁，体检时发现舒张期杂音，伴第一心音亢进，在第二心音后有开瓣音，此种体征见于二尖瓣狭窄
- 21、估计血容量最好的指标是中心静脉压
- 22、旁路胆红素约占体内总胆红素来源的 15% ~ 20%
- 23、急性肝炎属于反射性呕吐
- 24、消化性溃疡常伴有反酸、暖气症状
- 25、排便后有鲜红色血液滴下，常见出血部位是肛管
- 26、检测 HP 感染属侵入法的是 HP 培养
- 27、肥厚型梗阻型心脏病，可使杂音减轻的是 β 受体阻滞剂
- 28、正常淋巴结大小为 0.2 ~ 0.5cm
- 29、肝硬化大量腹腔积液患者，检查肝脏时应采用冲击触诊法

- 30 体温急剧上升至 39°C 或以上，持续数天后又骤然下降至正常水平，高热期与无热期各持续若干天后规律性交替一次，热型是**回归热**
- 31、放射性 ^{131}I 用于**高功能结节性甲亢**
- 32、患者，男，28岁，间断性上腹痛1年，以饥饿时和夜间为主，近1周腹痛加剧，伴黑粪，最可能的诊断是**十二指肠球部溃疡并出血**
- 33 深反射见于**下颌反射**
- 34、水肿伴大量蛋白尿常见于**肾源性水肿**
- 35、**淋巴结结核**可引起全身淋巴结肿大
- 36、PPD 阴性见于**急性血型播散型肺结核**
- 37、突发剧烈胸痛伴呼吸困难和发绀常见于**肺梗死**
- 38、患者，男，40岁，10余年咳嗽、咳脓痰史，1小时前突然大咯血，考虑病因可能为**支气管扩张症**
- 39 血清胆红素正常值为 $< 17\mu\text{mol} / \text{L}$ ，即 $1.0\text{mg} / \text{d}$
- 40、男性患者，饮酒后剧烈呕吐，先吐出胃内容物，后呕鲜血 100ml，无腹痛及发热，既往体健。查体：轻度贫血貌，余无异常。诊断考虑**贲门黏膜撕裂症**
- 41、结肠疾病的腹泻特点是**便后疼痛可缓解**
- 42、年轻人禁水 12 小时后，尿比重 1.025
- 43、溃疡性结肠炎患者**腹痛时排便或脓血便，便后腹痛减轻**
- 44、患者，男性，32岁，入冬以来感中上腹部不适并阵发性隐痛，有空腹痛及夜间痛，近2日大便发黑，其诊断可能是**十二指肠球部溃疡出血**
- 45、患者，女，45岁，出现发热、尿频、尿急、尿痛症状，最可能的诊断为**急性膀胱炎**
- 46、体温调节中枢功能失常导致的发热，常见于**中暑**

47、由于肠黏膜分泌增多引起的腹泻是霍乱

48、患者，女性，24岁，1天前突起畏寒、发热，体温40℃，伴咳嗽、右侧胸痛，咳铁锈色痰。来院前自服APC1片。血压86/54mmHg(11.5/7.2kPa)，脉搏110/min。右上胸语颤增强，可闻及支气管肺泡呼吸音，血WBC 26×10^9 /L，中性粒细胞90%。X线胸片示右上肺大片致密影，呈均匀大叶分布。最可能的诊断是肺炎球菌肺炎伴循环衰竭

49、患者，女，58岁，夜间从噩梦中醒来，感胸骨后压榨性闷痛，伴呼吸困难，胸痛及呼吸困难持续不能缓解，患者出现面色苍白，冷汗淋漓，血压明显下降，皮肤发绀，此发绀属于缺血性发绀

50、患者，男，40岁，黄疸，肝脾肿大半年，进食时突然呕吐暗红色液体300ml，其病因可能为食管静脉曲张破裂

51、胃酸分泌增多引起的腹泻是胃泌素瘤

52、解洗肉水样大便，有特殊臭味，多见于急性出血坏死性肠炎

53、患者，女，20岁，发作性左半侧头痛2年，每次劳累后易发作头痛，并可伴有呕吐，休息后2~3小时缓解，每年发作3、4次，无头痛发作时一切正常，查体无异常。其母亲也有头痛病史，诊断考虑偏头痛

54、临床表现为突然无尿或间断无尿的肾功能不全患者，首先应考虑肾后梗阻性疾病

55、尿频的定义是排尿次数增多而每次尿量减少

56、排便带血，鲜红色，不与粪便混合，粘附于粪便表面，常见于直肠息肉

57、结核复发用INH

58、确定深昏迷最有价值的体征是全身深浅反射消失

59、肝肿大伴扩张性搏动见于三尖瓣关闭不全

60、中年男性，持续或间断痰中带血，首先需考虑的是肺癌

- 61、蜘蛛痣大多出现于上腔静脉回流区
- 62、呼吸深快见于过度紧张
- 63、患者，青年女性，突然呼吸困难。查体端坐呼吸，频出冷汗，胸廓饱满，呼吸运动减弱，叩诊过清音，两肺呼吸和吸气双相干鸣音，最可能的诊断为支气管哮喘
- 64、肝硬化腹壁静脉曲张，静脉血流回流方向为脐上腹壁静脉血流向上回流，脐下的静脉向下回流
- 65、肺癌最可能出现的表浅淋巴结肿大的是右锁骨上淋巴结
- 66、颈静脉怒张提示右心房压力升高
- 67、提示左心室衰竭的是交替脉
- 68、可闻及心包摩擦音的疾病是急性心肌梗死
- 69、正常心尖搏动位于第5肋间锁骨中线内侧0.5~1.0cm
- 70、Kernig征检查属于脑膜刺激征
- 71、瞳孔缩小见于有机磷中毒
- 72、对肝癌的诊断最有临床价值的检查是肝进行性肿大，表面不平
- 73、叩诊可发现阳性体征的胸腔积液量为300ml以上
- 74、高热的体温范围为39.1~41℃
- 75、舒张早期奔马律与第三心音在产生机制及听诊上不同之处为出现在心率 > 100 次/分
- 76、局限性淋巴结肿大见于Virchow淋巴结
- 77、肝呈弥漫性肿大、质软，常见疾病是肝淤血
- 78、患者，青年男性，幼年开始咳嗽，每因上呼吸道感染后出现呼气性呼吸困难，听诊两肺闻及呼气性干鸣音，诊断可能为支气管哮喘
- 79、外耳道中有血性或清亮液体流出，应考虑颅底骨折

- 80、乳头血性分泌物最常见于**乳腺导管内良性乳突状瘤**
- 81、正常成人胸廓前后径与左右径之比为**1: 1.5**
- 82、一心房颤动患者，突觉呼吸困难咳嗽、胸痛，心脏听诊闻及三尖瓣区舒张期奔马律其来源为**右心室奔马律**
- 83、患者，女，46岁，睡眠差，呼吸困难，常在正常呼吸中出现一次深大呼吸，其呼吸类型为**叹气样呼吸**
- 84、肝浊音界消失可见于**胃肠穿孔**
- 85、患者，女，21岁，间断咳嗽咳痰3个月，偶有午后低热，咳少量黄色黏痰，偶有痰中带血，查体右肺闻及吸气性干鸣音。提示最可能的病因是肺结核合并支气管内膜结核
- 86、患者，男性，62岁，体检发现血压148 / 86mmHg，既往无高血压病史，最适宜的医嘱是**隔日再次测定血压**
- 87、一患者出现尿频、尿急、尿痛，同时伴有腰痛、高热畏寒，考虑**急性肾盂肾炎**的可能性大
- 88、急性心肌梗死的发病机制中，多数由于**不稳定粥样斑块溃破出血和管腔内血栓形成**
- 89、高血压的病理改变是**高血压易导致脑卒中**
- 90、类风湿关节炎的发病机制与**具有遗传易感性**有关
- 91、左心功能不全时出现呼吸困难的原因主要是**肺淤血**
- 92、进食油腻食物后右上腹剧痛，辗转不安常见于**胆石症**
- 93、中年男性，心悸、胸闷就诊，查体心脏听诊出现"大炮音"，最可能的诊断是**完全性房室传导阻滞**
- 94、患者，女性，68岁，糖尿病3年，头昏乏力2个月，视力下降，眼科检查发现眼底动脉硬化，测血压168 / 80mmHg，尿蛋白(++)，最准确的诊断是**高血压2级，极高危**
- 95、左心衰竭常表现为**常采取端坐呼吸体位**

- 96、青年患者，长期上腹痛，解黑便伴呕吐咖啡色液体，多见于**消化性溃疡**
- 97、心悸伴食欲增加、消瘦、出汗最常见于**甲状腺功能亢进**
- 98、甲亢患者，FT4增高，FT4、TT4正常，应诊断为**T3型甲亢**
- 99、患者，男性，34岁，骤起高热，持续几小时后大汗，体温降至正常，1天后再次出现高温骤起骤降，此患者诊断优先考虑**疟疾**
- 100、心悸伴昏厥或抽搐可见于**病态窦房结综合征**
- 101、支气管哮喘是由**多种细胞和细胞组分参与的气道慢性炎症**
- 102、保持镇定、作风严谨属于**手术治疗中的道德要求**
- 103、安全有效属于**药物治疗中的道德要求**
- 104、医学道德评价的方式有**社会舆论、传统习俗和内心信念**
- 105、医患关系遵循的最重要的道德原则是**医患平等关系**
- 106、影响医患关系的最次要因素是**患者所在单位的因素**
- 107、在临床诊疗活动中，医务人员收受药品、医用设备、医用耗材等生产、经营企业或经销人员以各种名义给予的财物或提成的，**医德考评结果应记为较差**
- 108、广义的医患关系是指**各类医务人员与患者及其家属的关系**
- 109、医德考评要坚持**实事求是、客观公正**的原则
- 110、“医学科学规律，不断更新医学理念和知识，保证医疗技术应用的科学性、合理性”这是**医师执业的重要行为规范**
- 111、弘扬**高尚医德**，严格自律，不索取和非法收受患者财物不利用执业之便谋取不正当利益
- 112、医患沟通是指**医患之间信息的传递与交流**
- 113、《中华人民共和国执业医师法》明确规定，医师是指**依法取得执业医师资格或者执业助理医师资格，经注册在医疗、预防、保健机构中执业的专业医务人员**

- 114、医师在进行实验性临床医疗时，应充分保障患者或其家属的知情同意权
- 115、卫生部、国家食品药品监督管理局、国家中医药管理局参与组织制定了《医疗机构从业人员行为规范》
- 116、组织实施医师资格考试的部门是省级以上人民政府卫生行政部门
- 117、治疗隐球菌肺炎首选的抗生素为氟康唑
- 118、中央型肺癌的直接 X 线征象有肺门块影
- 119、支气管哮喘患者以呼气性呼吸困难为主
- 120、患者，男性，30 岁。近期劳累突发畏寒、高热。咳嗽，铁锈样痰。查体 体温高达 39℃，干咳，伴右侧胸痛，咳嗽和深呼吸时加重；急性病容，颜面潮红，口角有疱疹，右下肺可闻及支气管呼吸音。临床诊断为急性肺炎，最可能的病原体是肺炎链球菌
- 121、胸腔抽液每次不宜超过 1.0L 以上
- 122、对 MRSA 引起的肺炎首选的抗生素是万古霉素
- 123、最易并发肺脓肿的肺炎是葡萄球菌肺炎
- 124、慢性阻塞性肺疾病(COPD)患者低氧血症鼻导管吸氧治疗时，吸入氧浓度的计算公式为吸入氧浓度(%)=21+4×氧流量(L/min)
- 125、抑制哮喘气道炎症的首选药物是糖皮质激素
- 126、可以作为诊断支气管哮喘的依据是反复发作呼气性呼吸困难伴弥漫性哮鸣音可自行缓解或治疗后缓解
- 127、哮喘发作时的并发症，最常见的是气胸、肺不张
- 128、吸烟者所患肺癌最常见的是鳞状细胞癌
- 129、慢性支气管炎诊断主要依据于病史和体征
- 130、慢性支气管炎急性发作伴细菌感染时，最主要的临床表现是咳脓性痰且痰量增加

- 131、支气管哮喘的肺功能异常，主要表现在**第一秒钟用力呼气量减少**
- 132、患者，男，60岁，咳嗽、咳痰5年余，常于季节交替时加重。近8个月出现喘息，双肺可闻散在哮鸣音及湿啰音，痰涂片检查见大量中性粒细胞。其最可能的诊断为**慢性支气管炎，喘息型**
- 133、广泛前壁心肌梗死心电图表现在**V1~V6、I、aVL**
- 134、**收缩压 \geq 140mmHg，和（或）舒张压 \geq 90mmHg**即可诊断为高血压
- 135、**阵发性室上性心动过速**的心律失常处理时，可应用兴奋迷走神经方法纠正
- 136、急性前壁心肌梗死最常见的心律失常为**室性过早搏动**
- 137、高血压病者服用降压药物治疗，降压目标是**血压降至正常范围，即年轻者血压控制在120~130/80mmHg，老年人可降至140/90mmHg以内**
- 138、在风湿性二尖瓣狭窄中常见的心律失常是**心房颤动**
- 139、贫血与甲亢对心脏产生的影响使**左室、右室容量负荷加重**
- 140、硝酸异山梨酯的主要作用是**扩张冠状动脉及外周静脉，降低心脏前负荷，减少心肌氧耗**
- 141、急性心肌梗死5小时，最适宜的治疗方案是**溶栓治疗**
- 142、在直立、运动中易引起晕厥的心脏瓣膜病是**主动脉瓣狭窄**
- 143、风湿性心脏瓣膜病主动脉瓣狭窄最主要的特征是**主动脉瓣区喷射性杂音伴第二心音减弱或消失**
- 144、多数急性心肌梗死患者最早出现和最突出的症状是**剧烈而持久的胸骨后疼痛**
- 145、风心病主动脉瓣狭窄的主要体征是**胸骨右缘Ⅱ肋间收缩期吹风样杂音**
- 146、风心病二尖瓣关闭不全伴亚急性感染性心内膜炎患者，心脏超声检查的表现对诊断最有意义的是**二尖瓣瓣膜有赘生物**
- 147、亚急性感染性心内膜炎最常见的致病菌是**草绿色链球菌**

148、急性心肌梗死心电图检查显示Ⅱ、Ⅲ、aVF导联出现异常Q波，ST段抬高，梗死部位在下壁

149、确诊消化性溃疡的首选检查方法是胃镜检查及胃黏膜活组织检查

150、患者，女性。既往十二指肠溃疡病史10年，着凉后上腹部疼痛，2天前突然呕咖啡样胃内容物，排柏油样便，随后晕厥。估计出血量为1000ml以上

151、患者，男，30岁，突发上腹剧痛伴恶心呕吐2小时。查体：BP120/80mmHg，腹软，上腹轻压痛，化验WBC $11.0 \times 10^9/L$ ，血淀粉酶 >3 倍，该患者最可能诊断为轻型急性胰腺炎

152、急性胰腺炎发病早期最敏感的指标是血淀粉酶

153、急性胰腺炎时，实验室检查中的CRP有助于评估与监测急性胰腺炎的严重性

154、确诊慢性胃炎最可靠的检查方法是活组织检查

155、十二指肠球后溃疡多发生在十二指肠球部以下

156、出血坏死性胰腺炎的特点是血钙降低

157、胃癌淋巴结转移常见部位为左锁骨上

158、患者，男性，35岁。服用吲哚美辛10片后胃痛，今晨呕咖啡样胃内容物约250ml来诊，既往无胃病史。则首选的检查是急诊胃镜

159、急性胰腺炎时，可减轻腹痛的体位是弯腰抱膝位

160、诊断消化性溃疡急性穿孔最有价值的临床表现是肝浊音区消失