

# 肾内科（中级）

〔专业代码:307〕

- 
- 1、平卧位时叩诊移动性浊音阳性，腹水量至少已达 1000ml
  - 2、患者，女性，21 岁，肌注青霉素后突发出现面部局限性水肿伴呼吸困难，最可能的诊断为血管神经性水肿
  - 3、患者，男性，40 岁，3 小时前突然出现剧烈头痛，伴呕吐。查体：颈部轻度抵抗，克氏征阳性，体温 37.5℃，血压 17.5 / 10.7kPa。其他神经系统检查阴性，诊断首先考虑蛛网膜下腔出血
  - 4、患者，男性，24 岁，低热、盗汗、乏力 6 个月，咳嗽痰中带血，诊断考虑肺结核
  - 5、引起心源性休克最常见的病因是急性心肌梗死
  - 6、重度脾肿大的标准为脾大，超过前正中线
  - 7、某糖尿病患者，女性，58 岁，突发高热、寒战、左胸痛，咳嗽，咳多量黄脓性带血丝性痰液。X 线显示右下肺叶实变，并多个液气囊腔。最可能的诊断是葡萄球菌性肺炎
  - 8、急性细菌性痢疾的大便性状为黏液性脓性鲜血便
  - 9、患者，男性，24 岁，下班途中突然倒地，意识不清，四肢阵发性抽搐，小便失禁，约 1 分钟后逐渐清醒，最可能的病因是癫痫大发作
  - 10、大量咯血指的是每日咯血量在 500ml 以上
  - 11、消化性溃疡活动期大便隐血阳性提示每天出血量不少于 5ml
  - 12、男性患者，饮酒后剧烈呕吐，先吐出胃内容物，后呕鲜血 100ml，无腹痛及发热，既往体健。查体：轻度贫血貌，余无异常。诊断考虑贲门黏膜撕裂症
  - 13、放射性 131I 用于高功能结节性甲亢
  - 14、患者，女，32 岁，间断四肢关节疼痛 5 年，近来感乏力、食欲不振、心悸、气短，肝肋下一指，轻触痛。查血红蛋白 96g / L，尿蛋白(+)，双下肢轻度水肿，其原因可能为二尖瓣狭窄致右心衰

- 
- 15、过敏性紫癜最常见的类型为**紫癜型**
- 16、呕吐宿食的常见原因是**幽门梗阻**
- 17、正常成人 24 小时尿量为 **1000 ~ 2000ml**
- 18、无尿是指 24 小时尿量少于 **100ml**
- 19、咯血最常见的原因是**肺结核**
- 20、尿路刺激征的主要原因为**尿路感染**
- 21、患者，女性，25 岁，紧张易怒，疲乏无力，怕热多汗，饭量增加，体重下降，初步诊断甲亢，此患者一般不会出现的表现是**血常规白细胞总数增多**
- 22、排便带血，鲜红色，不与粪便混合，粘附于粪便表面，常见于**直肠息肉**
- 23、男性患者，22 岁，晚餐后突然出现上中腹部疼痛并恶心呕吐胃内容物，随后出现发热，腹痛转移至右下腹。查体：体温 38℃，心肺无异常。右下腹麦氏点压痛。诊断考虑**急性阑尾炎**
- 24、患者，男，18 岁，心脏检查发现胸骨左缘第 1、2 肋间有连续性震颤，并可闻及机器样连续性杂音，考虑为**动脉导管未闭**
- 25、在每天排便的情况下，消化道积血最快 **3 天**排尽
- 26、患者，女，30 岁，诉心悸胸闷。心尖区闻及收缩期杂音，经检查确诊为甲状腺功能亢进症，心脏无器质性病变，其心脏杂音应具有的特点是**性质柔和**
- 27、右心功能不全引起的水肿主要因**毛细血管内压力增高**
- 28、意识障碍是指**影响大脑功能活动的疾病引起的意识改变**
- 29、患者，女，45 岁，出现发热、尿频、尿急、尿痛症状，最可能的诊断为**急性膀胱炎**
- 30、患者，男，18 岁。进食不洁饮食后出现发热、腹泻 2 天。伴有黏液及脓血的糊状便。诊断首先考虑**细菌性痢疾**

- 
- 31、意识障碍伴瞳孔散大的疾病是**癫痫**
- 32、颅内高压症所致呕吐的特点是**喷射性**，**无恶心**，**呕吐后不轻松**
- 33、**口服甘露醇**属于渗透性腹泻
- 34、患者，女，25岁，注射青霉素后突然晕倒，血压测不到。抢救应用**肾上腺素静脉注射**
- 35、男性患者，28岁。近2年反复发作左下肢，红、肿、痛、热，用抗生素可缓解。查体：二尖瓣区可闻及舒张期隆隆样杂音，左下肢肿胀，压之无痕，局部皮肤发红、皮温高，右下肢无异常。其肿胀的原因是**慢性淋巴管炎所致水肿**
- 36、体温在39℃以上，波动幅度大，24小时内体温波动范围超过2℃，但都在**正常水平以上**，称为**弛张热**
- 37、消化性溃疡常伴有**反酸、暖气**症状
- 38、心力衰竭引起的发绀属于**混合性发绀**
- 39、患者，女，38岁，剧烈咳嗽后突然出现呼吸困难，胸透显示左侧气胸，查体可出现的体征有**呼吸音消失**
- 40、患者，23岁女性，查体可见下肢散在直径3~5mm皮下出血区，应称为**紫癜**
- 41、男性患者，32岁，间断性上腹痛3年，时有反酸、暖气，每于受凉后加重。近3天疼痛加重，今日患者突然呕咖啡样物500ml，同时感头晕、心悸，出汗。出血后腹痛缓解。患者出血的原因考虑为**消化性溃疡**
- 42、患者，女性，20岁，持续高热1周，胸、腹部出现皮疹，经检查确诊为伤寒，其皮疹特征为**呈粉红色丘疹**
- 43、柏油样便提示**上消化道部分出血**
- 44、患者，男性，65岁，查体时发现大便隐血阳性，提示消化道出血量至少大于**5ml**
- 45、呕吐伴眩晕、眼球震颤，应考虑**前庭器官疾病**

- 
- 46、旁路胆红素约占体内总胆红素来源的 15% ~ 20%
- 47、脑出血和脑梗死最有鉴别价值的检查是头颅 CT
- 48、隐性黄疸时，血中胆红素浓度为  $>17\mu\text{mol} / \text{L}$ ，  $<34\mu\text{mol} / \text{L}$
- 49、皮肤黏膜出现发绀时，毛细血管血液还原血红蛋白至少超过  $50\text{g} / \text{L}$
- 50、血清胆红素正常值为  $<17\mu\text{mol} / \text{L}$ ，即  $1.0\text{g} / \text{dl}$
- 51、左心功能不全呼吸困难产生的最主要因素是肺淤血使气体弥散功能降低
- 52、突发剧烈胸痛伴呼吸困难和发绀常见于肺梗死
- 53、尿频的定义是排尿次数增多而每次尿量减少
- 54、右心衰竭时呼吸困难的机制主要为右心房及上腔静脉压力升高
- 55、患者，女，28岁，晨起恶心、呕吐2天，停经50天。最可能的诊断是早期妊娠
- 56、日咯血量  $100 \sim 500\text{ml}$  时为中量
- 57、患者，女，80岁，急性结石性胆囊炎术后，因伤口疼痛肌注哌替啶1支，半小时后昏睡，呼吸10次/分，可能原因是麻醉剂过量
- 58、长期腹泻，明显消瘦，腹部发现包块，首先考虑结肠癌
- 59、患者，女，37岁，既往体健，突发剧烈头痛之后意识丧失。查体无神经系统阳性定位体征，应进行的最恰当检查为头颅 CT 平扫
- 60、患者，男，40岁，10余年咳嗽、咳脓痰史，1小时前突然大咯血，考虑病因可能为支气管扩张症
- 61、黏液性水肿患者，水肿主要表现为眼面
- 62、中心性发绀常具有的特点是见于发绀型先天性心脏病
- 63、患者，男，50岁，高血压病多年，近日活动后出现呼吸困难伴左胸痛，咳嗽频繁，咳出为粉红色泡沫样血痰，可能的疾病为急性左心衰

- 
- 64、患者，男，3岁，在独自玩玩具时突然出现刺激性咳嗽，呼吸困难，其病因最可能是**气管异物**
- 65、正常情况下，肾小管将吸收肾小球滤过液总量的**99%**
- 66、患者，女性，23岁，发作性头痛5年，每次头痛发作前出现眼前异彩，持续约20分钟，继之出现从一侧扩展到另一侧的头部跳痛。头痛睡眠后缓解，头颅CT正常，此时治疗首选药物是**麦角胺咖啡因**
- 67、尿液呈棕红色或葡萄酒色，镜检无红细胞见于**血红蛋白尿**
- 68、Dubin-Johnson综合征属于**肝细胞对某些阴离子的排泄障碍**
- 69、一心房颤动患者，突觉呼吸困难咳嗽、胸痛，心脏听诊闻及三尖瓣区舒张期奔马律其，来源为**右心室奔马律**
- 70、患者，男，44岁，有“胃病”史十年，近一月来疼痛加重，以夜间痛为主，三日来呕吐频繁，上腹饱胀，呕出物为酸臭宿食，诊断考虑为**幽门梗阻**
- 71、瞳孔缩小见于**有机磷中毒**
- 72、正常心尖搏动位于第5肋间锁骨中线内侧**0.5~1.0cm**
- 73、导致Austin-Flint杂音的情况是**主动脉瓣关闭不全**
- 74、第一心音增强见于**二尖瓣狭窄**
- 75、正常成人胸廓前后径与左右径之比为**1:1.5**
- 76、面具面容见于**震颤麻痹**
- 77、心浊音界变小，甚至叩不出见于**肺气肿**
- 78、患者，女，15岁，受凉后1周出现双下肢对称性皮肤瘀点、瘀斑，无四肢关节肿痛、血尿和水肿。血小板计数 $30 \times 10^9 / L$ 。最可能的诊断为**特发性血小板减少性紫癜**
- 79、呼吸深慢见于**酸中毒**

- 
- 80、Kernig 征检查属于**脑膜刺激征**
- 81、一年轻男子，饱餐后突发中上腹部刀割样剧痛，板状腹，最可能的诊断是**胃溃疡**
- 82、呼吸深快见于**过度紧张**
- 83、舒张早期奔马律与第三心音在产生机制及听诊上不同之处为**出现在心率 $>100$ 次/分**
- 84、颅内出血，颅内压增高时可出现**血压增高，呼吸浅慢**
- 85、急性呕吐伴上腹痛、发热、皮肤发黄，应考虑**急性胆囊炎合并胆道梗阻**
- 86、典型的支气管哮喘的症状是**发作性喘息**
- 87、砖红色冻胶样痰常见于**克雷伯杆菌肺炎**
- 88、患者，男性，62岁，体检发现血压148/86mmHg，既往无高血压病史，最适宜的医嘱是**隔日再次测定血压**
- 89、服用阿司匹林后出现呕血，其原因是**急性胃黏膜病变**
- 90、急性肾衰竭的病因是**急性肾功能衰竭分肾前、肾性和肾后性三种**
- 91、患者，青年男性，有吸毒史，发热1周，体温最高40.3℃，最低38.2℃，偶有咳嗽，少量痰中带血。查体神志清楚，呼吸22次/分，血压110/70mmHg，心率110次/分，肘静脉处有多个针眼，上腹部轻压痛。血常规白细胞总数 $19.8 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞92%，此患者最优先进行的诊疗措施是**抽血做血培养**
- 92、主要为毛细血管壁缺陷的疾病是**过敏性紫癜**
- 93、诊断COPD的必备条件是气流的不完全可逆受限，其确定标准是 **$FEV_1 < 80\%$ 预计值， $FEV_1 / FVC < 70\%$**
- 94、一患者出现尿频、尿急、尿痛，同时伴有腰痛、高热畏寒，考虑**急性肾盂肾炎**可能性大
- 95、甲亢患者，FT3增高，FT4、TT4正常，应诊断为**T3型甲亢**
- 96、患者，男，24岁，淋雨后发热，咳嗽，并咳铁锈色痰，可能的病因为**肺炎球菌性肺炎**

- 
- 97、患者，中年男性，心悸、胸闷就诊，查体心脏听诊出现“大炮音”，最可能的诊断是**完全性房室传导阻滞**
- 98、医学行为是否有利于病人病情的缓解、治疗和康复是**医德评价的医疗标准**
- 99、**同情和开导病人属于心理治疗的道德要求**
- 100、医务人员医德考评的首要标准是**救死扶伤，全心全意为人民服务**
- 101、医学道德评价的方式有**社会舆论、传统习俗和内心信念**
- 102、医患关系遵循的最重要的道德原则是**医患平等关系**
- 103、严密观察、精心治疗属于**手术后的道德要求**
- 104、“不索取和非法收受患者财物；不收受医疗器械、药品、试剂等生产、经营企业或人员以各种名义、形式给予的回扣、提成；不违规参与医疗广告宣传和药品医疗器械促销”体现了**廉洁自律，恪守医德的基本行为规范**
- 105、《医疗机构从业人员行为规范》适用于**医疗机构内所有从业人员**
- 106、**纪检监察纠风部门**负责对实施情况进行监督检查
- 107、组织实施医师资格考试的部门是**省级以上人民政府卫生行政部门**
- 108、遵守医学伦理道德,尊重患者的知情**同意权和隐私权**，为患者保守医疗秘密和健康隐私维护患者合法权益
- 109、“医学科学规律，不断更新医学理念和知识，保证医疗技术应用的科学性、合理性”这是**医师执业的重要行为规范**
- 110、医师在进行实验性临床医疗时，应充分保障**患者或其家属的知情同意权**
- 111、医患沟通是指**医患之间信息的传递与交流**
- 112、医师在执业活动中享有的权利是在**执业活动中，人格尊严、人身安全不受侵犯**
- 113、与肺癌的副癌综合征中高钙血症有关的是**异位性甲状旁腺激素**

- 
- 114、社区获得性肺炎，最常见的致病菌是肺炎链球菌
- 115、慢性支气管炎诊断主要依据于病史和体征
- 116、X线检查发现右上肺均匀致密大片状影，其中有含气支气管影，最有可能的疾病是大叶性肺炎
- 117、哮喘维持控制3个月，治疗方案可以降级
- 118、患者，男性，30岁。近期劳累突发畏寒、高热。咳嗽，铁锈样痰。查体 体温高达39℃，干咳，伴右侧胸痛，咳嗽和深呼吸时加重；急性病容，颜面潮红，口角有疱疹，右下肺可闻及支气管呼吸音。临床诊断为急性肺炎，其最可能的病原体是肺炎链球菌
- 119、厌氧菌所致肺炎与肺炎球菌肺炎不同之处为咳有臭味痰
- 120、放射治疗不能控制或改善全血细胞减少的支气管肺癌的并发症
- 121、诊断阻塞性肺气肿，最有价值的是残气量 / 肺总量 > 40%
- 122、患者，男性，72岁。吸烟指数1200，近半年有咳嗽，痰中带血丝，近2个月出现声嘶，查右锁骨上窝触及一肿大淋巴结，质硬，无压痛。则可能诊断为肺癌
- 123、胸水比重1.008是支持胸水漏出液的诊断
- 124、患者，男性，65岁。确诊慢性支气管炎、肺气肿5年，此次再次发作，呼吸困难加重且伴有发绀入院，未吸氧。与之相符的血气结果是PaO<sub>2</sub>降低，PaCO<sub>2</sub>升高
- 125、慢性支气管炎急性发作伴细菌感染时，最主要的临床表现是咳脓性痰且痰量增加
- 126、哮喘患者急性发作的治疗目的是缓解支气管平滑肌痉挛
- 127、参与速发型支气管哮喘的主要免疫炎症细胞为肥大细胞
- 128、治疗隐球菌肺炎首选抗生素为氟康唑
- 129、对于轻度和中度AECOPD患者，主要致病菌为肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌

- 
- 130、慢性肺源性心脏病发生的关键环节是**肺动脉高压**
- 131、洋地黄中毒多见的心律失常是**室性期前收缩二联律**
- 132、终止心室颤动最有效的方法是**直流电除颤** 
- 133、近年来，在慢性心力衰竭治疗中常用的卡托普利属**血管紧张素转换酶抑制剂**
- 134、风心病二尖瓣关闭不全伴亚急性感染性心内膜炎患者，心脏超声检查的表现对诊断最有意义的是**二尖瓣瓣膜有赘生物**
- 135、阵发性室上性心动过速患者的最佳治疗措施是**静注毛花苷 C**
- 136、慢性充血性心力衰竭的诱发因素中，最为常见的是**感染**
- 137、**高血压**引起左室压力负荷过重
- 138、**阵发性室上性心动过速**的心律失常处理时，可应用兴奋迷走神经方法纠正
- 139、心肌梗死急性期患者，一旦出现室性期前收缩，应首选**利多卡因**
- 140、高血压病者服用降压药物治疗，降压目标是**血压降至正常范围，即年轻者血压控制在 120 ~ 130/80mmHg，老年人可降至 140/90mmHg 以内**
- 141、患者，女性，25 岁。活动后心悸，气促 4 年，偶感心前区疼痛。查体：血压 140/40mmHg，心界向左下扩大，胸骨左缘第 3 肋间闻及舒张期叹气样杂音。最可能的诊断为**风心病，主动脉瓣关闭不全**
- 142 风湿性心脏瓣膜病主动脉瓣狭窄最主要的特征是**主动脉瓣区喷射性杂音伴第二心音减弱或消失**
- 143、对风湿性二尖瓣关闭不全最具有诊断意义的体征是**心尖区收缩期吹风样杂音**
- 144、急性前壁心肌梗死最常见的心律失常为**室性过早搏动**
- 145、风湿性心脏病主动脉瓣狭窄常见的临床"三联征"为**呼吸困难、心绞痛、晕厥**
- 146、患者，男性，45 岁。上腹部隐痛 6 个月，1 天前饮酒后呕咖啡样物，约 150ml，排柏油

---

样便 200ml，既往无肝病史。查体：BP90/55mmHg，P110 次/分，上腹部轻压痛，无反跳痛和肌紧张，肠鸣音活跃，实验室检查血红蛋白 90g/L。其止血措施正确的是**奥美拉唑**

147、患者，男性，57 岁。既往消化性溃疡 10 余年，近 1 个月加重。24 小时合并上消化道大出血，入院经积极治疗，出血仍未停止。最适合的处置是**手术治疗**

148、患者，男性，35 岁。服用吲哚美辛 10 片后胃痛，今晨呕咖啡样胃内容物约 250ml 来诊，既往无胃病史。则首选的检查是**急诊胃镜**

149、患者，男，30 岁，突发上腹剧痛伴恶心呕吐 2 小时，查体：BP120/80mmHg，腹软，上腹轻压痛，化验 WBC $11.0 \times 10^9/L$ ，血淀粉酶 $>3$  倍，该患者最可能诊断为**轻型急性胰腺炎**

150、目前治疗食管胃底静脉曲张破裂出血的重要手段是**生长抑素**