

全科医学（中级）

〔专业代码:301〕

-
- 1、家庭沟通三大元素指**发送者、信息、接受者**
 - 2、全科医学专科的服务对象是**所有人**
 - 3、全科医学的“持续性服务”意味着**全科医生对人生各阶段以及从健康到疾病的各阶段都负有健康管理责任**
 - 4、筛检的目的在于**早期发现某些可疑疾病**
 - 5、我国卫生发展战略在卫生事业重点选择上，要把**农村作为卫生工作的长期战略重点**
 - 6、由家庭所在的社会文化传统而来的权威，属于**传统权威型**的权力结构
 - 7、全科医学竭力倡导推行的医患关系模式是**共同参与模式**
 - 8、全科医疗的具体特性针对的问题是**常见问题**
 - 9、持续性服务不是指**长期提供 24 小时不中断的服务**
 - 10、2006 年中央编办等颁发的《城市社区卫生服务机构设置和编制标准指导意见》中，提出“原则上社区卫生服务中心按每万名居民配备 **2~3 名全科医师**”
 - 11、家庭把其成员培养成合格的社会成员，学会与人沟通、遵守社会行为规范，胜任社会角色，这种家庭的功能属于**社会化功能**
 - 12、实现区域卫生规划的基础是**发展全科医学教育，培养全科医生**
 - 13、全科医生在临床判断过程中，**概率**是主要的判断依据之一，这里的概率是指**医生根据症状判断患该病的概率**
 - 14、循证医学中最好的证据是指**大规模的随机对照临床试验**
 - 15、**环境资源**属于家庭外资源
 - 16、全科医学与全科医疗取得良好效果的关键是**良好的医患关系**
 - 17、**生物-心理-社会**医学模式属于社区卫生服务的基础
 - 18、社区卫生服务中心与二、三级医院之间应以**契约式协议**建立固定的**双向转诊**

-
- 19、每个社区卫生服务中心应保证每月至少举办健康知识讲座的次数是 1 次
 - 20、家庭关怀度指数反映出家庭成员对家庭功能的主观满意度
 - 21、新世纪人们医学模式和健康观念的改变是由于慢性非传染性疾病的发病率和死亡率增加
 - 22、《国家基本公共卫生服务规范(2011 年版)》要求: 确诊的 2 型糖尿病患者, 建议其每年至少测量 1 次空腹血糖, 并接受医务人员健康指导
 - 23、实现“人人享有卫生保健”的基本策略和途径是初级卫生保健
 - 24、社区卫生服务的骨干力量是全科医生
 - 25、社区卫生诊断的周期一般是 5 年
 - 26、以预防为导向的服务属于社区卫生服务的特点
 - 27、构成社区的最基本要素是人群和地域
 - 28、从长远看我国规范的全科医生培养模式是全科医生“5+3”培养模式
 - 29、“社区”将具有不同文化背景、生活方式、人生观和价值观的个人、家庭、团体聚集在一起, 提供彼此沟通、交流的机会, 提倡共同参与社区活动, 这体现了社区的连接功能
 - 30、社区在我国城市主要是指街道、居委会, 在农村主要是指乡镇、村
 - 31、“人人享有卫生保健”战略目标是在 1977 年 5 月第 30 届世界卫生大会提出的
 - 32、社区卫生服务中心原则上按街道办事处范围设置, 以政府举办为主
 - 33、最基本的、人人都能得到的、体现社会平等权利的、人民群众和政府都能负担得起的卫生保健服务是初级卫生保健
 - 34、流行病学研究的观察法与实验法的根本区别在于是否人为控制研究的条件
 - 35、以社区为基础的病例-对照研究所选病例的优点是病例代表性好
 - 36、盲法调查方法可用于控制信息偏倚
 - 37、疾病的流行是指疾病的发生, 明显地超过当地人群的一般发病水平

-
- 38、病例-对照研究中匹配设计是为了控制**混杂偏倚**
- 39、在比较不同地区发病率或死亡率时应注意使用**标化发病率、死亡率**
- 40、随机抽样的目的是**减少样本的偏性**
- 41、在探讨饮酒与胃癌关系的病例-对照研究中，若对照组的女性比例显著高于病例组，则可能会产生的偏倚是**混杂偏倚**
- 42、一种新治疗方法可以延长寿命，但不能治愈该病，则会出现**该病患率将升高**
- 43、在抽样调查中，**分层抽样**的抽样误差最小
- 44、在一定范围的固定人群中，短时间内突然出现大量具有相同症状和体征的病人，这种现象一般被描述为**短期波动**
- 45、病例-对照研究中，匹配的**目的是提高统计效率，控制混杂因素**
- 46、与疾病的关联最强的因素是**年龄**
- 47、计算患病率的分子是**观察时点或时期某病的新、旧病例数**
- 48、某社区有1万户约3.5万人口，拟抽取10%人口进行某病调查。随机抽取第1户，随后每隔10户抽取1户，抽到户的每个成员都纳入调查对象。这种抽样方法称为**系统抽样**
- 49、某地区1999年平均人口为20万，该地区1998年结核病患者为1226人，其中治愈134例，死亡16例。1999年底结核病患者为1854人，则该地区1999年结核病发病率为**389/10万**
- 50、流行病学研究的基础是**描述性研究**
- 51、**以人群为整体确定试验分组**属于社区试验的主要特征
- 52、用变异系数比较变异程度适用于**不同指标或均数相差较大**
- 53、总体均数置信区间的宽度取决于**置信水平、标准差和样本含量**
- 54、图表示某地区近30年三种疾病的发病率，在各年度的动态发展速度情况，宜绘制**普通线**

图

55、调查 1998 年某地正常成年男子的红细胞数，总体是 1998 年该地全部正常成年男子的红细胞数的集合

56、统计推断的主要内容为参数估计和假设检验

57、对于一个分布不明的资料，或是分布一端或两端出现不确定值。用于描述其集中趋势是中位数

58、某医生对一批计量、计数资料实验数据进行假设检验，结果判定如下：进行四格表 X^2 检验时， $X^2=3.96$ 则 $P < 0.05$ 。

59、四个百分率作比较，有 1 个理论数小于 5、大于 1，其他都大于 5，则作 X^2 检验不必校正。

60、对统计图和统计表标题的要求是统计表标题在上方，统计图标题在下方

61、两组数据作均数差别 t 检验，要求数据分布近似正态而且要求两组数据方差相近

62、该组资料的 95%医学参考值范围为 $P_{2.5} \sim P_{97.5}$

63、确定正常人的某项指标的正常范围时，调查对象是排除影响研究指标的疾病和因素的人

64、描述一组数值变量资料的分布特征应根据分布类型选用相应的集中、离散趋势指标

65、对于一组呈正态分布的数值变量资料，若对每一个个体同减去一个不为零的数，则均数变、标准差不变

66、“提高本地区妇女儿童的健康水平”属于健康教育计划目标中的总目标

67、预防接种属于健康行为中的保健行为

68、“近期和中期效果评价”又称为效应评价

69、健康相关行为的含义是与健康和疾病有关的行为

70、健康促进规划过程评价的重点是项目活动的数量、质量和效率

-
- 71、社区健康促进的核心策略是**社会动员**
 - 72、预防慢性退行性疾病的健康教育应开始于**中年期**
 - 73、在人的整个生命周期中，被动发展阶段的年龄约为**0~3岁**
 - 74、**医患之间就健康问题进行探讨**属于人际传播
 - 75、**情绪过分压抑**属于C型行为模式
 - 76、在制定艾滋病的健康促进规划时，通过工会把工人组织起来，积极开展艾滋病防制教育，这体现了规划设计的**参与性原则**
 - 77、为降低5岁以下儿童死亡率而进行的健康教育项目的一级目标人群是**婴幼儿母亲**
 - 78、健康促进规划的评价方案形成于**规划设计阶段**
 - 79、个体发现患病后及时就诊属于**求医行为**
 - 80、营养不良患儿皮下脂肪消减的顺序是**腹部-躯干-臀-四肢-面颊**
 - 81、学龄儿童复种卡介苗前应做**OT试验**以检查体内有无结核杆菌感染
 - 82、学龄前期是指**3周岁后到入小学前（6~7岁）**
 - 83、足月儿生后添加维生素D制剂的时间是**2周**
 - 84、儿童保健工作中最常使用的一种发育筛查方法是**丹佛发育筛查测验**
 - 85、4个月婴儿，在社区卫生服务中心检查，**头不能抬起**的情况被认为是发育异常
 - 86、小儿的眼和头能转向声源，能区别语言的意义时，已有**8个月**
 - 87、经过抗原物质的刺激使机体免疫系统产生特异性免疫，称为**自动免疫**
 - 88、婴儿期是指**从出生后至满1周岁之前**
 - 89、小儿贫血中最常见的是**缺铁性贫血**
 - 90、新生儿期是指**从出生脐带结扎开始到生后满28天**
 - 91、小儿添加淀粉类食物的年龄是**4个月**

-
- 92、孕妇整个妊娠期的体重增加平均为 12.5kg
- 93、B 超监护不能显示的项目是胎肺成熟度
- 94、妇女保健范畴为妇女一生性器官及性功能的保健和疾病防治
- 95、可能会出现闭经的避孕措施为口服避孕药
- 96、服用短效避孕药致无月经来潮连续 3 个月后，需停药检查
- 97、陈女士，早晨来社区卫生服务站诉说，起床后发现昨晚 12 时睡觉前，漏服短效避孕药，
现又忘了补服时间，医生应告知其补服的时间为 12 小时内
- 98、妊娠高血压疾病患者使用硫酸镁解痉时，应停用药物的情况是膝反射消失
- 99、杨女士，30 岁，哺乳期 4 个月，正接受滴虫性阴道炎的治疗，前来询问避孕措施。全科
医生应告知选择使用避孕套
- 100、正常情况下，每小时的胎动为 3~5 次
- 101、可能会发生类早孕反应的避孕措施为口服避孕药
- 102、晚婚年龄为男 25 岁、女 23 岁
- 103、产后出血是指胎儿娩出后 24 小时内阴道流血量 > 500ml
- 104、日常生活能力量表可使用自评或他评方式对被试者的日常生活能力进行测定
- 105、老年人综合健康评估包括身体、心理和社会交往
- 106、老年人跌倒常见危险因素中,环境中的危险因素属外在因素
- 107、老年人便秘主要的影响因素是各种因素的综合
- 108、老年人最常见的骨折部位是髌部骨折
- 109、老年性骨关节炎好发部位在负重关节
- 110、李大爷因便秘向护士小王求助咨询，小王随即建议其服用果导片。小王的这种做法违背
先非药物疗法，后药物疗法的用药原则

-
- 111、鸡蛋属于低嘌呤含量
- 112、恶性胃溃疡常表现为粪便隐血持续阳性
- 113、患者，男性，60岁，咳喘反复发作10余年，昨晚一阵剧烈咳嗽后突感左侧胸痛，呼吸困难，则可能是出现自发性气胸
- 114、老年人心理健康主要测量的是认知功能、精神状态、行为是否异常
- 115、庆大霉素临床使用时达到有效血清浓度则可杀灭敏感细菌
- 116、青霉素对胎儿没有致畸作用
- 117、治疗急性痛风较好的药物是秋水仙碱
- 118、抗菌谱最广的药物是四环素
- 119、肾功能不全者禁用的药物是四环素
- 120、巴比妥类药催眠后所致的次晨宿醉现象属于后遗效应
- 121、按药物对胎儿危害的分类标准，仅在动物实验证实对胎仔有致畸或杀胚胎的作用，但在人类缺乏研究资料证实的为C类
- 122、治疗军团菌感染应首选红霉素
- 123、青霉素+庆大霉素两种抗菌药物合用可获得协同作用
- 124、患者长期口服避孕药后失效，可能因为同时服用肝药酶诱导剂
- 125、长期应用广谱抗生素常引起二重感染的病原体是白色念珠菌
- 126、安慰剂是本身没有药理活性的制剂
- 127、临床所用的药物治疗量是指一般为介于最小有效量和极量之间的量
- 128、对四环素无效的病原体是铜绿假单胞菌
- 129、某疟疾患者突然出现昏迷，给予二盐酸奎宁静滴抢救，抢救过程中，病人又出现寒战、高热、血红蛋白尿，应改用青蒿素继续抢救

-
- 130、治疗急、慢性骨及关节感染宜首选的口服药物是**克林霉素**
- 131、《中华人民共和国执业医师法》明确规定，医师是指**依法取得执业医师资格或者执业助理医师资格，经注册在医疗、预防、保健机构中执业的专业医务人员**
- 132、某中年男子因心脏病发作被送到急诊室，症状及检查结果均明确提示心肌梗死。患者此时很清醒，但由于费用等原因，患者拒绝住院，坚持回家。此时医生应该**尊重患者自主权，但应尽力劝导患者住院，无效时行使干涉权**
- 133、**医患交往中的治疗方面的关系**属于“医患关系的技术性方面”
- 134、医学行为是否有利于医学科学发展和揭示人类的生命奥秘是**医德评价的科学标准**
- 135、遵守医学伦理道德,尊重患者的知情**同意权和隐私权**，为患者保守医疗秘密和健康**隐私**维护患者合法权益
- 136、保持镇定、作风严谨属于**手术治疗中的道德要求**
- 137、在临床诊疗活动中，医务人员收受药品、医用设备、医用耗材等生产、经营企业或经销人员以各种名义给予的财物或提成的，医德考评结果应记为**较差**
- 138、“医学科学规律，不断更新医学理念和知识，保证医疗技术应用的科学性、合理性”这是**医师执业的重要行为规范**
- 139、患者，张工，女，32岁，孕8+周。下腹痛伴阴道流血10天。为决定妊娠是否继续，首选的辅助诊断是**超声检查**
- 140、患者，女性，60岁，绝经4年，白带增多2个月，性交后白带带血2次就诊。妇科检查阴道无充血，宫颈上唇10~12点处呈乳头状糜烂，易出血，下唇滑腻，内诊(-)，B超(-)。可能的出血原因是**宫颈癌**
- 141、子宫内膜癌首选的治疗办法是**手术治疗**
- 142、患者，25岁女性，宫颈重度糜烂，乳头型，宫颈细胞学检查未见癌细胞。最恰当的治疗

是激光治疗

143、异位妊娠最常见的着床部位是**输卵管**

144、35岁患者，习惯性流产5次，每次自然流产均在孕5~6个月发生。最可能的原因是**宫颈内口功能不全**

145、一患者阴道不规则流血3个月，来院就诊。尿妊娠试验阳性，给予刮宫，但刮出物未见绒毛，病理检查显示为蜕膜组织，该患者最可能的诊断为**异位妊娠**

146、患者，35岁，下腹部肿物3年，逐渐增大，自右下腹部开始如拳头大小，现已如妊娠足月大小，但仍能做轻微的家务劳动。最可能的肿瘤为**卵巢黏液性囊腺瘤**

147、患者女性，15岁，月经来潮年余，2~3个月行经一次，每次8~10天，量多，无经期疼痛，呈贫血貌，应首先考虑**无排卵性功血**

148、青春期功能失调性子宫出血的治疗原则是**止血、调整月经周期、促排卵**

149、患者，女28岁，孕1产0，2年前曾行吸刮术，术后常常下腹痛，近3个月来有性交痛，经期大便次数增多，妇科检查触及子宫直肠隐窝有触痛结节，其诊断最可能是**子宫内膜异位症**

150、患者女，33岁，G2P1。因阴道大量流血呈休克状态急诊入院。妇科检查：阴道内有胚胎样组织，宫体6周妊娠大小，两侧附件(-)。首先应补充的病史是**有无停经史**

151、诊断异位妊娠最可靠的指标是**病史，腹部检查及阴道检查**

152、幼儿急疹发热和皮疹的关系是**高热39~40°C之间，持续3~5天骤降，热退疹出**

153、肺部X线表现为游走性浸润的是**肺炎支原体肺炎**

154、为降低高胆红素血症，防止胆红素脑病（核黄疸）的发生最为有效的方法是**蓝光照射**

155、单纯局灶性发作特点是**无意识丧失，也无发作后不适**

156、流行性腮腺炎的潜伏期为**2~3周**

157、4岁男孩，咳嗽5个月，凌晨及活动后加剧，服用多种抗生素无效，服用博利康尼（特

布他林)后有缓解。查体:无发热,面及颈部散在湿疹。两肺呼吸音粗,该患儿最可能的诊断是**咳嗽变异性哮喘**

158、典型的麻疹皮疹最先出现的部位是**耳后、颈部**

159、引起猩红热的病原体是**A组β链球菌**

160 先天性髋关节脱位新生儿期的治疗方法是**支具辅助的自然复位**

161、急性肾小球肾炎的常见致病菌是**溶血性链球菌**

162、幼儿急疹的好发年龄是**2岁以内**

163、流行性腮腺炎病毒属于**副黏液病毒**

164、足月新生儿生理性黄疸多发生于**生后第2~5天出现黄疸,10~14天消退**

165、婴儿腹泻、轻度脱水、轻度酸中毒在无明显呕吐、腹胀时,第1天补液用**ORS溶液**

166、10个月女孩,因频繁吐奶、排血样便2次就诊,诊断为**肠套叠**,经空气灌肠复位症状消失,半天后又排血样便,无呕吐,此时应进行**第二次空气灌肠复位**

167、小儿腹泻的定义是**多病原,多因素引起的大便次数增多和性状改变**

168、幼儿急疹的治疗方法是**发热期间注意退热治疗,皮疹无须特殊治疗**

169、细菌性角膜溃疡发展最迅速的是**铜绿假单胞性角膜溃疡**

170、眼的屈光系统包括**角膜、房水、晶状体、玻璃体**

171、糖尿病性视网膜病变Ⅲ期的表现是**白色软性渗出或并有出血斑**

172、患者女性,42岁,会计,因双眼不适2年就诊。双眼矫正视力1.0,Goldmann压平眼压:左眼30mmHg,右眼25mmHg;前房角镜:宽角。诊断是**原发性开角型青光眼**

173、眼局部用药的疗程最少为**10~12周**

174、患者,男性,79岁,因最近出现的头痛、疲劳和突然失明前来急诊。检查发现右眼视力只有光感,左眼1.0。右眼有传入性瞳孔反应缺陷,直接检眼镜检查见视网膜广泛苍白,中心

凹为鲜红色红斑。最可能的诊断是**视网膜中央动脉阻塞**

175、患者女性，48岁，因视力模糊、头痛伴恶心、腹痛和呕吐前来就诊。患者告知看见电灯泡周围有彩色光圈。体检发现右眼明显充血，瞳孔放大。最可能的诊断是**闭角型青光眼**

176、预防儿童视力残疾的关键是**早期发现和治疗弱视**

177、感染性角膜溃疡一旦穿孔或即将穿孔，其最好的治疗方法是**治疗性角膜移植**

178、患者女性，50岁，因右眼泪溢伴分泌物多半年就诊，检查见右下睑皮肤出现湿疹，按压泪囊区，有黏液脓性分泌物自泪点溢出。行泪道冲洗时，冲洗液自上、下泪点反流，同时伴有黏液脓性分泌物。此病的诊断是**慢性泪囊炎**

179、泪道冲洗时冲洗液自上泪小点反流，同时伴有黏液脓性分泌物为**鼻泪管阻塞合并慢性泪囊炎**

180、糖尿病性视网膜病变V期的表现是**眼底有新生血管和纤维增生**

181、慢性化脓性中耳炎的常见分型是**单纯型，骨疡型，胆脂瘤型**

182、扁桃体手术适应证是**慢性扁桃体炎反复发作或多次并发扁桃体周围脓肿者**

183、按国际标准，阻塞性呼吸暂停是指在7小时睡眠中，呼吸暂停在**30次以上**

184、小学生应重点预防龋坏的牙是**第一恒磨牙**

185、对急性牙髓炎最具诊断特点的是**自发性、阵发性痛，有夜间痛**

186、为预防牙颌畸形，人工哺乳时婴儿较合适的体位是**半坐位**

187、慢性龈炎时牙龈的炎症表现为**探诊易出血**

188、牙周病的基础治疗是指**洁治术和刮治术**

189、复发性口腔溃疡治疗效果最好是找出**病因**，对因治疗

190、**病因预防**属于口腔癌一级预防

191、腐烂、少许渗出皮损使用**油剂**

192、患儿 6 岁。因头皮瘙痒并脱发斑 2 周就诊。查体：头皮散在 5~6 处 1~2cm 直径大小脱发斑，表面少许鳞屑，并可见长约 2~4mm 断发，其外周有白鞘。应考虑为**白癣**

193、一个 15 个月大的小女孩被父母带来就诊，因为他们想知道她右臀部上的皮损情况。患儿刚出世时，母亲注意到这个皮损小而平，但在过去 6 个月越来越厚。除此以外，患儿很健康。最佳处理方案是**只需观察**

194、糖尿病患者皮肤疾病应慎用的药物有**外用皮炎平霜等含激素软膏**

195、毛囊炎多由**金黄色葡萄球菌**引起

196、儿童白癜风最好选用**外用糖皮质激素**

197、带状疱疹的病原微生物为**水痘-带状疱疹病毒**

198、一老年男性患者，高热后出现反应迟钝，注意力、记忆、理解都有困难，有环境定向障碍，能简单回答问题，但对复杂问题则有些茫然不知所措，吞咽、角膜、对光反射尚存在，这种症状属于**意识混浊**

199、女孩，7 岁，在家中与玩伴玩耍时表现很正常，一个月前她开始上学。只要父母送她去学校后离开，她就会哭，说害怕再也不能见到父母，并且抱怨做噩梦、严重胃痛，因此拒绝回学校。该女孩最可能的诊断是**分离焦虑障碍**

200、一双相障碍躁狂发作患者，当医生问患者年龄时，患者答：“三十三，三月初三生，三月桃花开，开花结果给猴吃，我是属猴的。”这个回答说明患者有**音联意联**症状

201、一位 70 岁的男性患者入院行全髋关节置换术后，夜间出现情绪兴奋和行为紊乱。说房间的地板上有老鼠、有蛇，天花板上有鸟在飞；表情恐惧、紧张，言语令人费解；病人不认得陪护的家属，也不相信自己在医院里；白天则较安静、喜卧床，对夜间行为难以回忆。该病人最可能的诊断是**谵妄**

202、患者在听到脚步的声音的同时听到有人议论他的声音，这种症状属于**功能性幻觉**

203、在缺乏相应客观因素的情况下，患者表现为顾虑重重、紧张恐惧，以致搓手顿足，似有大祸临头，惶惶不可终日，伴有心悸、出汗、手抖、尿频等自主神经功能紊乱症状，这属于**焦虑**

204、电疗的分类是**直流电、低频、中频、高频、静电疗法**

205、康复的手段主要是**功能训练**

206、Rood 技术中具有促进作用的感觉刺激方法为**快速擦刷**

207、手外伤后，应尽可能使手处于功能位。手的功能位是**腕背伸约 $20^{\circ} \sim 25^{\circ}$ ，掌指关节及指间关节微屈**

208、脊髓损伤患者出现损伤平面以下肢体运动障碍和痛温觉丧失，而本体感觉存在，属于**前束综合征**

209、康复评估的特点是**重点是与生活自理、学习、劳动有关的综合功能评估**

210、直流电的烧伤属于**化学烧伤**