

超声波医学（中级）

〔专业代码:346〕

- 1、医学行为是否有利于医学科学发展和揭示人类的生命奥秘是**医德评价的科学标准**
- 2、**纪检监察纠风部门**负责对实施情况进行监督检查
- 3、安全有效属于**药物治疗中的道德要求**
- 4、医务人员医德考评应当认定为较差的情形是**违反医疗服务和药品价格政策，多计费、多收费或者私自收取费用，情节严重的**
- 5、严密观察、精心治疗属于**手术后的道德要求**
- 6、保持镇定、作风严谨属于**手术治疗中的道德要求**
- 7、医师在执业活动中享有的权利是在**执业活动中，人格尊严、人身安全不受侵犯**
- 8、影响医患关系的最次要因素是**患者所在单位的因素**
- 9、医师在执业活动中应履行的义务是**遵守法律、法规，遵守技术规范**
- 10、专属于问诊中的道德要求的是**语言亲切、平易近人**
- 11、医务人员医德考评的首要标准是**救死扶伤，全心全意为人民服务**
- 12、医疗机构从业人员既要遵守本文件所列**基本行为规范**又要遵守与**职业**相对应的分类行为规范。
- 13、医患交往中的治疗方面的关系属于"**医患关系的技术性方面**"
- 14、遵守医学伦理道德,尊重患者的知情**同意权和隐私权**，为患者保守医疗秘密和健康隐私,维护患者合法权益。
- 15、医技人员应合理采集、使用、保护、处置标本不违规**买卖**标本谋取不正当利益。
- 16、医患关系遵循的最重要的道德原则是**医患平等关系**
- 17、在临床诊疗活动中，医务人员收受药品、医用设备、医用耗材等生产、经营企业或经销人员以各种名义给予的财物或提成的，医德考评结果应记为**较差**
- 18、广义的医患关系是指**各类医务人员与患者及其家属的关系**

- 19、医德考评要坚持**实事求是、客观公正**的原则
- 20、专属于体格检查中的道德要求的是**尊重病人、耐心细致**
- 21、组织实施医师资格考试的部门是**省级以上人民政府卫生行政部门**
- 22、临床诊疗工作中最基本的原则是**患者第一**的原则
- 23、“医疗机构不准使用无生产批准文号的自制药品与制剂”属于《**卫生部关于加强卫生行业作风建设的意见**》提出的八项行业纪律之一
- 24、《中华人民共和国执业医师法》明确规定，医师是指**依法取得执业医师资格或者执业助理医师资格，经注册在医疗、预防、保健机构中执业的专业医务人员**
- 25、同情和开导病人属于**心理治疗的道德要求**
- 26、弘扬**高尚医德**，严格自律，不索取和非法收受患者财物不利用执业之便谋取不正当利益
- 27、医患沟通是指**医患之间信息的传递与交流**
- 28、“不索取和非法收受患者财物；不收受医疗器械、药品、试剂等生产、经营企业或人员以各种名义、形式给予的回扣、提成；不违规参与医疗广告宣传和药品医疗器械促销”体现了**廉洁自律，恪守医德**基本行为规范
- 29、医学行为是否有利于病人病情的缓解、治疗和康复是**医德评价的医疗标准**
- 30、医学道德评价的方式有**社会舆论、传统习俗和内心信念**
- 31、医疗机构从业人员分为**6**个类别
- 32、**自觉遵守国家法律法规，遵守医疗卫生行业规章和纪律**不能体现医疗机构从业人员“优质服务、医患和谐”的行为规范
- 33、实验性临床医疗应充分保障**患者本人或其家属**的知情同意权
- 34、医师高度的责任心应贯穿**执业全过程**
- 35、**卫生部、国家食品药品监督管理局、国家中医药管理局**参与组织制定了《医疗机构从业人

员行为规范》

36、医师不仅要关注治疗疾病过程，更应关注患者体验和感受

37、医学道德监督通过法律监督来约束医务人员职业行为

38、超声诊断肝脓肿必须具备的条件是实质内以透声不好囊性为主的病变，后方增强效应明显

39、肝脏弥漫性病变简便而实用的影像学检查方法是超声

40、镶嵌征是原发性肝癌的特征性图像

41、患儿，男，3岁。超声显示肝脏增大，形态失常，右叶可见一14cm×16cm大小的实性强回声团块，边界清楚，内回声不均匀，内可见强光团，后伴声影，最可能的诊断是肝母细胞瘤

42、肝囊性与实性占位性病变声像图的主要鉴别点是病灶内部的回声特点，病灶后方回声是否增强

43、血吸虫性肝硬化是血吸虫侵入肝内门静脉细支，引起栓塞性门静脉炎和门静脉周围炎及纤维化改变，肝表面多呈龟甲状

44、中年男性患者，乙肝病史十余年，超声显示肝实质回声增强，光点粗大，右叶近边缘处实质内有一0.8cm×0.9cm大小的强回声结节，无晕征，无明显包膜，无对周围血管挤压等肿瘤效应，最可能的诊断是肝硬化结节

45、门静脉由肠系膜上静脉和脾静脉汇合而成

46、在急性病毒性肝炎早期，肝实质超声表现为均匀、较正常减弱

47、肝脏横沟的描述正确的是为第一肝门所在

48、由于白血病细胞的异常增生和浸润，常可导致脾大。在脾明显肿大时，可因血管受压和阻塞而引起多发性脾梗死

49、原发性肝癌根据大体形态，通常分为弥漫型、结节型、巨块型

- 50、正常肝脏组织回声特点为**均匀，细小的光点，回声多高于肾皮质回声**
- 51、Glisson 系统的结构有**门静脉、胆管、肝动脉**
- 52、肝大、形态饱满、实质回声增强、光点细密，血管纹理模糊，后方肝组织回声减低。肝门区门静脉旁可见小片状低回声，形态不规则，无包膜，对其旁门静脉无挤压。最可能的诊断是**非均匀性脂肪肝正常肝残留型**
- 53、超声对多发性肝囊肿与 Caroli 病（先天性肝内胆管扩张）鉴别诊断的主要依据在于**囊肿与胆管是否相互连通**
- 54、患者，女性，33 岁，健康体检时于脾门区见一类圆形结节，大小 2.7cm×2.9cm，回声均匀，与脾脏回声相似，边界清楚，其最有可能提示为**副脾**
- 55、脾脏内钙化点多见于**脾结核**
- 56、肝囊肿合并感染时，与**肝脓肿**不易鉴别
- 57、一位青年人无明显不适，体检时，超声发现肝脏内有一个 20mm 的强回声占位性病变，这提示最可能是**肝血管瘤**
- 58、儿童最常见的肝脏恶性肿瘤是**肝母细胞瘤**
- 59、肝脓肿囊壁一般较厚；肝恶性肿瘤坏死、液化，无回声区常位于**强回声肿瘤内**，形态不规则，残留的肿瘤组织似不规则增厚的囊壁，有时液性腔内可见**强回声结节及分隔**
- 60、脾脏恶性肿瘤中以**淋巴瘤**最为常见，大多为全身性淋巴瘤在脾脏的一种表现，而**原发于脾脏的恶性淋巴瘤**较少见
- 61、肝血管瘤边界特征为边缘呈**纤细包膜样强回声**，尤其弱回声肿块常可更清晰显示此特征
- 62、局限性脂肪肝的典型超声表现是**无占位效应的片状细密强光点回声**，内有正常走行的血管
- 63、外科手术患者禁食并给予静脉营养时，胆囊将会产生**病理性扩张**
- 64、关于胃壁的测量，其最内层为强回声，代表**黏膜层回声**

- 65、胃窦肿瘤可导致**胃壁蠕动减弱及梗阻、胃周围淋巴结转移及卵巢、腹膜、肝脏等的转移**
- 66、胆囊未见液腔回声，可探及 6cm×5cm 形态不规则的低回声不均匀实性肿块，内见多发强回声团伴声影，肿块内测得高速动脉样血流信号，肿块与肝床界限不清。最可能的诊断是**实块型胆囊癌**
- 67、一患儿因阵发性腹部剧痛行超声检查，超声示胆总管轻度扩张，内见双线状强回声带，呈弧形，最可能的诊断为**胆道蛔虫**
- 68、肠套叠常见于**回盲部**，有典型的声像图特征，**小儿**多见，临床上常有哭闹、腹痛、**果酱样便**病史
- 69、胆囊窝处探及弧形强回声带，后伴干净的宽声影，未显示胆囊的液性暗腔，最可能的诊断是**胆囊充满型结石**
- 70、十二指肠水平段位于**肠系膜上动脉**后方
- 71、一女性患者因周期性低血糖行超声检查，于胰腺体部探及 17mm 边界清晰，包膜规整的卵圆形均匀性低回声结节，其诊断最可能为**胰岛素瘤**
- 72、成年男性，于急性胰腺炎恢复期做超声检查，于胰腺体尾部探及 11cm×8cm 边界清晰、包膜完整、较薄的囊性病变，最可能的诊断是**胰腺假性囊肿**
- 73、胃泌素瘤的诊断依据为：胰腺内大小不等的**低回声**，边界清晰，内部回声较均匀，血流丰富，有顽固性的**上消化道溃疡病史和高胃泌素血症**
- 74、患者，男性，30 岁，临床拟诊急性胆囊炎，声像图表现的特异性有**胆囊壁增厚合并超声 Murphy 征阳性**
- 75、典型胃平滑肌瘤的声像图特征是**边缘光整的类圆形较均匀低回声肿块**
- 76、一名男童反复发作腹痛两年，右上腹部可触及包块，因近来出现黄疸而就医，超声检查见胆囊缩小，肝内胆管未见明显扩张，于胆总管部位可见 8cm×6cm 椭圆形囊肿，延至胰头，该

囊肿与近端肝管相连，囊壁较厚，最可能的诊断为先天性胆总管囊肿

77、鉴别肝外胆管结石或肿瘤性梗阻，有利于结石诊断的是胆管腔内形态稳定的强回声团，周围包绕细窄的液性暗环

78、经小网膜囊和胃后壁不相邻的脏器是肝脏尾叶

79、成人肠套叠往往继发于肿瘤

80、肠系膜上静脉内探及的是栓子回声，血栓引起肠管缺血、坏死，肠壁黏膜皱襞隆起，肠壁无血流而腹腔可出现血性渗液

81、壶腹癌与胰腺癌鉴别诊断时，壶腹癌一般不会出现异常是胰头发现实性占位

82、一位新生儿生后2个月黄疸不退，超声检查示肝脏回声稍增强，胆囊未见显示，肝内胆管显示不清，胆总管呈索条状稍高回声，最可能的诊断为胆道闭锁

83、随年龄增加，胰腺的声像图改变表现为回声增高，体积缩小

84、患者，男性，69岁，胃肠超声检查于胃壁探及一大大小为11cm×9cm，形态不规则，边界不清的不均匀低回声肿块，中心部可见大片不规则液化坏死区，实性部分血流信号不明显，胃黏膜受侵，超声诊断考虑胃平滑肌肉瘤

85、一急性腹痛的患者，超声检查发现胆囊内多发结石，胰腺弥漫性肿大，回声减弱，不均匀，脾静脉细窄，胰腺周围可见弱回声带，肠管扩张，腹腔见大量透声不好的积液，最可能的诊断为出血坏死型胰腺炎

86、超声显示正常胃壁的层次结构从内至外依次是黏膜层、黏膜肌层、黏膜下层、肌层、浆膜层

87、符合溃疡型胃癌声像图特征的是部分可见"火山口"征

88、患者，男性，57岁，近一个月来纳差、消瘦、腹胀、恶心，今早起因呕吐来急诊。超声检查见胃腔内大量可流动性颗粒物，十二指肠降部以上扩张，降部下方见形态不规则低回声团

块，内部回声不均匀，超声诊断考虑**十二指肠癌**

89、一名 4 岁患儿，因腹痛哭闹不止入院检查，白细胞升高，超声示右下腹一形态不规则、边界模糊的包块，周围见不规则高回声及多发肿大淋巴结，该包块与周围组织粘连，肠间可见透声不好的无回声液性暗区，超声诊断考虑**阑尾周围脓肿**

90、一般说来，肠系膜上动脉与腹主动脉的夹角不超过 30°

91、肾柱肥大在声像图上常误诊为肿瘤，这主要是因为**在肾皮质深入髓质环绕分隔肾锥体的部分异常增大**

92、患者，男性，24 岁，发热 3 天后出现腰痛，尿量明显减少。超声特征：双侧肾脏明显增大，肾实质增厚，回声增高，肾锥体肿大，回声极低，肾窦受压面积缩小。本病可诊断为**急性肾衰竭**

93、肾发育不全与肾萎缩在声像图上最关键的鉴别点是**肾形态正常，实质回声变薄，肾窦回声清晰可见**

94、婴儿型多囊肾为无数微小囊肿，超声下显示不出微小囊肿，或有时可见个别 $1\sim 2\text{cm}$ 的囊肿

95、引起输尿管扩张的最常见原因是**输尿管结石**

96、患者，男性，59 岁，经股动脉逆行冠脉造影术后半小时，突发腹痛，面色苍白，心悸，血压： $70/50\text{mmHg}$ 。超声特征：左后腹膜可见一 $10.8\text{cm}\times 7.6\text{cm}$ 大小、边界清楚、形态欠规则的低回声区，内未见明显血流信号。本病最有可能的诊断是左后腹膜血肿

97、左肾静脉正确的走行位置是位于**腹主动脉与肠系膜上动脉之间**

98、膀胱肿瘤的好发部位是**膀胱三角**

99、膀胱声像图正中矢状断面的重要标志是**膀胱颈部**

100、肾母细胞瘤亦称 Wilms 瘤，多见于 $2\sim 4$ 岁儿童，其特点是瘤体大，生长迅速