

题型:A1 型题

题目:

称为“清虚之脏”的是

选项:

- A.肝
- B.心
- C.脾
- D.肺
- E.肾

答案:D

解析:肺为娇脏, 五脏之华盖, 又称为清虚之脏。

题型:A1 型题

题目:

《素问·金匱真言论》所说“善病风症”的季节是

选项:

- A.春
- B.夏
- C.秋
- D.冬
- E.长夏

答案:C

解析:《素问·金匱真言论》:“春善病鼃衄, 仲夏善病胸胁, 长夏善病洞泄寒中, 秋善病风症, 冬善病痹厥。”

题型:A1 型题

题目:

《灵枢·顺气一日分为四时》“夫百病者, 多以旦慧”, 其原因是

选项:

- A.人气始生, 病气衰
- B.人气长, 长则胜邪
- C.人气始衰, 邪气始生
- D.人气入脏, 邪气独居于身
- E.人气抗邪, 卫外为固

答案:A

解析:中午之前, 人身阳气随自然界阳气的渐生而渐旺, 故病较轻。

题型:A1 型题

题目:

区分五脏、六腑和奇恒之府的最主要依据是

选项:

- A.分布部位的不同
- B.解剖形态的不同
- C.功能特点的不同

D.阴阳属性的不同

E.五行属性的不同

答案:C

解析:五脏的共同生理特点是化生和贮藏精气,六腑的共同生理特点,是受盛和传化水谷,奇恒之腑即是指这一类腑的形态及其生理功能均有异于六腑,不与水谷直接接触,而是一个相对密闭的组织器官,而且还具有类似于脏的贮藏精气的作用,因而称为奇恒之腑。三者最主要的区别是功能不同。

题型:A1 型题

题目:

痰热内闭的目态是

选项:

A.戴眼反折

B.目睛微定

C.昏睡露

D.双睑下垂

E.横目斜视

答案:B

解析:目睛微定又称目睛凝视,指病人两眼固定,不能转动,多属肝风内动之征,或见于脏腑精气耗竭,或痰热内闭证。

题型:A1 型题

题目:

咽喉漫肿,色淡红者的临床意义是

选项:

A.肾火上炎

B.肺胃积热

C.阳虚火浮

D.痰湿凝聚

E.胃火上攻

答案:D

解析:咽部深红,肿痛明显多为肺胃热毒壅盛所致,咽部嫩红肿痛不显属阴虚证多由肾水亏少,阴虚火旺所致,咽喉淡红漫肿多属痰湿凝聚所致。

题型:A1 型题

题目:

舌绛少苔有裂纹,多见于

选项:

A.热邪内盛

B.气血两虚

C.阴虚火旺

D.瘀血内阻

E.脾虚湿侵

答案:A



解析:舌质绛提示热证,苔少提示热盛伤津,裂纹提示精血亏虚或阴津耗损。综上,可辨证为热邪内盛。

题型:A1 型题

题目:

全身性血行瘀滞时,多见的舌象表现是

选项:

- A.全舌青紫
- B.舌有紫色斑点
- C.舌色淡红中泛现青紫
- D.舌色淡紫而湿润
- E.舌色紫红或绛紫而干枯少津

答案:A

解析:A 是全身性血行瘀滞 B 可能是瘀血阻滞于某局部,或失局部血络损伤所致。C 多因肺气壅滞或肝郁血瘀或气虚无力推动血液运行或见于先天性心脏病。D 阴寒内盛阳气被遏血行瘀滞,阳气虚弱气血运行不畅血脉瘀滞所致 E 为热毒炽盛,内入营血,营阴受灼,津液耗损,气血壅滞所致。

题型:A1 型题

题目:

弱脉与濡脉的共同特征是

选项:

- A.沉而无力
- B.浮而无力
- C.脉来空虚无力
- D.细而无力
- E.迟而无力

答案:D

解析:弱脉的脉象特征:沉而细软。濡脉的脉象特征:浮而细软。

题型:A1 型题

题目:

湿热积滞搏结肠腑证代表方剂的组成是

选项:

- A.枳实、生绵纹、山楂、槟榔、厚朴、黄连、神曲、连翘、紫草、木通、生甘草
- B.枳实、生绵纹、山楂、槟榔、厚朴、黄芩、神曲、连翘、紫草、木通、生甘草
- C.枳实、生绵纹、山楂、槟榔、厚朴、黄连、麦芽、连翘、紫草、木通、生甘草
- D.枳实、生绵纹、山楂、槟榔、厚朴、黄连、神曲、金银花、紫草、木通、生甘草
- E.枳实、生绵纹、山楂、槟榔、厚朴、黄连、神曲、连翘、丹皮、木通、生甘草

答案:A

解析:湿热积滞搏结肠腑证代表方剂是枳实导滞汤枳实、生绵纹、山楂、槟榔、厚朴、黄连、神曲、连翘、紫草、木通、生甘草

题型:A1 型题

题目:

下列各项, 不属妊娠绝对禁用的药物是

选项:

- A.麝香
- B.巴豆
- C.大戟
- D.半夏
- E.斑蝥

答案:D

解析:孕妇禁用药物 指毒性较强或药性猛烈的药物, 如巴豆、牵牛子、大戟、商陆、麝香、三棱、莪术、水蛭、斑蝥、雄黄、砒霜等。

题型:A1 型题

题目:

治疗风热郁闭, 咽喉肿痛, 大便秘结者, 应首选的药物是

选项:

- A.薄荷
- B.蝉蜕
- C.菊花
- D.蔓荆子
- E.牛蒡子

答案:E

解析:牛蒡子的功效: 疏散风热, 宣肺祛痰, 利咽透疹, 解毒散肿。

题型:A1 型题

题目:

治疗热病伤津, 烦热口渴, 呕逆时作, 舌燥少津者, 应首选的药物是

选项:

- A.石膏
- B.知母
- C.芦根
- D.天花粉
- E.栀子

答案:C

解析:芦根的功效: 清热泻火, 生津止渴, 除烦, 止呕, 利尿。

题型:A2 型题

题目:

患者, 男, 43岁。口苦, 心烦, 胸闷不舒, 入睡困难, 舌质红, 脉数。用药应首选的是

选项:

- A.栀子、淡豆豉
- B.栀子、芦根
- C.黄连、肉桂
- D.酸枣仁、柏子仁

E.酸枣仁、远志

答案:A

解析:此证是栀子豉汤证口苦,心烦,胸闷不舒,入睡困难,舌质红,脉数用栀子和淡豆豉清热除烦。

题型:A2 型题

题目:

患者胁肋胀痛,常因情志变动而痛有增减,胸闷不舒,暖气吞酸。饮食减少。舌红苔薄黄。脉弦数。治疗应选用

选项:

- A.川楝子
- B.陈皮
- C.木香
- D.佛手
- E.枳实

答案:D

解析:患者肝郁不舒,则会出现“胁肋胀痛,常因情志变动而痛有增减,胸闷不舒”,木克脾土,则会出现“暖气吞酸”,治宜疏肝与和胃同用。选项D佛手疏肝解郁,理气和中,燥湿化痰。故选D。川楝子行气止痛,杀虫,更适用于肝郁化火。橘皮理气健脾,燥湿化痰。木香行气止痛,健脾消食。枳实破气除痞,化痰消积。

题型:A2 型题

题目:

患者小便短数,灼热刺痛。尿色黄赤,舌苔黄腻,脉数。治疗应选用

选项:

- A.大蓟
- B.地榆
- C.槐花
- D.白茅根
- E.侧柏叶

答案:D

解析:患者“小便短数,灼热刺痛,尿色黄赤”,治宜清热利尿。白茅根凉血止血,清热利尿,清肺胃热。故选D。大蓟凉血止血,散瘀解毒消痈。地榆凉血止血,解毒敛疮。槐花凉血止血,清肝泻火。侧柏叶凉血止血

题型:A2 型题

题目:

患者经期小腹胀痛拒按,胸胁乳房胀痛,经行不畅。月经色紫暗、有块。舌质紫暗,脉弦。治疗应选用

选项:

- A.肉桂
- B.艾叶
- C.牡丹皮
- D.川芎

E.青皮

答案:D

解析:血瘀经行不畅,此五个选项中,川芎为妇科要药,善治血瘀气滞痛证,活血调经,其余选项均无调经之功效。故选D。

题型:A2型题

题目:

患者,男,70岁。喘促气短,声低气怯,咳声低弱,咳痰稀白,自汗畏风,舌淡红,苔薄白,脉弱无力。其治疗应首选的方剂是

选项:

- A.三子养亲汤合二陈汤
- B.生脉散合补肺汤
- C.七味都气丸合生脉散
- D.参蛤散合金匱肾气丸
- E.苏子降气汤合二陈汤

答案:B

解析:虚喘之肺气虚耗证,治宜益气补肺,用生脉散合补肺汤。痰浊阻肺用三子养亲汤合二陈汤。肾阴虚用七味都气丸合生脉散。肾气虚用参蛤散合金匱肾气丸。上实下虚用苏子降气汤合二陈汤。

题型:A2型题

题目:

患者,男,60岁,胸闷疼痛,痰多气短,肢体沉重,形体肥胖,倦怠乏力,纳呆便溏,苔白腻,脉滑。治疗应首选

选项:

- A.瓜蒌薤白半夏汤合涤痰汤
- B.枳实薤白桂枝汤
- C.血府逐瘀汤
- D.瓜蒌薤白酒汤
- E.柴胡疏肝散

答案:A

解析:胸痹痰浊内阻证,治宜通阳泄浊,豁痰开结,用瓜蒌薤白半夏汤辛温通阳散结,合涤痰汤化痰。B、D偏于通阳,化痰不足;C活血化瘀,用于心阳瘀阻;E用于气滞重者。故选A。

题型:A2型题

题目:

患者,女,50岁。既往有胃病20余年。每次均因饮食不慎,出现呕吐,时作时止,倦怠乏力,口干不欲饮,四肢不温,大便溏薄,舌质淡,脉濡弱。治疗宜选用的方剂是

选项:

- A.理中丸
- B.小半夏汤
- C.苓桂术甘汤
- D.大半夏汤

E.藿香正气散

答案:A

解析:因饮食不慎,出现呕吐,时作时止,倦怠乏力,口干不欲饮,四肢不温,大便溏薄,辨证为脾胃阳虚证,治宜温中健脾,和胃降逆,方用理中汤加减。

题型:A2 型题

题目:

患者,男,32岁。皮肤出现青紫斑点5日,伴有鼻衄,口渴,便秘,舌质红,苔黄,脉弦数。治疗本病应首选的方剂是

选项:

- A.泻白散
- B.十灰散
- C.茜根散
- D.归脾汤
- E.黄土汤

答案:B

解析:紫斑之血热妄行证的主症:皮肤出现青紫斑点或斑块,或伴有鼻衄、齿衄,便血、尿血,或有发热,口渴,便秘,舌质红,苔黄,脉弦数。治宜清热解毒,凉血止血,方用十灰散加减。

题型:A2 型题

题目:

黄疸患者,身目俱黄,黄色鲜明,恶心欲吐,发热恶寒,无汗身痛,小便短赤,舌苔薄黄腻,脉弦滑。治疗应首选

选项:

- A.大柴胡汤
- B.小柴胡汤
- C.麻黄连翘赤小豆汤
- D.茵陈蒿汤
- E.犀角散

答案:C

解析:黄色鲜明为阳黄,恶心欲吐,发热恶寒,无汗身痛,为湿热壅阻于表,气机不畅,脾运失职。故为湿热兼表证,用清热利湿,加重宣散化湿的力量,用麻黄连翘赤小豆汤。故选C。茵陈蒿汤用于热重于湿无表证者;犀角散用于急黄热毒入血证。

题型:A1 型题

题目:

有头疽切开引流常作

选项:

- A.对口引流
- B.一字形切口
- C.十字形切口
- D.梭形切口
- E.S形切口

答案:C

解析:有头疽的外治方法。有头疽的酿脓期,若疮肿有波动感,采用手术扩创排毒,作“+”或“++”字形切开。

题型:A1 型题

题目:

下列各项中不属于疔的疾病是

选项:

- A.颈疔
- B.脐疔
- C.腋疔
- D.锁喉疔
- E.委中毒

答案:D

解析:颈疔、脐疔、腋疔、委中毒均属于疔的范畴,而锁喉疔属于发的范

题型:A2 型题

题目:

患者,女,28岁。产后乳房胀痛,位于乳房外上方皮肤焮红,肿块形似鸡卵,压痛明显,按之中软,有波动感,伴壮热口渴。切开引流的部位及切口是

选项:

- A.循乳络方向做放射状切口
- B.乳晕旁弧形切口
- C.脓肿处做任意切口
- D.以乳头为中心的弧形切口
- E.脓肿波动明显处做切口

答案:A

解析:一般采用与乳头方向呈放射状的切口,切口位置选择脓肿稍低的部位,切口长度与脓腔基底的大小一致,使引流通畅不致袋脓,但需避免手术损伤乳络形成乳痿。因为乳腺每一腺叶有单独的腺管(乳管),呈放射状聚向乳头,并分别开口于乳头

题型:A2 型题

题目:

患者,男,65岁。因感冒伴发口唇成群小水疱,破溃后呈糜烂与结痂,自觉瘙痒,灼热。其治法是

选项:

- A.内服黄连解毒汤
- B.内服普济消毒饮
- C.内服五味消毒饮
- D.外搽青吹口油膏
- E.外搽白玉膏

答案:D

解析:本病好发于皮肤黏膜交界处,如口角、唇缘、鼻孔周围和外生殖器等处,若发生在口腔、咽部、眼结膜等处,称黏膜热疮;发生于外生殖器部位,称阴部热疮。皮损以糜烂、结

痂为主，若向愈时，以紫金锭磨水，或青吹口油膏、黄连膏等外搽，内服辛夷清肺饮加减

题型:A2 型题

题目:

患者，男，18岁。双手背起结节2年，如豆般大，坚硬粗糙，表面蓬松枯槁，色黄，皮损范围有扩大趋势，无任何不适，舌红苔薄，脉弦数。诊断为

选项:

- A.扁瘡
- B.跖疣
- C.鼠乳
- D.疣目
- E.丝状疣

答案:D

解析:疣是一种发于皮肤浅表的良性赘生物。因其皮损形态及发病部位不同而名称各异，如发于手背、手指、头皮等处者，称疣目。

题型:A2 型题

题目:

患者，女，18岁。两小腿皮肤炎症在急性阶段，大量渗液且红肿。外治剂宜用

选项:

- A.洗剂
- B.粉剂
- C.溶液湿敷
- D.油剂
- E.软膏

答案:C

解析:皮损以糜烂、渗液为主者应予溶液湿敷。皮损以糜烂、渗液为主者，选用绿茶、马齿苋、黄柏、羊蹄草、石韦、蒲公英、桑叶等；煎水湿敷，或以10%黄柏溶液湿敷。第十一节接触性皮炎

题型:A1 型题

题目:

以下哪一项为淋病的临床特点

选项:

- A.龟头红肿，包皮内有多量脓性分泌物
- B.外生殖器有多个痛性溃疡，表面有脓性分泌物，尿道口红肿
- C.尿道分泌物少，为黏液状
- D.尿道口刺痛，尿道口排出脓性分泌物
- E.外生殖器多为单个无痛性溃疡

答案:D

解析:本病患者在排尿开始时尿道外口刺痛或灼热痛，排尿后疼痛减轻。尿道口溢脓，开始为浆液性分泌物，以后逐渐出现黄色黏稠的脓性分泌物

题型:A1 型题

题目:

石瘕的病因病理是

选项:

- A.肝郁胃热，挟痰上壅，气血凝滞，郁滞结喉
- B.情志内伤，肝脾气逆，气血湿痰，凝滞结喉
- C.肝肾不足，肾火郁结，挟痰上攻，凝滞结喉
- D.脾肾阳虚，脾虚不运，津液留聚，凝结颈部
- E.肺脾两亏，津液不布，留聚成痰，凝结颈部

答案:B

石瘕:是由情志所伤，肝脾气逆，痰浊内生，气滞则血瘀，痰瘀互结。

题型:A1 型题

题目:

《妇人大全良方》的作者是

选项:

- A.薛己
- B.陈自明
- C.赵献可
- D.陈修园
- E.张介宾

答案:B

解析:《妇人大全良方》又名《妇人良方》《妇人良方大全》《妇人良方集要》，为宋代陈自明所著。成书于 1237 年。

题型:A1 型题

题目:

下列各项中不属于中药离子导入法治疗范围的是

选项:

- A.子宫肌瘤
- B.慢性盆腔炎
- C.子宫内膜异位症
- D.陈旧性宫外孕
- E.外阴炎

答案:A

解析:中药离子导入是通过直流电场经皮肤黏膜导入。主要适用于慢性盆腔炎、输卵管阻塞、术后盆腔粘连等。

题型:A1 型题

题目:

月经后期，量少，色黯红有块，小腹胀痛者。应选用

选项:

- A.乌药汤
- B.丹栀逍遥散
- C.调肝汤

D.逍遥散

E.柴胡疏肝散

答案:A

解析:月经周期延后,量少,色黯红,小腹胀痛,是属于月经后期气滞证,其代表方剂是乌药汤

题型:A2 型题

题目:

患者,女,45岁。月经不规律8个月,现阴道出血40天,量时多时少,近3天量极多、色淡、质稀,伴气短神疲,面浮肢肿,舌淡苔薄白,脉缓弱。治疗应首选的方剂是

选项:

A.举元煎

B.补中益气汤

C.固本止崩汤

D.清热固经汤

E.保阴煎

答案:C

解析:月经不规律8个月,现阴道出血40天,量时多时少,辨病为崩漏。由近3天量极多、色淡、质稀,伴气短神疲,面浮肢肿,舌淡苔薄白,脉缓弱,辨证为脾虚证

题型:A2 型题

题目:

患者,女,27岁。带下过少,阴中干涩,头晕,心悸失眠,神疲乏力,经行腹痛,舌质暗淡,边有瘀斑,脉细涩。治疗应首选的方剂是

选项:

A.血府逐瘀汤

B.左归丸加知母、肉苁蓉、紫河车、麦冬

C.少府逐瘀汤

D.小营煎加丹参、桃仁、牛膝

E.左归饮加三棱、莪术

答案:D

解析:带下过少,阴中干涩为精血不足且不循常道,瘀阻血脉,阴津不得敷布所致。头晕眼花为血虚不能上荣于头面。心悸失眠为血虚心失所养。神疲乏力为血虚气弱。经行腹痛是瘀血内阻,气机不畅导致。舌质暗淡,边有瘀斑,脉细涩均为血枯瘀阻之征。所以根据本题的临床表现辨证为血枯瘀阻证带下过少,方选小营煎加丹参、桃仁、牛膝。

题型:A1 型题

题目:

下列各项,不属于宫外孕手术适应证的是

选项:

A.输卵管间质部妊娠

B.残角子宫妊娠

C.妊娠试验持续阳性,包块继续长大

D.输卵管破损时间较长,形成血肿包块

E.愿意同时施行绝育术者

答案:D

解析:宫外孕手术适应证有输卵管间质部妊娠、残角子宫妊娠、妊娠试验持续阳性,包块继续长大、愿意同时施行绝育术者、随诊不可靠者、期待疗法或药物疗法禁忌证者。

题型:A1 型题

题目:

妊娠 5~6 月后,下列哪一项应诊断为子满

选项:

- A.两脚浮肿,按之凹陷,小便短少
- B.两脚浮肿,皮色不变,小便如常
- C.自膝至脚肿,皮色不变,小便如常
- D.腹大异常,胸膈满闷,甚则遍身俱肿,喘息不得卧者
- E.头面遍身浮肿,皮薄而光亮,小便短少

答案:D

解析:妊娠 5~6 月后出现腹大异常,胸膈满闷,甚则遍身俱肿,喘息不得卧者,称“子满”,又称“胎水肿满”。

题型:A2 型题

题目:

患者,女,23 岁。产后乳汁正常,与家人生气后,乳汁骤减,乳汁稠,乳房胀硬而痛,精神抑郁,胸胁胀痛,食欲减退,舌暗红,苔薄黄,脉弦数。治疗应首选的方剂是

选项:

- A.通乳丹
- B.下乳涌泉散
- C.漏芦散
- D.逍遥散
- E.龙胆泻肝汤

答案:B

解析:产后乳汁骤减属缺乳,乳房胀硬而痛,胸胁胀痛均为肝经郁滞表现,伴随症状、舌脉,属肝郁气滞证。治疗应首选下乳涌泉散。

题型:A2 型题

题目:

患者,女,42 岁。带下量多、色黄或白、质黏稠、有臭气,小腹作痛,或阴痒,便秘溺赤,舌红苔黄厚腻,脉滑数。治疗应首选的方剂是 D

选项:

- A.五味消毒饮
- B.龙胆泻肝汤
- C.草薢渗湿汤
- D.止带方
- E.易黄汤

答案:D

解析:带下过多湿热下注证制宜清利湿热,佐以解毒杀虫,用止带汤加减

题型:A1 型题

题目:

4 周岁小儿的身长应为

选项:

A.90 cm

B.98 cm

C.100 cm

D.105 cm

E.110 cm

答案:B

解析:2 岁至 12 岁儿童的身高(长)可以用以下公式计算:身高(cm)=70+7×年

题型:A1 型题

题目:

小儿汗证常见于哪个时期的小儿

选项:

A.6 月以内的婴儿

B.5 岁以内的小儿

C.3 岁以内的小儿

D.1 岁以内的小儿

E.10 岁以内的小儿

答案:B

解析:汗证是指小儿在安静状态下,正常环境中,全身或局部出汗过多甚则大汗淋漓的一种病证。多见于 5 岁以内的小儿

题型:A1 型题

题目:

急性肾小球肾炎发病前有哪些前驱感染史

选项:

A.病毒感染

B.链球菌感染

C.金葡菌感染

D.支原体感染

E.原虫感染

答案:B

解析:本病在发病前 1~4 周多有呼吸道或皮肤感染、猩红热等链球菌感染病史或其他急性感染史

题型:A1 型题

题目:

病后常易并发心悸、水肿、痹证的是

选项:

A.麻疹

- B.风疹
- C.水痘
- D.猩红热
- E.幼儿急疹

答案:D

解析:猩红热在发展过程中或恢复期,因邪毒炽盛,伤于心络,耗损气阴,心失所养,心阳失主,则可导致心悸、脉结代等证候。余邪热毒流窜经络筋肉,关节不利,则导致关节红肿热痛的痹证。余邪内归,损伤肺、脾、肾,导致三焦水液输化通调失职,水湿内停,外溢肌肤,则可见水肿、小便不利等证候。

题型:A1 型题

题目:

顿咳最易发病的年龄是

选项:

- A.1 岁以下
- B.3 岁以下
- C.2 岁以下
- D.5 岁以下
- E.5 岁以上

答案:D

解析:5 岁以下婴幼儿最易发病,年龄越小,病情大多愈重,10 岁以上儿童较少发病。

题型:A1 型题

题目:

6~24 个月正常小儿的乳牙数的推算公式是

选项:

- A.月龄-4 (或 6)
- B.月龄-3 (或 6)
- C.月龄-2 (或 6)
- D.月龄-1 (或 6)
- E.月龄-5 (或 6)

答案:A

解析:生后 4~10 个月乳牙开始萌出,在 2~2.5 岁出齐,出齐为 20 颗。2 岁以内乳牙颗数的推算公式为乳牙数=月龄-4 (或 6)。

题型:A1 型题

题目:

治疗急性胃痛应首选的腧穴是

选项:

- A.梁门
- B.梁丘
- C.内庭
- D.上巨虚
- E.下巨虚

答案:B

解析:郄穴的临床应用。阳经的郄穴治疗痛证, 阴经的郄穴治疗血病。故急性胃痛应该选择胃经的郄穴梁丘。

题型:A1 型题

题目:

下列哪组腧穴被称为“四关”穴

选项:

- A.内关、外关
- B.合谷、太冲
- C.曲池、足三里
- D.外关、阳陵泉
- E.尺泽、委中

答案:B

解析:四关穴即合谷、太冲穴的总称。合谷穴是手阳明大肠经的原穴, 四总穴之一。位于第一、二掌骨之间, 也就是俗称的“虎口”。太冲穴是足厥阴肝经的输穴和原穴。位于足背第一、二跖骨之间。合谷穴与太冲穴都是人体的重要保健穴位, 两穴合称为“四关穴”, 是人体生命的关口。

题型:A1 型题

题目:

下列荥穴中, 穴性属火的是

选项:

- A.二间
- B.前谷
- C.侠溪
- D.鱼际
- E.内庭

答案:D

解析:根据“阳井金阴经木”, 荥水穴应为阳经的荥穴。荥穴位于掌指关节或跖趾关节前的部位。鱼际为阴经的荥穴, 为荥火穴。

题型:A1 型题

题目:

八脉交会穴中通于阴维脉的是

选项:

- A.列缺
- B.内关
- C.照海
- D.公孙
- E.大陵

答案:B

解析:公孙冲脉胃心胸, 内关阴维下总同, 临泣胆经连带脉, 阳维目锐外关逢。后溪督脉内毗颈, 申脉阳跷络亦通, 列缺任脉行肺系, 阴跷照海膈喉咙

题型:A1 型题

题目:

善治水湿病证的腧穴是

选项:

- A.隐白
- B.公孙
- C.地机
- D.三阴交
- E.阴陵泉

答案:E

解析:隐白善治慢性出血的崩漏,公孙治疗脾胃病和奔豚气,地机善治痛经,三阴交善治妇科病、阴虚诸证,阴陵泉善利水湿。

题型:A1 型题

题目:

治疗急性吐泻有速效的腧穴是

选项:

- A.委阳
- B.委中
- C.承山
- D.飞扬
- E.昆仑

答案:B

解析:委阳主治腰腿痛,委中主治腰背痛、急性吐泻、瘾疹、丹毒等症,承山主治腰腿痛、痔疮等,飞扬主治腰腿痛、头目病等,昆仑主治头痛、牙痛、癫痫等。

题型:A1 型题

题目:

用于治疗心痛、心悸、呕血、咯血、疗疮的腧穴是

- A.内关
- B.孔最
- C.间使
- D.外关
- E.郄门

答案:E

解析:内关主治心系、胃腑疾病、神志病、中风等疾患。孔最治疗肺系疾患。间使治疗心系疾患、神志病、胃腑疾患等症。外关治疗头面五官疾患、热病等症。郄门为心包的郄穴,主治心系疾患、呕血咯血、疗疮、癫痫等病。

题型:A1 型题

题目:

下列哪项属于非感染性发热的疾病

选项:

- A.肺结核
- B.肺炎
- C.急性肾盂肾炎
- D.伤寒
- E.血清病

答案:E

解析:非感染性发热见于多种不同的疾病:①无菌性坏死物质吸收。②抗原-抗体反应:如血清病等。③内分泌与代谢障碍。④皮肤散热减少。⑤体温调节中枢功能失常。⑥自主神经功能紊乱。

题型:A1 型题

题目:

克雷伯杆菌肺炎的痰液特征是

选项:

- A.粉红色泡沫样痰
- B.铁锈色痰
- C.棕褐色痰
- D.砖红色胶冻样痰
- E.灰黄色痰

答案:D

解析:急性肺水肿咯粉红色泡沫样痰,大叶性肺炎咯铁锈色痰,铜绿假单胞菌感染咯黄绿色痰;克雷伯杆菌感染咯砖红色胶冻样痰。

题型:A1 型题

题目:

咯血伴皮肤黏膜出血的疾病

选项:

- A.钩端螺旋体病
- B.肺癌
- C.肺炎
- D.肺吸虫病
- E.鼻咽癌

答案:A

解析:咯血伴皮肤黏膜出血应考虑为钩端螺旋体病、流行性出血热、血液病。

题型:A2 型题

题目:

患者,57岁。皮肤、巩膜黄染呈进行性加重,大便持续变白,病后消瘦明显,应首先考虑的是

选项:

- A.急性病毒性肝炎
- B.肝硬化
- C.胆囊炎
- D.胰头癌
- E.胆总管结石



答案:D

解析:黄疸是胰头癌较早出现的症状之一。黄疸伴有进行性消瘦的应考虑肝癌、胰头癌、胆总管癌、壶腹癌等。

题型:A1 型题

题目:

心尖搏动增强可见于

选项:

- A.心包积液
- B.重症贫血
- C.心肌炎
- D.气胸
- E.肺气肿

答案:B

解析:心尖搏动增强可见于左心室肥大、甲亢、重症贫血及发热等疾病。

题型:A1 型题

题目:

下列不属于脑膜刺激征疾病的是

选项:

- A.颈椎病
- B.蛛网膜下腔出血
- C.坐骨神经痛
- D.腰骶神经根炎
- E.急性脑血管病

答案:E

解析:脑膜刺激征见于脑膜炎、蛛网膜下腔出血、脑脊液压力增高;颈强直也可见于颈椎病、颈部肌肉病变。凯尔尼格征也可见于坐骨神经痛、腰骶神经根炎等。

题型:A1 型题

题目:

下列不属于血浆纤维蛋白原(Fg)增高的临床意义的是

选项:

- A.糖尿病
- B.肝硬化
- C.急性心肌梗死
- D.恶性肿瘤
- E.急性感染

答案:B

解析:血浆纤维蛋白原测定临床意义:①增高:见于糖尿病、急性心肌梗死、急性肾炎、多发性骨髓瘤、休克、大手术后、急性感染、妊娠高血压综合征、恶性肿瘤及血栓前状态等。

②减低:见于DIC、原发性纤溶症、重症肝炎和肝硬化等

题型:A1 型题

题目:

下列除哪项外,均可引起血清钾增高

选项:

- A.严重溶血
- B.静脉滴注大量钾盐
- C.急慢性肾衰竭
- D.代谢性酸中毒
- E.代谢性碱中毒

答案:E

解析:血清钾增高见于:①肾脏排钾减少,如急、慢性肾功能不全及肾上腺皮质功能减退等。②摄入或注射大量钾盐,超过肾脏排钾能力。③严重溶血或组织损伤,红细胞或组织的钾大量释放入细胞外液。④组织缺氧或代谢性酸中毒时大量细胞内的钾转移至细胞外。

题型:A1 型题

题目:

总补体溶血活性测定增高见于

选项:

- A.恶性肿瘤
- B.血清病
- C.肾小球肾炎
- D.自身免疫性溶血性贫血
- E.系统性红斑狼疮

答案:A

解析:总补体溶血活性测定增高:见于各种急性炎症、组织损伤和某些恶性肿瘤等;总补体溶血活性测定减低:见于补体成分大量消耗,如血清病、链球菌感染后肾小球肾炎、系统性红斑狼疮、自身免疫性溶血性贫血、类风湿关节炎及同种异体移植排斥反应等。

题型:A1 型题

题目:

下列各项属于漏出液的是

选项:

- A.外观呈血性
- B.比重>1.018
- C.能自凝
- D.白细胞计数 $>0.5 \times 10^9/L$
- E.无病原菌

答案:E

解析:漏出液主要特征为:淡黄透明或微混,比重低于 1.018,不能自凝蛋白定性阴性,定量 $<25 g/L$ ,糖正常,细胞数 $<100 \times 10^6/L$ ,分类以淋巴细胞、间皮细胞为主,细菌检查阴性。

题型:A1 型题

题目:

Q-T 间期缩短见于

选项:

- A.高血钙
- B.心室肥大
- C.心肌炎
- D.心室内传导阻滞
- E.心肌缺血

答案:A

解析:Q-T 间期延长见于心肌损害、心肌缺血、心室肥大、心室内传导阻滞、心肌炎、心肌病、低血钙、低血钾、Q-T 间期延长综合征以及药物（如奎尼丁、胺碘酮）作用等；Q-T 间期缩短见于高血钙、高血钾、洋地黄效应。

题型:A1 型题

题目:

下列各项，可出现脉压减小的是

选项:

- A.主动脉瓣关闭不全
- B.甲状腺功能亢进症
- C.动脉导管未闭
- D.缩窄性心包炎
- E.严重贫血

答案:D

解析:脉压 $<30\text{ mmHg}$ 称为脉压减小，见于主动脉瓣狭窄、心力衰竭、休克、心包积液、缩窄性心包炎等。A、B、C、E均见于脉压增大。所以本题选D。

题型:A1 型题

题目:

患者，男，61岁。有慢性支气管炎及肺心病病史。近7天感冒后出现咳嗽，吐黄痰，心悸气短加重，神志清，血气分析在正常范围。下列哪项治疗是错误的

选项:

- A.抗感染
- B.止咳
- C.祛痰
- D.呼吸兴奋剂
- E.氨茶碱

答案:D

解析:该患者处于急性加重期，A、B、C、E有助于去除诱因、增加血氧饱和度。急性加重期的治疗原则为积极控制感染(首选)，通畅呼吸道和改善呼吸功能，纠正缺氧和二氧化碳潴留，控制呼吸和心力衰竭。呼吸兴奋剂适用于呼吸浅表、意识模糊而呼吸道通畅的呼衰患者，本例患者血气分析正常，无呼衰。

题型:A1 型题

题目:

右心衰竭时典型的体征是

选项:

- A.呼吸困难
- B.咳嗽
- C.咯血

D.肝颈静脉回流征阳性

E.紫绀

答案:D

解析:右心衰竭的体征:肝颈静脉回流征阳性,颈静脉充盈或怒张,下垂性对称性水肿(双下肢)。右心奔马律(胸骨左缘第3、4肋间闻及舒张期奔马律),紫绀等。

题型:A2型题

题目:

患者,男,50岁。风湿性心脏病6年。平时一般活动症状不多,2天来明显心悸,稍事活动即感气短,不能平卧。心电图示心房颤动,心室律完全不齐,138次/分。拟即刻静脉给药,应给予下列哪一种药物

选项:

A.利多卡因

B.维拉帕米

C.毛花苷C

D.普萘洛尔

E.速尿

答案:C

解析:毛花苷C适用于急性心力衰竭或慢性心衰加重时,特别适用于心力衰竭伴快速心房颤动者。

题型:A1型题

题目:

房性和房室交界性过早搏动不宜选用的药物是

选项:

A. I类

B. II类

C. III类

D. IV类

E. Ia类

答案:C

解析:应用抗心律失常药物:①房性和房室交界性过早搏动可选用Ia类、Ic类、II类和IV类抗心律失常药。②室性过早搏动多选用I类和III类药。③洋地黄中毒所致的室性早搏,应立即停用洋地黄,给予苯妥英钠或氯化钾等治疗。

题型:A2型题

题目:

患者,43岁。节律性上腹痛、恶心、呕吐、反酸。胃镜检查诊断为胃溃疡。其溃疡多发生在

选项:

A.胃小弯

B.胃窦

C.胃底

D.胃体



E.胃和十二指肠

答案:A

解析:十二指肠溃疡多发生在球部,前壁比较常见。胃溃疡多在胃小弯。

题型:A1 型题

题目:

小肝癌是指

选项:

A.肝脏单个癌结节直径<1 cm,或2个癌结节直径<1 cm

B.肝脏单个癌结节直径<2 cm,或2个癌结节直径<2 cm

C.肝脏单个癌结节直径<3 cm,或2个癌结节直径<3 cm

D.肝脏单个癌结节直径<4 cm,或2个癌结节直径<4 cm

E.肝脏单个癌结节直径<5 cm,或2个癌结节直径<5 cm

答案:C

解析:孤立的直径<3 cm的癌结节,或相邻两个癌结节直径之和<3 cm者,称为小肝癌。

题型:A1 型题

题目:

下列哪项是慢性肾炎普通型的表现

选项:

A.中等程度蛋白尿

B.高度水肿

C.大量蛋白尿

D.血脂升高

E.血浆白蛋白降低

答案:A

解析:慢性肾炎分为普通型、高血压型、急性发作型。普通型患者有持续性中等程度的蛋白尿,或有血尿,轻微水肿或轻度高血压。故选 A。

题型:A1 型题

题目:

患者巨大脾脏,白细胞计数显著增高,可达  $500 \times 10^9 / L$ ,并见少许各种幼稚粒细胞,血小板计数极度增多。治疗应首选

选项:

A.VP 方案

B.HOAP 方案

C.雄性激素

D.马利兰

E.强的松

答案:D

解析:从病例描述可知该患者为慢性粒细胞性白血病,治疗可采用 HOAP 方案及马利兰,但本例中患者血小板计数极度增多,马利兰尤其可用于血小板极度增多的病例,故选 D。

题型:A2 型题

题目:

甲亢患者, 给予他巴唑 20mg。一日 3 次。在家中治疗。半月后应到医院复查

选项:

- A. 心率、心律
- B. 心电图
- C. 甲状腺大小
- D. 白细胞计数
- E. 突眼程度

答案:D

解析:他巴唑治疗甲状腺功能亢进症的重要副作用为粒细胞减少, 往往发生突然且为致命性。可见于初始用药 2~3 个月之内或减量过程中, 故选 D。

题型:A1 型题

题目:

完全性脑卒中发病后病情达到高峰的时间一般是

选项:

- A. <2 小时
- B. <6 小时
- C. <12 小时
- D. <24 小时
- E. <36 小时

答案:B

解析:完全性脑卒中, 发病后神经功能缺失症状较重较完全, 常有完全性瘫痪及昏迷, 于数小时内(<6 小时)达到高峰。

题型:A2 型题

题目:

男, 37 岁, 突起昏迷, 四肢瘫痪, 双侧瞳孔"针尖样"缩小。其最可能的疾病是

选项:

- A. 额叶出血
- B. 脑桥出血
- C. 小脑出血
- D. 基底核出血
- E. 蛛网膜下腔出血

答案:B

解析:脑桥出血 一侧脑桥少量出血, 表现为交叉性瘫痪, 两眼向病灶侧凝视麻痹。但多数累及两侧脑桥, 出血破入第四脑室, 迅速出现深度昏迷、双侧瞳孔针尖样缩小、四肢瘫痪和中枢性高热的特征性体征, 并出现中枢性呼吸障碍和去脑强直, 多于数天内死亡。

题型:A2 型题

题目:

患者, 男, 65 岁。高血压病史 20 年, 近日突然意识丧失, 深度昏迷, 出现三偏征, 伴有高热与呕血。应首先考虑的是

选项:

- A.内囊-基底节出血(外侧型)
- B.内囊-基底节出血(内侧型)
- C.桥脑出血
- D.小脑出血
- E.蛛网膜下腔出血

答案:B

解析:三偏征(偏瘫、偏盲、偏身感觉障碍)最常见于高血压病引起的内囊-基底节出血, C 表现为交叉性麻痹和感觉障碍、眼球运动障碍, D 为眩晕、眼球震颤、共济失调, E 可有脑膜刺激征。故选 B。内囊外侧型出血多由豆纹动脉外侧枝破裂引起。血肿向内压迫内囊导致典型的对侧偏瘫和偏身感觉障碍, 如为优势半球可有失语; 如扩展至额、颞叶或破入脑室可致颅高压、昏迷。内囊内侧型出血典型症状以偏身感觉障碍起病, 向外压迫内囊可致偏瘫; 向内破入脑室或蔓延至中脑, 引起垂直注视麻痹、瞳孔改变、昏迷。预后比壳核出血差。

题型:A1 型题

题目:

口服中毒的患者, 中毒时间较长超过 6 小时应用下列哪种治疗措施

选项:

- A.催吐
- B.洗胃
- C.导泻
- D.灌肠
- E.吸氧

答案:D

解析:灌肠用于中毒时间较长>6 小时的患者; 常用微温肥皂水高位连续灌肠。

题型:A1 型题

题目:

下列各项中属乙类传染病的是

选项:

- A.霍乱
- B.鼠疫
- C.传染性非典型肺炎
- D.风疹
- E.流行性感

答案:C

解析:根据中华人民共和国传染病防治法及其实施细则, 将法定传染病分为三类: 甲类、乙类和丙类。其中, 鼠疫和霍乱属于甲类, 风疹和流行性感属于丙类, 2003 年 4 月卫生部通知, 将传染性非典型肺炎列入法定传染病管理, 按乙类传染病管理。故选 C。

题型:A1 型题

题目:

甲类传染病是指

选项:

- A.SARS、狂犬病

- B.黑热病、炭疽
- C.高致病性禽流感、传染性非典型肺炎(SARS)
- D.鼠疫、霍乱
- E.伤寒、流行性出血热

答案:D

解析:甲类传染病:鼠疫、霍乱乙类传染病:传染性非典型肺炎(SARS)、艾滋病、病毒性肝炎、脊髓灰质炎、狂犬病等;丙类传染病:流行性感冒、流行性腮腺炎、风疹、麻风病、伤寒和副伤寒等。故选 D。SARS、狂犬病、炭疽、流行性出血热和高致病性禽流感均属于乙类传染病。故 A、B、C 和 E 均错误。

题型:A1 型题

题目:

甲型肝炎病毒的主要传播途径是

选项:

- A.血液及血制品
- B.垂直传播
- C.媒介生物
- D.粪-口途径
- E.呼吸道

答案:D

解析:甲型肝炎病毒的主要传播途径是粪-口途径。

题型:A1 型题

题目:

下列哪项是乙肝病毒(HBV)复制指标

选项:

- A.抗-HBe
- B.HBsAg
- C.抗-HBs
- D.HBeAg
- E.抗-HBc

答案:D

解析:HBeAg 与病毒 HBV DNA 密切相关,是 HBV 活动性复制和有传染性的重要标志,因此乙肝病毒复制的指标是 HBeAg。而抗-HBe、抗-HBs、抗-HBc 均为抗体,不能代表病毒复制,HBsAg 本身无传染性,仅作为 HBV 存在的间接指标,也不代表病毒复制。

题型:A1 型题

题目:

指出下列哪种是戊型肝炎病毒的主要传播途径

选项:

- A.注射、输血
- B.蚊虫叮咬传播
- C.垂直传播
- D.唾液传播



E.粪-口传播

答案:E

解析:戊型肝炎病毒与甲型肝炎病毒一样,粪-口传播是其主要传播途径,特别是饮用水污染可引起戊型肝炎病毒暴发流行。其他途径均不是戊型肝炎病毒的传播途径。

题型:A1 型题

题目:

诊断重型病毒性肝炎,下列指标最有意义的是

选项:

A.血清胆红素明显升高

B.酶胆分离

C.凝血酶原活动度明显降低

D.A/G 比值倒置

E.血清转氨酶活性明显升高

答案:C

解析:PTA(凝血酶原活动度) $\leq 40\%$ 为肝细胞大量坏死的肯定界限,为重型肝炎诊断及判断预后的重要指标

题型:A1 型题

题目:

有关肝炎病毒血清学标志物的描述,下列哪项是不正确的

选项:

A.慢性 HBV 感染抗-HBc IgM 也可阳性

B.抗-HAV IgM 阳性可诊断为急性 HAV 感染

C.HBsAg 阳性表明患者有传染性

D.抗-HCV 阳性为 HCV 既往感染

E.抗-HBs 是保护性抗体

答案:D

解析:一般认为抗-HCV 阳性是感染的标志,包括既往感染和现症感染。

题型:B1 型题

题目:

A.HBsAg

B.抗-HBs

C.IgM

D.HBeAg

E.IgG

急性乙型肝炎最早出现的血清学标志是

选项:

答案:A

解析:HBsAg 是感染 HBV 后最早出现的血清学标志,感染后 4~7 周血清中开始出现。

甲型肝炎早期诊断最常用的重要指标是

选项:

答案:C

解析:IgM 出现较早,为甲型肝炎早期诊断最常用的重要指标。

题型:A1 型题

题目:

感染 HIV 后,临床无明显症状,但血中可检出病毒及抗体,此期的持续时间一般

选项:

- A.1~2 年
- B.3~4 年
- C.4~5 年
- D.2~10 年
- E.12~15 年

答案:D

解析:艾滋病无症状感染期:所有的 HIV 感染者均有这一期。此期病毒处于低水平复制状态,患者无任何临床症状,但血清中可检出病毒及抗体,有传染性,可持续 2~10 年或更久。

题型:A1 型题

题目:

流行性乙型脑炎病变最严重的部位是

选项:

- A.脑桥
- B.脊髓
- C.小脑
- D.脑膜
- E.大脑皮质、基底核

答案:E

解析:可引起脑实质广泛病变,以大脑皮质、脑干及基底核的病变最为明显,脑桥、小脑和延髓次之,脊髓病变最轻。

题型:A1 型题

题目:

伤寒患者传染性最强的时期是

选项:

- A.起病 1 周内
- B.潜伏期
- C.起病后第 2~4 周
- D.潜伏末期到起病 1 周内
- E.起病后第 1~2 周

答案:C

解析:伤寒患者和带菌者为传染源,患者由大小便排出病原体,从潜伏期开始,整个病程中都有传染性,尤其在病程的第 2~4 周传染性最强。

题型:A1 型题

题目:

丁型肝炎的潜伏期是

选项:

- A.2~6 周
- B.2~9 周
- C.2~26 周
- D.4~20 周
- E.4~24 周

答案:D

解析:不同类型病毒引起的肝炎潜伏期不同, 甲肝 2~6 周; 乙肝 1~6 个月; 丙肝 2 周~6 个月; 丁肝 4~20 周; 戊肝 2~9 周。所以本题选 D。

题型:A1 型题

题目:

关于特发性血小板减少性紫癜, 下列哪项是正确的 C

选项:

- A.多见于成人
- B.多见于男性
- C.骨髓巨核细胞以幼稚型为主
- D.大多数患者可迁延不愈为慢性型
- E.血小板寿命正常

答案:C

解析:特发性血小板减少性紫癜(ITP)属于自身免疫性血小板减少性紫癜, 为最常见的一种血小板减少性紫癜, 特点为血小板寿命缩短, 骨髓巨核细胞增多但成熟障碍, 以幼稚型为主。血小板更新率加速。急性型多见于儿童, 慢性型好发于青年女性。

题型:A1 型题

题目:

慢性肾炎患者, 肾功能正常, 有大量蛋白尿。饮食治疗, 每天蛋白摄入量应是

选项:

- A.1.0 g/kg
- B.0.5 g/kg
- C.3.0 g/kg
- D.2.0 g/kg
- E.3.0~4.0 g/kg

答案:A

解析:优质低蛋白饮食, 蛋白质摄入量  $0.6 \sim 1 \text{ g} / (\text{kg} \cdot \text{d})$ , 以优质蛋白(牛奶、蛋、瘦肉等)为主, 控制饮食中磷的摄入, 适量增加碳水化合物的摄入量。

题型:A1 型题

题目:

慢性肾衰竭的首发症状是

选项:

- A.酸碱平衡紊乱
- B.高血压

- C.食欲不振、恶心、呕吐
- D.乏力、失眠、记忆力减退
- E.骨质疏松症

答案:C

解析:慢性肾衰竭患者最早出现的症状经常是在消化系统,通常表现为食欲不振、恶心、呕吐等。患者口中有异味,可有消化道出血。

题型:A1 型题

题目:

患者,男,47岁。近3年来疲劳乏力,食欲减退。间歇性鼻出血。齿龈出血。今晨进硬食后,突然呕血。并出现黑便。检查:血压明显下降。心率120次/分,腹部膨隆有移动性浊音,肝脾触诊不满意。应首选的止血措施是

选项:

- A.肌注安络血
- B.静滴止血芳酸
- C.冰水洗胃
- D.三腔管压迫
- E.迅速补充血容量

答案:B

解析:分析患者的临床表现、体征,考虑肝硬化出血可能大,且已有侧支循环建立、腹水等肝硬化失代偿表现,凝血功能障碍。止血应首选对全身凝血功能有改善的治疗,故选B。

题型:A1 型题

题目:

肝癌的组织学类型。最多见的是

选项:

- A.肝细胞型
- B.胆管细胞型
- C.结节型
- D.弥漫型
- E.混合型

答案:A

解析:肝癌中原发性肝癌常见,原发性肝癌的组织学类型有肝细胞型、胆管细胞型及混合型,其中肝细胞型最多见,故选A。而C、D、E均为肝癌的大体分型。

题型:A1 型题

题目:

风疹的好发年龄是

选项:

- A.1岁以下
- B.1-5岁
- C.6-9岁
- D.9岁以上
- E.任何年龄



答案:B

解析:风痧的好发年龄是 1-5 岁。

题型:A1 型题

题目:

诊断 6 岁以上小儿营养性缺铁性贫血的标准, 其血红蛋白值应低于的数值是

选项:

- A.80g/L
- B.90g/L
- C.100g/L
- D.110g/L
- E.120g/L

答案:D

解析:3 个月~6 岁小儿营养性缺铁性贫血的标准, 其血红蛋白值小于等于 110 g/L; 6 岁以上的血红蛋白值应小于 120 g/L。

题型:A1 型题

题目:

患儿, 5 岁。1 年来食少饮多, 皮肤干燥, 大便干结, 舌红少津, 舌苔光剥, 脉细数。治疗应首选的方剂是

选项:

- A.沙参麦冬汤
- B.增液承气汤
- C.养胃增液汤
- D.六味地黄丸
- E.麦门冬汤

答案:C

解析:患儿主症为食少饮多, 诊断为厌食。“皮肤干燥, 大便干结, 舌红少津, 舌苔光剥, 脉细数”为脾胃阴虚的表现。治宜滋脾养胃, 佐以助运, 方用养胃增液汤。

题型:A2 型题

题目:

患儿, 男, 3 岁。突然出现神昏惊厥, 伴发热头痛, 咳嗽流涕, 咽红, 舌苔薄黄, 脉浮数。治疗首选方剂是

选项:

- A.柴葛解肌汤
- B.银翘散
- C.银翘散合羚角钩藤汤
- D.桑菊饮
- E.紫雪散

答案:B

解析:从发病症状可知为急惊风风热动风证, 治应疏风清热, 息风定惊, 方用银翘散加减。

题型:A1 型题

题目:

急性肾小球肾炎发病前有哪些前驱感染史

- A.病毒感染
- B.链球菌感染
- C.金葡菌感染
- D.支原体感染
- E.原虫感染

答案:B

解析:本病在发病前 1~4 周多有呼吸道或皮肤感染、猩红热等链球菌感染病史或其他急性感染史。

