

23

金英杰中医直播教研组

 **金英杰医学**
JINYINGJIE.COM

学管中心

金英杰中医直播教研组

2023中医执业（助理）医师考试

◎ 清晰学习目标 ☆ 明确学习重点

✍ 紧跟学习进度 ⚡ 备考高效率

每天完成一个小目标 成就医生大梦想

学习计划

金英杰直播学院 专属内部资料



上课通知
金英杰直播
智慧学习 “医”学就会

适用考生：金英杰学员

计划内容：全系统学习内容

上课时间：10月—次年8月

年

2023 年中医专业入学测评

亲爱的医考“战友们”，欢迎加入金英杰“医考战队”，我们即将迎来一个紧张而又充实的备考之旅。新的征程开启新的荣耀，让我们拂去岁月之尘，重回知识的殿堂。面对人生新的起点你准备好了吗？以下入学测评题目是历年真题精选，希望通过以下测试能帮助您对自身专业水平有一个准确定位，测评结束后学管老师会给您进行测评结果分析及年度学习建议哦。

金英杰中医直播教研组 编

2023 年中医专业（执业和助理）入学测试题答案

1. 关于中医学的学科属性，以下哪项更准确

- A. 科学
- B. 哲学
- C. 医学科学
- D. 自然科学
- E. 自然哲学

【答案】D

2. 中医学形成的时间最迟为

- A. 夏朝
- B. 商朝
- C. 春秋时期
- D. 战国至秦汉时期
- E. 东汉时期

【答案】D

3. 中医学理论体系的形成标志为

- A. 《五十二病方》
- B. 《黄帝内经》
- C. 《难经》
- D. 《伤寒杂病论》
- E. 《神农本草经》

【答案】B

4. 中医学理论体系的确立标志为

- A. 《五十二病方》《黄帝内经》《难经》《伤寒杂病论》
- B. 《黄帝内经》《难经》《伤寒杂病论》《神农本草经》
- C. 《五十二病方》《黄帝内经》《难经》《神农本草经》
- D. 《五十二病方》《黄帝内经》《伤寒杂病论》《神农本草经》
- E. 《五十二病方》《难经》《伤寒杂病论》《神农本草经》

【答案】B

5. 倡导以六经辨证和脏腑辨证等方法，为我国第一部临床医学专著的是

- A. 《五十二病方》
- B. 《黄帝内经》
- C. 《难经》
- D. 《伤寒杂病论》
- E. 《神农本草经》

【答案】D

6. 人体是一个有机整体，其“中心”是

- A. 脑
- B. 六腑
- C. 五脏
- D. 经络
- E. 奇恒之腑

【答案】C

7. 人体是一个有机整体，其“五脏六腑之大主”是

- A. 脑
- B. 心
- C. 五脏
- D. 经络
- E. 肾

【答案】B

8. 《素问·脉要精微论》中“四变之动，脉与之上下”所体现的是

- A. 恒动观念
- B. 辨证论治

- C. 形神一体观
- D. 整体观念
- E. 辨证观念

【答案】D

9. 《素问·金匱真言论》说所“善病洞泄寒中”的季节是

- A. 春季
- B. 仲夏
- C. 长夏
- D. 秋季
- E. 冬季

【答案】C

10. 《素问·金匱真言论》所说“善病风疟”的季节是

- A. 春季
- B. 仲夏
- C. 长夏
- D. 秋季
- E. 冬季

【答案】D

11. 《素问·脉要精微论》所说“泛泛乎万物有余”的脉象，其相应的时间是

- A. 春日
- B. 夏日
- C. 长夏
- D. 秋日
- E. 冬日

【答案】B

12. 《素问·脉要精微论》所说“蛰虫周密”的脉象出现的时间是

- A. 春日
- B. 夏日
- C. 长夏
- D. 秋日
- E. 冬日

【答案】E

13. 《灵枢·顺气一日分为四时》“夫百病者……多以旦慧”，其原因是

- A. 人气始生，病气衰
- B. 人气长，长则胜邪
- C. 人气始衰，邪气始生
- D. 人气入脏，邪气独居于身
- E. 人气抗邪，卫外为固

【答案】A

14. 《灵枢·顺气一日分为四时》所说疾病随昼夜时间节律而变化，其病“安”的时间是

- A. 旦
- B. 昼
- C. 夕
- D. 夜
- E. 晨

【答案】B

15. 采取同病异治方法的原因是

- A. 疾病相同
- B. 症状不同
- C. 阶段相同
- D. 证候不同
- E. 体征不同

【答案】D

16. 寒凉派医家代表为

- A. 刘完素
- B. 张从正
- C. 李杲
- D. 朱震亨
- E. 张介宾

【答案】A

17. 下列选项，能够体现事物阴阳属性相对性的是

- A. 对立制约
- B. 互根互用
- C. 互为消长
- D. 平衡协调
- E. 互相转化

【答案】E

18. “阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也”，主要说明阴阳之间的关系是

- A. 对立制约
- B. 互根互用
- C. 互为消长
- D. 平衡协调
- E. 互相转化

【答案】B

19. “动极者镇之以静，阴亢者胜之以阳”，说明阴阳之间的关系是

- A. 阴阳互藏
- B. 阴阳互根

- C. 阴阳平衡
- D. 阴阳转化
- E. 阴阳制约

【答案】E

20. “阴平阳秘，精气乃治”，所体现的阴阳关系是

- A. 阴阳的对立制约
- B. 阴阳的对立消长
- C. 阴阳的互根互用
- D. 阴阳的消长平衡
- E. 阴阳的相互转化

【答案】A

21. “阴中求阳”的理论依据是

- A. 阴阳相互转化
- B. 阴阳互根互用
- C. 阴阳相互消长
- D. 阴阳对立制约
- E. 阴阳动态平衡

【答案】B

22. “热者寒之”治则，所体现的阴阳关系是

- A. 阴阳交感
- B. 阴阳互根
- C. 阴阳对立
- D. 阴阳消长
- E. 阴阳转化

【答案】C

23. “阳生阴长，阳杀阴藏”所体现的阴阳关系是

- A. 阴阳交感
- B. 阴阳互根
- C. 阴阳对立
- D. 阴阳消长
- E. 阴阳转化

【答案】B

24. 五脏分阴阳，则肺的阴阳属性是

- A. 阳中之阳
- B. 阳中之阴
- C. 阴中之阳
- D. 阴中之阴
- E. 阴中之至阴

【答案】B

25. 五行中，“金”的“所不胜”之行是

- A. 火
- B. 水
- C. 土
- D. 木
- E. 金

【答案】A

26. 肺主司一身之气的生成体现于

- A. 吸入清气
- B. 呼出浊气
- C. 生成宗气
- D. 调节气机
- E. 辅心行血

【答案】C

27. 《素问·上古天真论》“筋骨坚，发长极，身体盛壮”所指女子的年龄段是

- A. “二七”
- B. “三七”
- C. “四七”
- D. “五七”
- E. “六七”

【答案】C

28. “胃之关”指的是

- A. 贲门
- B. 幽门
- C. 阑门
- D. 大肠
- E. 肾

【答案】E

29. 与血液生成及运行关系密切的是

- A. 心与肺
- B. 心与肾
- C. 心与脾
- D. 脾与肝
- E. 肺与肝

【答案】C

30. 贯注于心肺之脉的气是

- A. 元气
- B. 宗气

- C. 营气
- D. 卫气
- E. 脏腑精气

【答案】B

31. 《灵枢·经脉》说，经脉十二者，伏行于何处

- A. 全身
- B. 分肉之间
- C. 四肢
- D. 躯干
- E. 头面

【答案】B

32. 手三阴经的走向规律是

- A. 从足走头
- B. 从头走足
- C. 从胸走手
- D. 从手走头
- E. 从足走腹

【答案】C

33. 足厥阴肝经分布于内踝尖八寸以上的

- A. 下肢内侧前缘
- B. 下肢外侧前缘
- C. 下肢内侧后缘
- D. 下肢外侧中线
- E. 下肢内侧中线

【答案】E

34. 手三阳经在躯干部的分布是

- A. 胸部
- B. 腹部
- C. 背部
- D. 肩胛部
- E. 体侧

【答案】D

35. 下述经脉在其循行过程中，经过气街的是

- A. 足少阴与足太阳
- B. 手少阳与足少阳
- C. 手阳明与足阳明
- D. 足厥阴与足太阳
- E. 足阳明与足少阳

【答案】E

36. 暑、火、燥三邪的共同致病特点是

- A. 扰神
- B. 炎热
- C. 伤津
- D. 动血
- E. 生风

【答案】C

37. 《素问·五脏生成》说“多食甘”则

- A. 脉凝泣而变色
- B. 皮槁而毛拔
- C. 筋急而抓枯
- D. 肉胝皱而唇揭
- E. 骨痛而发落

【答案】E

38. 《临证指南医案》说“内风”产生的机理是

- A. 体内气机之逆乱
- B. 身中阳气之变动
- C. 体内阴血之不足
- D. 体内筋脉之失养
- E. 体表络脉之失濡

【答案】B

39. 不属于反治的是

- A. 以寒治寒
- B. 热因热用
- C. 以通治通
- D. 以补开塞
- E. 寒者热之

【答案】E

40. 用寒远寒，用热远热属于

- A. 扶正祛邪
- B. 因地制宜
- C. 因人制宜
- D. 因时制宜
- E. 未病先防

【答案】D

41. 下列各项，不属于失神表现的是

- A. 神志昏迷
- B. 形羸色败

- C. 呼吸微弱
- D. 目无精彩
- E. 壮热面赤

【答案】E

42. 下列各项，不是精亏神衰失神表现的是

- A. 动作艰难
- B. 呼吸气微
- C. 肌肉瘦削
- D. 神昏谵语
- E. 面色无华

【答案】D

43. 根据《灵枢·五色》的分法，整个面部称为“藩”的部分是

- A. 鼻
- B. 耳门
- C. 眉间
- D. 颊侧
- E. 额

【答案】D

44. 脏腑在面部的分属，阙中所候脏腑是

- A. 心
- B. 肺
- C. 脾
- D. 肾
- E. 肝

【答案】B

45. 下列各项，是青色和黑色共同所主之病证的是

- A. 寒证
- B. 惊风
- C. 水饮
- D. 肾虚
- E. 气滞

【答案】A

46. 患者双侧瞳孔散大属

- A. 颅脑外伤
- B. 肝火上炎
- C. 颅内肿瘤
- D. 青风内障
- E. 有机磷中毒

【答案】D

47. 小儿食指络脉紫黑的临床意义是

- A. 实寒证
- B. 实热证
- C. 虚热证
- D. 血虚证
- E. 血络闭郁

【答案】E

48. 络舌本的经脉是

- A. 手少阴心经
- B. 足厥阴肝经
- C. 足少阴肾经
- D. 足太阴脾经
- E. 手太阴肺经

【答案】B

49. 无神之舌的表现是

- A. 裂纹舌
- B. 痿软舌
- C. 枯舌
- D. 肿胀舌
- E. 胖嫩舌

【答案】C

50. 舌绛少苔的临床意义是

- A. 血瘀
- B. 热盛
- C. 气虚
- D. 阴虚
- E. 痰火

【答案】D

51. 苔黑而滑润的临床意义是

- A. 阴虚火旺
- B. 湿热郁蒸
- C. 热盛伤津
- D. 痰火内蕴
- E. 阳虚寒盛

【答案】E

52. 邪闭、厥证、痛极的脉象是

- A. 牢脉
- B. 革脉

- C. 紧脉
- D. 伏脉
- E. 弦脉

【答案】D

53. 邪热内结的脉象是

- A. 革脉
- B. 濡脉
- C. 芤脉
- D. 紧脉
- E. 迟脉

【答案】E

54. 心阳虚证与心阳虚脱证临床表现相同的是

- A. 冷汗淋漓
- B. 神志模糊
- C. 面唇青紫
- D. 失眠多梦
- E. 胸痛暴作

【答案】C

55. 肝血虚证的临床表现是

- A. 两目干涩
- B. 视力减退
- C. 手足蠕动
- D. 头痛目赤
- E. 面部烘热

【答案】B

56. 下列各项，不属于心肾不交证临床表现的是

- A. 舌淡少苔
- B. 惊悸多梦
- C. 健忘
- D. 腰膝酸软
- E. 口干咽燥

【答案】A

57. 性能功效相类似的药物配合应用，可增强原有疗效的配伍关系是

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相畏
- D. 相杀
- E. 相恶

【答案】A

58. 一种药物的毒烈性，能被另一种药物消除的配伍关系是

- A. 相恶
- B. 相杀
- C. 相畏
- D. 相须
- E. 相反

【答案】C

59. 七情配伍中，可以降低药物功效的是

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相须
- D. 相使
- E. 相恶

【答案】E

60. 下列各项说法错误的是

- A. 麻黄清表热
- B. 石膏清里热
- C. 秦艽清虚热
- D. 金银花透表热，清里热
- E. 牡丹皮清血热，退虚热

【答案】A

61. 治疗外感风寒，项背强痛而无汗，应选用的药组是

- A. 葛根、柴胡
- B. 葛根、升麻
- C. 葛根、麻黄
- D. 葛根、牛蒡子
- E. 葛根、白芷

【答案】C

62. 治疗胃火上炎的头痛、牙龈肿痛，应选用的药组是

- A. 玄参、黄芩
- B. 知母、贝母
- C. 石膏、升麻
- D. 龙胆、黄柏
- E. 紫苏、生姜

【答案】C

63. 具有清实热、退虚热功效的药物是

- A. 石膏
- B. 知母

- C. 黄芩
- D. 苦参
- E. 栀子

【答案】B

64. 上以清肺，中以凉胃，下泻肾火的物是

- A. 黄柏
- B. 栀子
- C. 知母
- D. 地骨皮
- E. 生地黄

【答案】C

65. 治疗热病心烦、郁闷、躁扰不宁，血热妄行之吐衄、尿血的药物是

- A. 石膏
- B. 知母
- C. 苦参
- D. 栀子
- E. 黄芩

【答案】D

66. 具有清热燥湿、泻火除蒸、解毒疗疮功效的药物是

- A. 银柴胡
- B. 苦参
- C. 黄芩
- D. 黄连
- E. 黄柏

【答案】E

67. 治疗湿热下注之足膝红肿热痛，应选用的药组是

- A. 羌活、独活
- B. 白芷、苍耳子
- C. 苦参、茯苓
- D. 黄柏、苍术
- E. 细辛、防风

【答案】D

68. 治疗湿热黄疸和肝经热盛，高热惊厥，手足抽搐，应选用的药物是

- A. 黄柏
- B. 黄连
- C. 黄芩
- D. 龙胆
- E. 防风

【答案】D

69. 具有峻下逐饮、杀虫疗疮、祛痰止咳功效的药物是

- A. 京大戟
- B. 大黄
- C. 巴豆霜
- D. 芫花
- E. 牵牛子

【答案】D

70. 治疗水肿胀满，大便秘结，小便不利，应首选的药物是

- A. 大黄
- B. 牵牛子
- C. 麻黄
- D. 巴豆霜
- E. 芒硝

【答案】B

71. 独活的功效是

- A. 利水
- B. 清热解毒
- C. 治骨鲠
- D. 解表
- E. 安胎

【答案】D

72. 患者，女，61岁。患风湿痹痛多年，现腰膝酸痛，筋骨痿软无力，脉弦细。用药应首选的药物是

- A. 独活
- B. 秦艽
- C. 五加皮
- D. 木防己
- E. 桑叶

【答案】C

73. 患者，男，28岁。外出感寒，左下肢痛，遇风则疼痛加剧，舌苔薄白。用药应首选的药物是

- A. 独活
- B. 威灵仙
- C. 羌活
- D. 桑寄生
- E. 秦艽

【答案】A

74. 患者，女，50岁。2周前突发小腿肌肉抽筋(腓肠肌痉挛)，近来发作频繁，尤以夜间为

重，每因天气寒冷或包裹不严而发作，用药应首选的药物是

- A. 羌活
- B. 木瓜
- C. 独活
- D. 桑寄生
- E. 秦艽

【答案】B

75. 患者，女，35岁，大便水泻，并见轻微发热，恶心欲吐，舌质淡，苔白腻，脉象濡滑，用药应首选的药物是

- A. 白术
- B. 苍术
- C. 车前子
- D. 茯苓
- E. 藿香

【答案】E

76. 飞滑石入煎剂的用法是

- A. 冲服
- B. 包煎
- C. 另煎
- D. 先煎
- E. 久煎

【答案】B

77. 治疗元气大亏，阳气暴脱，亡阳与气脱并见，应选用的药组是

- A. 附子、黄芪
- B. 附子、人参
- C. 白术、附子
- D. 附子、干姜
- E. 附子、肉桂

【答案】B

78. 具有散寒止痛、理气和胃功效的药物是

- A. 肉桂
- B. 干姜
- C. 高良姜
- D. 小茴香
- E. 花椒

【答案】D

79. 具有理气健脾、燥湿化痰功效的药物是

- A. 枳实
- B. 佛手

- C. 陈皮
- D. 薤白
- E. 川楝子

【答案】C

80. 治疗脏器下垂，应选用的药物是

- A. 陈皮
- B. 枳实
- C. 佛手
- D. 青皮
- E. 沉香

【答案】B

81. 具有凉血止血散瘀功效，尤善治尿血的药物是

- A. 白茅根
- B. 小蓟
- C. 血余炭
- D. 地榆
- E. 茜草

【答案】B

82. 具有凉血止血、解毒敛疮功效的药物是

- A. 侧柏叶
- B. 大蓟
- C. 艾叶
- D. 地榆
- E. 栀子

【答案】D

83. 百合除治疗肺热咳嗽、劳嗽咯血外，还能够治疗的病证是

- A. 肝肾阴虚、头晕目眩
- B. 胃阴不足、舌干口渴
- C. 脾胃虚弱、倦怠无力
- D. 虚烦惊悸、失眠多梦
- E. 老年津亏、肠燥便秘

【答案】D

84. 患者，女，54岁。面色㿔白，时自汗出，恶风，经常患感冒，脉浮无力。用药应首选药物是

- A. 党参
- B. 麻黄根
- C. 浮小麦
- D. 生黄芪
- E. 太子参

【答案】D

85. 乌梅的功效是

- A. 涩肠，止遗
- B. 止带，止遗
- C. 涩肠，生津
- D. 涩肠，止带
- E. 止带，止血

【答案】C

86. 银翘散组成的药物中，除银花、连翘、荆芥穗、淡豆豉、牛蒡子外，其余的药物是

- A. 竹叶杏仁桔梗甘草
- B. 苏叶桔梗芦根甘草
- C. 薄荷杏仁桔梗甘草
- D. 薄荷竹叶桔梗甘草
- E. 薄荷杏仁竹叶甘草

【答案】D

87. 止嗽散组成的药物中含有

- A. 苏梗
- B. 荆芥
- C. 百合
- D. 白芷
- E. 紫苏

【答案】B

88. 九味羌活汤的功用是

- A. 散寒解表，祛风除湿
- B. 发汗解表，疏风止痛
- C. 宣肺散寒，除湿止痛
- D. 发汗祛湿，兼清里热
- E. 散寒除湿，通痹止痛

【答案】D

89. 柴葛解肌汤的功用是

- A. 解肌发表
- B. 解肌透疹
- C. 解肌清热
- D. 解肌疏风
- E. 透疹解毒

【答案】C

90. 银翘散中配伍荆芥、淡豆豉的目的是

- A. 宣郁发表，疏风泄热

- B. 解郁除烦，疏散风热
- C. 辛散透邪，以助解表
- D. 疏散风热，宣肺止咳
- E. 疏散风邪，和营止痒

【答案】C

91. 桑菊饮证的主要临床表现是

- A. 头痛身热，微恶风寒，有汗不多，口渴咽干，舌尖红，脉浮数
- B. 咳嗽，身热不甚，口微渴，脉浮微数
- C. 头痛，发热，汗出恶风，苔薄白，脉浮缓
- D. 身热，咳逆，气急鼻塞，苔薄黄，脉滑数
- E. 咳嗽咽痒，微有恶寒发热，苔薄白，脉浮缓

【答案】B

92. 下列何药不是温脾汤组成的药物

- A. 大黄
- B. 甘草
- C. 附子
- D. 人参
- E. 厚朴

【答案】E

93. 功用为泻热逐水的方剂是

- A. 十枣汤
- B. 大承气汤
- C. 大陷胸汤
- D. 济川煎
- E. 大黄牡丹汤

【答案】C

94. 胃肠燥热，津液不足，大便硬而小便数者，治宜选用

- A. 济川煎
- B. 增液汤
- C. 五仁丸
- D. 麻子仁丸
- E. 小承气汤

【答案】D

95. 蒿芩清胆汤中配伍半夏的主要用意是

- A. 燥湿化痰，和胃降逆
- B. 散结除痞，降逆止呕
- C. 散肝舒脾，降逆止呕
- D. 下气宽中，除痰消痞
- E. 温中散寒，散结除痞

【答案】A

96. 由石膏、知母、粳米、甘草组成的方剂是

- A. 青蒿鳖甲汤
- B. 黄连解毒汤
- C. 蒿芩清胆汤
- D. 白虎汤
- E. 竹叶石膏汤

【答案】D

97. 功用为清泻肺热，止咳平喘的方剂是

- A. 止嗽散
- B. 泻白散
- C. 麻黄汤
- D. 定喘汤
- E. 麻杏石膏汤

【答案】B

98. 四逆汤和理中丸组成中均含有的药物是

- A. 附子
- B. 人参
- C. 桂枝
- D. 干姜
- E. 白术

【答案】D

99. 吴茱萸汤的功用是

- A. 温中补虚，和里缓急
- B. 温中祛寒，益气健脾
- C. 温中补虚，降逆止呕
- D. 温肾暖脾，涩肠止泻
- E. 温中补虚，散寒止痛

【答案】C

100. 大柴胡汤的功用是

- A. 和解少阳，内泻热结
- B. 疏肝止痛，清热散结
- C. 透邪解郁，疏肝理脾
- D. 解肌疏表，清泻里实
- E. 疏肝解郁，健脾和营

【答案】A

101. 参苓白术散中除人参、茯苓、白术、甘草和桔梗外，还有

- A. 黄芪当归陈皮升麻柴胡

- B. 莲子肉薏苡仁砂仁白扁豆山药
- C. 莲子肉薏苡仁砂仁当归陈皮
- D. 黄芪当归砂仁白扁豆山药
- E. 黄芪当归陈皮白扁豆山药

【答案】B

102. 不属于补中益气汤组成药物的是

- A. 人参、黄芪
- B. 白术、炙甘草
- C. 茯苓、砂仁
- D. 当归、橘皮
- E. 升麻、柴胡

【答案】C

103. 左归丸的功用是

- A. 温补肾阳，填精补血
- B. 滋阴补肾，填精益髓
- C. 补益肝肾，强壮筋骨
- D. 滋阴补肾，涩精止遗
- E. 填精补髓，滋阴降火

【答案】B

104. 症见汗出恶风，面色㿔白，舌淡，苔薄白，脉浮虚者，宜选用

- A. 玉屏风散
- B. 桂枝汤
- C. 四君子汤
- D. 当归补血汤
- E. 八珍汤

【答案】A

105. 大补阴丸中除熟地黄、猪脊髓、白蜜外，还有

- A. 黄连贝母龟板
- B. 黄柏知母龟板
- C. 黄芩知母鳖甲
- D. 黄柏当归龟板
- E. 黄柏贝母鳖甲

【答案】B

106. 真人养脏汤的功用是

- A. 温中祛寒，补益脾胃
- B. 温中补虚，降逆止呕
- C. 益气健脾，缓急止痛
- D. 温补脾肾，涩肠止泻
- E. 涩肠固脱，温补脾肾

【答案】E

107. 治疗五更泄泻的首选方剂是

- A. 吴茱萸汤
- B. 理中丸
- C. 真人养脏汤
- D. 四神丸
- E. 金匱肾气丸

【答案】D

108. 酸枣仁汤组成的药物中含有

- A. 知母
- B. 茯神
- C. 远志
- D. 柏子仁
- E. 龙眼肉

【答案】A

109. 手足三阳经在四肢的分布规律是

- A. 太阳在前，少阳在中，阳明在后
- B. 太阳在前，阳明在中，少阳在后
- C. 阳明在前，太阳在中，少阳在后
- D. 阳明在前，少阳在中，太阳在后
- E. 少阳在前，阳明在中，太阳在后

【答案】D

110. 相表里的阴经与阳经的循行交接部位是

- A. 心中
- B. 胸中
- C. 腹中
- D. 头面部
- E. 手足末端

【答案】E

111. 手少阳三焦经与足少阳胆经的循行交接部位是

- A. 鼻旁
- B. 目外眦
- C. 目内眦
- D. 无名指端
- E. 足小趾端

【答案】B

112. 足少阴肾经与手厥阴心包经的循行交接部位是

- A. 肺内

- B. 腹中
- C. 胸中
- D. 心中
- E. 目旁

【答案】C

113. 下列各组经脉中，未按气血循行流注顺序排列的是

- A. 胆经、肝经、肺经
- B. 心经、小肠经、肾经
- C. 大肠经、胃经、脾经
- D. 肾经、心包经、三焦经
- E. 三焦经、胆经、肝经

【答案】B

114. 对奇经八脉的叙述中，错误的是

- A. 阳维脉总督六阳
- B. 阳跷脉调节肢体运动
- C. 冲脉涵蓄十二经气血
- D. 任脉总任六阴经
- E. 阴跷脉司眼睑开阖

【答案】A

115. 被称为“阳脉之海”的是

- A. 带脉
- B. 督脉
- C. 冲脉
- D. 阳维脉
- E. 阳跷脉

【答案】B

116. 属于十五络脉的是

- A. 带脉之络、冲脉之络、脾之大络
- B. 带脉之络、冲脉之络、胃之大络
- C. 任脉之络、督脉之络、脾之大络
- D. 任脉之络、督脉之络、胃之大络
- E. 任脉之络、督脉之络、冲脉之络

【答案】C

117. 根据十二经别循行分布特点排列的是

- A. 出、入、离、合
- B. 入、离、出、合
- C. 离、合、出、入
- D. 离、入、出、合
- E. 出、离、入、合

【答案】D

118. 属于脏，循行分布于上肢内侧和胸腹的是

- A. 奇经八脉
- B. 手三阴经
- C. 手三阳经
- D. 足三阴经
- E. 足三阳经

【答案】B

119. 足三阴经在内踝上 8 寸以下的分布规律是

- A. 厥阴在前，太阴在中，少阴在后
- B. 少阴在前，厥阴在中，太阴在后
- C. 厥阴在前，少阴在中，太阴在后
- D. 太阴在前，厥阴在中，少阴在后
- E. 太阴在前，少阴在中，厥阴在后

【答案】A

120. 手三阴经的循行走向规律是

- A. 从胸走手
- B. 从手走胸
- C. 从手走头
- D. 从头走足
- E. 从胸腹走足

【答案】A

121. 具有调节全身阴经经气作用的是

- A. 任脉
- B. 冲脉
- C. 带脉
- D. 阴跷脉
- E. 阴维脉

【答案】A

122. 带脉的功能是

- A. 调节全身阴经经气
- B. 涵蓄十二经气血
- C. 调节六阴经经气
- D. 调节肢体运动
- E. 约束纵行躯干的诸条经脉

【答案】E

123. 属于奇经的是

- A. 手少阳三焦经

- B. 十二经筋
- C. 十二皮部
- D. 十五络脉
- E. 阴维脉

【答案】E

124. 属于正经的是

- A. 手少阳三焦经
- B. 十二经筋
- C. 十二皮部
- D. 十五络脉
- E. 阴维脉

【答案】A

125. 任脉别络的分布部位是

- A. 从鸠尾分出散布于背部
- B. 从鸠尾分出散布于腹部
- C. 从鸠尾分出散布于胸部
- D. 从长强分出散布于头部
- E. 从长强分出散布于腹部

【答案】B

126. 督脉别络的分布部位是

- A. 从鸠尾分出散布于背部
- B. 从鸠尾分出散布于腹部
- C. 从鸠尾分出散布于胸部
- D. 从长强分出散布于头部
- E. 从长强分出散布于腹部

【答案】D

127. 经络按诊最常用的部位是

- A. 交会穴
- B. 五输穴
- C. 背俞穴
- D. 八会穴
- E. 八脉交会穴

【答案】C

128. 腧穴的分类是

- A. 十四经穴、奇穴、特定穴
- B. 十四经穴、奇穴、阿是穴
- C. 十二经穴、奇穴、特定穴
- D. 十二经穴、奇穴、阿是穴
- E. 十二经穴、奇穴、五输穴

【答案】B

129. 下列关于奇穴的描述，错误的是

- A. 有固定名称和位置
- B. 某些奇穴是多个穴点的组合
- C. 分布都不在十四经循行路线上
- D. 对某些病证有特殊疗效
- E. 是在“阿是穴”的基础上发展起来

【答案】C

130. 手阳明大肠经的主治特点是

- A. 后头、神志病
- B. 侧头、胁肋病
- C. 侧头、耳病，胁肋病
- D. 前头、鼻、口齿病
- E. 前头、咽喉病、胃肠病

【答案】D

131. 手厥阴心包经的主治特点是

- A. 心病
- B. 心、胃病
- C. 肺、喉病
- D. 肝病、脾胃病
- E. 肾、肺、咽喉病

【答案】B

132. 手少阳三焦经的主治特点是

- A. 前头、鼻、口齿病
- B. 前头、口齿、胃肠病
- C. 侧头、胁肋病
- D. 后头、肩胛病、神志病
- E. 后头、背腰痛

【答案】C

133. 足太阳膀胱经的主治特点是

- A. 后头、肩胛病，神志病
- B. 后头、背腰痛，脏腑病
- C. 侧头、耳病，胁肋病
- D. 前头、鼻、口齿病
- E. 前头、口齿、胃肠病

【答案】B

134. 下列特定穴中，不位于肘膝关节以下部位的是

- A. 原穴

- B. 十二经脉络穴
- C. 下合穴
- D. 五输穴
- E. 八会穴

【答案】E

135. 下列各项中，叙述不正确的是

- A. 所根为井
- B. 所溜为荥
- C. 所注为输
- D. 所行为经
- E. 所入为合

【答案】A

136. 合穴多位于

- A. 指、趾末端
- B. 肘膝关节附近
- C. 掌指、跖趾关节附近
- D. 掌指、跖趾关节之前
- E. 掌指、跖趾关节之后

【答案】B

137. 六阴经中，与原穴为同一腧穴的是

- A. 井穴
- B. 荥穴
- C. 输穴
- D. 经穴
- E. 合穴

【答案】C

138. 督脉之络穴位于

- A. 头项部
- B. 上腹部
- C. 下腹部
- D. 胸胁部
- E. 尾骶部

【答案】E

139. 脏腑之气汇聚于胸腹部的腧穴称为

- A. 原穴
- B. 络穴
- C. 募穴
- D. 五输穴
- E. 八会穴

【答案】C

140. 手阳明大肠经的络穴是

- A. 商阳
- B. 合谷
- C. 阳溪
- D. 偏历
- E. 温溜

【答案】D

141. 大肠的下合穴是

- A. 合谷
- B. 曲池
- C. 天枢
- D. 上巨虚
- E. 下巨虚

【答案】D

142. 大肠的募穴是

- A. 下脘
- B. 中脘
- C. 梁门
- D. 水道
- E. 天枢

【答案】E

143. 治疗急性胃痛应首选的腧穴是(B)

- A. 梁门
- B. 梁丘
- C. 内庭
- D. 上巨虚
- E. 下巨虚

【答案】B

144. 解溪穴的特定穴属性是

- A. 原穴
- B. 输穴
- C. 经穴
- D. 郄穴
- E. 络穴

【答案】C

145. 不属于足阳明胃经五输穴的是

- A. 厉兑

- B. 解溪
- C. 内庭
- D. 陷谷
- E. 丰隆

【答案】E

146. 不属于足太阴脾经五输穴的是

- A. 大都
- B. 地机
- C. 商丘
- D. 太白
- E. 隐白

【答案】B

147. 既为脾经络穴又属于八脉交会穴的是

- A. 公孙
- B. 丰隆
- C. 后溪
- D. 列缺
- E. 阴陵泉

【答案】A

148. 表现为典型弛张热的疾病是

- A. 风湿热
- B. 渗出性胸膜炎
- C. 疟疾
- D. 布鲁杆菌病
- E. 肺炎球菌性肺炎

【答案】A

149. 体温上升期的临床表现是

- A. 皮肤潮红而灼热
- B. 畏寒或寒战，皮肤苍白无汗
- C. 呼吸加快、加强
- D. 心率减慢，脉搏有力
- E. 可有出汗，尿少色黄

【答案】B

150. 体温下降呈渐降形式的是

- A. 疟疾
- B. 输液反应
- C. 风湿热
- D. 肺炎球菌性肺炎
- E. 急性肾盂肾炎

【答案】C

第二单元

151. 脑出血引起发热的主要原因是

- A. 植物神经功能紊乱
- B. 体温调节中枢的功能失常
- C. 无菌性坏死物质的吸收
- D. 皮肤散热量的减少
- E. 感染性发热

【答案】B

152. 属感染性发热的疾病是

- A. 肝癌
- B. 斑疹伤寒
- C. 白血病
- D. 风湿热
- E. 广泛性皮炎

【答案】B

153. 甲状腺功能亢进引起发热的主要原因是

- A. 产热过多
- B. 散热过少
- C. 抗原-抗体反应
- D. 坏死物质吸收
- E. 植物神经功能紊乱

【答案】A

154. 下列可引起反射性呕吐的是

- A. 晕动病
- B. 脑膜炎
- C. 幽门梗阻
- D. 休克
- E. 有机磷中毒

【答案】C

155. 引起心绞痛疼痛的原因是

- A. 挤压
- B. 出血
- C. 坏死
- D. 扩张
- E. 缺血

【答案】E

156. 下列可引起头痛伴剧烈眩晕的是

- A. 颅内高压症
- B. 小脑肿瘤
- C. 蛛网膜下腔出血
- D. 脑膜炎
- E. 中暑

【答案】B

157. 血管性头痛的特点多是

- A. 胀痛
- B. 电击痛
- C. 重压感
- D. 牵拉痛
- E. 紧箍感

【答案】A

158. 头痛常在夜间发作的是

- A. 颅内占位性病变所致头痛
- B. 高血压性头痛
- C. 丛集性头痛
- D. 眼源性头痛
- E. 副鼻窦炎所引起的头痛

【答案】C

159. 有关头痛的说法下列哪项不正确

- A. 小脑幕以下病变引起的头痛多位于后枕部
- B. 三叉神经痛表现为颜面部发作性电击样疼痛
- C. 紧张性头痛多在下午或傍晚出现
- D. 舌咽神经痛的特点是咽后部发作性疼痛并向耳及枕部放射
- E. 大脑半球的病变疼痛多位于病变的对侧，以颞部为多

【答案】E

160. 昏睡的主要临床表现是

- A. 呼唤和推动身体不能使其清醒
- B. 对强烈疼痛刺激可唤醒
- C. 角膜、对光反射消失
- D. 腱反射消失
- E. 能正确回答问题

【答案】B

161. 浅昏迷的主要临床特点是

- A. 对声、光刺激仍有反应

- B. 对强烈疼痛刺激无反应
- C. 对光反射存在
- D. 角膜反射消失
- E. 吞咽反射消失

【答案】C

162. 典型心绞痛的疼痛性质是

- A. 灼痛
- B. 刺痛
- C. 闷痛
- D. 压榨样痛
- E. 酸痛

【答案】D

163. 下列各项，可引起腹痛伴急性高热、寒战的是

- A. 急性化脓性胆管炎
- B. 结缔组织病
- C. 急性腹腔内出血
- D. 肠梗阻
- E. 结核性腹膜炎

【答案】A

164. 下列各项，可引起腹痛伴休克的是

- A. 溃疡性结肠炎
- B. 肝破裂
- C. 慢性胰腺炎
- D. 胃癌
- E. 急性阑尾炎

【答案】B

165. 可引起持续性广泛性剧烈腹痛的是

- A. 消化性溃疡
- B. 胆道蛔虫梗阻
- C. 肾结石
- D. 肠梗阻
- E. 急性弥漫性腹膜炎

【答案】E

166. 急性喉头水肿的主要临床表现是

- A. 体温 38℃ 以上
- B. 心率加快
- C. 烦躁不安
- D. 饮水呛咳
- E. 吸气时出现“三凹征”

【答案】E

167. 吗啡中毒引起呼吸困难的主要原因是

- A. 兴奋呼吸中枢
- B. 使支气管痉挛
- C. 使肺淤血
- D. 肺泡弹性减弱
- E. 呼吸中枢受抑制

【答案】E

168. 肺气肿时，呼吸困难的主要特点是

- A. 呼吸深快
- B. 吸气费力
- C. 呼吸深慢
- D. 呼气费力
- E. 吸气和呼气均感费力

【答案】D

169. 心源性哮喘最主要的临床表现是

- A. 气闷、气促
- B. 心率加快
- C. 发绀、出汗
- D. 端坐呼吸
- E. 两肺哮鸣音及湿啰音

【答案】E

170. 夜间阵发性呼吸困难，夜间发作的原因主要是

- A. 迷走神经兴奋性增高
- B. 呼吸中枢被抑制
- C. 代谢性酸中毒
- D. 压力感受器受刺激
- E. 肺通气、换气功能不良

【答案】A

171. 支气管哮喘发作时的主要临床表现是

- A. 胸闷、咳嗽
- B. 出汗、微绀
- C. 鼻痒、喷嚏
- D. 双肩耸起
- E. 呼气延长伴哮鸣音

【答案】E

172. 支气管扩张的典型症状是

- A. 发热、盗汗

- B. 消瘦、贫血
- C. 刺激性干咳
- D. 胸痛
- E. 慢性咳嗽、咯脓性痰

【答案】E

173. 可引起混合性呼吸困难的疾病是

- A. 肺气肿
- B. 支气管哮喘
- C. 急性喉炎
- D. 重症肺炎
- E. 支气管异物

【答案】D

174. 咳嗽伴杵状指的疾病是

- A. 支气管炎
- B. 支气管扩张症
- C. 肺结核
- D. 肺炎球菌性肺炎
- E. 胸膜炎

【答案】B

175. 引起痰分层现象的疾病是

- A. 慢性支气管炎
- B. 肺脓肿
- C. 肺结核
- D. 肺炎链球菌肺炎
- E. 心源性哮喘

【答案】B

176. 引起咯血最常见的疾病是

- A. 肺结核
- B. 肺淤血
- C. 肺部恶性肿瘤
- D. 肺炎球菌性肺炎
- E. 肺梗死

【答案】A

177. 咯血量较大而能骤然停止的疾病是

- A. 支气管扩张症
- B. 肺结核空洞
- C. 肺脓肿
- D. 二尖瓣狭窄
- E. 肺炎球菌性肺炎

【答案】A

178. 符合溶血性黄疸表现的是

- A. 网织红细胞减少
- B. 尿中尿胆原减少
- C. 尿中有胆红素
- D. 大便色浅
- E. 结合胆红素与总胆红素比值 $< 20\%$

【答案】E

179. 符合阻塞性黄疸表现的是

- A. 粪便颜色加深
- B. 尿中胆红素阴性
- C. 尿中尿胆原增加
- D. 心率增快
- E. 血清碱性磷酸酶明显增高

【答案】E

180. 可引起阻塞性黄疸的疾病是

- A. 原发性胆汁性肝硬化
- B. 系统性红斑狼疮
- C. 毒蕈中毒
- D. 蚕豆病
- E. 病毒性肝炎

【答案】A

181. 先有体温升高后有意识障碍的疾病是

- A. 脑出血
- B. 病毒性脑炎
- C. 蛛网膜下腔出血
- D. 巴比妥中毒
- E. 冬眠灵中毒

【答案】B

182. 以夜间阵发性呼吸困难为突出表现的是

- A. 喉头水肿
- B. 左心衰竭
- C. 右心衰竭
- D. 支气管哮喘
- E. 胸腔积液

【答案】B

183. 心源性水肿最常见的病因是

- A. 左心衰竭

- B. 右心衰竭
- C. 渗出性心包炎
- D. 缩窄性心包炎
- E. 心绞痛

【答案】B

184. 可引起胆囊肿大、无压痛，伴显著黄疸的疾病是

- A. 胆囊炎
- B. 胆管炎
- C. 胰头癌
- D. 胆囊结石
- E. 胆总管结石

【答案】C

185. 正常肺泡呼吸音最明显的听诊部位在

- A. 喉部
- B. 胸骨角附近
- C. 右肺尖
- D. 肩胛下部
- E. 肩胛上部

【答案】D

186. 下列各项，可引起听觉语音增强的是

- A. 气管异物
- B. 阻塞性肺气肿
- C. 胸腔积液
- D. 肺实变
- E. 胸膜增厚粘连

【答案】D

187. 主动脉瓣狭窄，可出现的体征是

- A. 心尖部舒张期震颤
- B. 胸骨左缘第 2 肋间收缩期震颤
- C. 胸骨左缘第 2 肋间舒张期震颤
- D. 胸骨右缘第 2 肋间收缩期震颤
- E. 胸骨右缘第 2 肋间舒张期震颤

【答案】D

188. 引起中性粒细胞减少的疾病是

- A. 脾功能亢进
- B. 尿毒症
- C. 肺炎链球菌肺炎
- D. 急性心肌梗死
- E. 急性溶血

【答案】A

189. 下列各项，不引起淋巴细胞增多的疾病是

- A. 百日咳
- B. 流行性腮腺炎
- C. 肾综合征出血热
- D. 免疫缺陷性疾病
- E. 结核病

【答案】D

190. 前间壁心肌梗死特征性心电图改变出现的导联是

- A. V_1 、 V_2 、 V_3
- B. V_1 、 V_2 、 V_3 、 V_4 、 V_5
- C. V_3 、 V_4 、 V_5
- D. V_5 、I、aVL
- E. II、III、aVF

【答案】A

191. QRS 波群代表的是

- A. 心室肌除极过程
- B. 心房肌除极过程
- C. 心室肌复极过程
- D. 心房肌复极过程
- E. 房室交界区的兴奋性

【答案】A

192. 下列关于心电图价值的描述，错误的是

- A. 能反映心功能
- B. 能确诊心律失常
- C. 诊断心肌梗死
- D. 辅助诊断房室肥大
- E. 辅助诊断电解质紊乱

【答案】A

193. 下列各项，不属室性早搏心电图特点的是

- A. 提前出现宽大的 QRS 波
- B. 宽大 QRS 波前无 P 波
- C. QRS 波时间 $>0.12s$
- D. 其 T 波方向与 QRS 主波方向相反
- E. 代偿间期不完全

【答案】E

194. 婴幼儿咳嗽、发烧, 首选的 X 线检查方法是

- A. 摄胸片正位

- B. 摄胸片侧位
- C. 摄胸片正侧位
- D. 胸部透视
- E. 支气管造影

【答案】C

195. 支气管肺炎的基本病变是

- A. 渗出
- B. 增殖
- C. 纤维化
- D. 钙化
- E. 肺水肿

【答案】A

196. 最常见的支气管扩张类型是

- A. 囊状扩张
- B. 柱状扩张
- C. 囊状或柱状扩张混合存在
- D. 局限性梭形扩张
- E. 球状扩张

【答案】A

197. 肺癌空洞常发生于

- A. 鳞状上皮癌
- B. 腺癌
- C. 大细胞未分化癌
- D. 小细胞未分化癌
- E. 细支气管-肺泡癌

【答案】A

198. 胃溃疡的主要 X 线表现是

- A. 黏膜破坏
- B. 黏膜中断
- C. 龛影
- D. 充盈缺损
- E. 痉挛性切迹

【答案】C

199. 传染病的基本特征为

- A. 有传染性、免疫性和病原体
- B. 有传染性、流行性、地方性和季节性
- C. 有传染性、病原体、免疫性和流行性
- D. 有传染性、传播途径和传染源
- E. 有传染性、免疫性和流行性

【答案】C

200. 下列各项，可降低人群易感性的是

- A. 新生儿增加
- B. 非流行区人口迁入
- C. 免疫人口死亡等
- D. 新的传染病出现或传入
- E. 接种疫苗

【答案】E

201. 潜伏期是指

- A. 自病原体侵入机体至典型症状出现
- B. 自病原体侵入机体至排出体外
- C. 自病原体侵入机体至临床症状开始出现
- D. 自接触传染源至患者开始出现症状
- E. 自接触传染源至典型症状出现

【答案】C

202. 再燃是指

- A. 在感染某种病原体基础上再次感染同一病原体
- B. 传染病患者进入恢复期后，已稳定退热一段时间，潜伏于组织内的病原体再度繁殖，使发热等初发症状再度出现
- C. 传染病患者在恢复期，体温未稳定下降至正常，又再度升高
- D. 人体同时感染两种或两种以上的病原体
- E. 传染病痊愈以后再次发病

【答案】C

203. 传染病与感染性疾病的主要区别是

- A. 有无病原体
- B. 有无感染后免疫
- C. 有无发热
- D. 有无传染性
- E. 有无皮疹

【答案】D

204. 病原体侵入人体后，局限在机体的某些部位，但机体免疫功能不足以将病原体清除，一旦机体免疫功能低下可发病。此种表现属于

- A. 病原携带状态
- B. 潜伏性感染
- C. 隐性感染
- D. 显性感染
- E. 机会性感染

【答案】B

205. 在感染过程中，最常见的表现形式是

- A. 病原体被消灭或排出体外
- B. 隐性感染
- C. 显性感染
- D. 病原携带状态
- E. 潜伏性感染

【答案】B

206. 传染病流行过程的基本条件是

- A. 散发、流行、暴发
- B. 病原体、人体、外环境
- C. 自然因素、社会因素
- D. 传染源、传播途径、易感人群
- E. 患者、病原携带者、受感染的动物

【答案】D

207. 确定传染病检疫期的依据是

- A. 隔离期
- B. 传染期
- C. 最长潜伏期
- D. 最短潜伏期
- E. 平均潜伏期

【答案】C

208. 下列传染病常见出疹时间，错误的是

- A. 水痘多在第 1 病日
- B. 猩红热多在第 2 病日
- C. 天花多在第 3 病日
- D. 麻疹多在第 4 病日
- E. 伤寒多在第 5 病日

【答案】E

209. 下列传染病，外周血白细胞正常或减少的是

- A. 流行性出血热
- B. 狂犬病
- C. 流行性脑脊髓膜炎
- D. 流行性乙型脑炎
- E. 伤寒

【答案】E

210. 下列各项，不属传染源的是

- A. 患者
- B. 病原携带者

- C. 隐性感染者
- D. 易感者
- E. 受感染的动物

【答案】D

211. 下列传染病，根据传染病防治法要求，不按甲类传染病管理的是

- A. AIDS
- B. SARS
- C. 肺炭疽
- D. 鼠疫
- E. 霍乱

【答案】A

212. 下列各项，与病原体致病作用无关的是

- A. 侵袭力
- B. 毒力
- C. 数量
- D. 大小
- E. 变异性

【答案】D

213. 下列感染中，没有传染性的是

- A. 隐性感染
- B. 显性感染的潜伏期
- C. 显性感染的症状明显期
- D. 病原携带状态
- E. 潜伏性感染

【答案】E

214. 传染病流行过程的三环节是

- A. 传染源、传播途径、易感人群
- B. 病原体、传播途径、易感人群
- C. 病原体、社会因素、环境因素
- D. 人体、病原体、外环境
- E. 人体、病原体、社会因素

【答案】A

215. 确定传染病隔离期的主要依据是

- A. 最短潜伏期
- B. 平均潜伏期
- C. 最长潜伏期
- D. 前驱期
- E. 传染期

【答案】E

216. 患者肺功能显示 $50\% > FEV_1 \geq 30\%$ ，COPD 严重程度分级是

- A. 不能分级
- B. I 级
- C. II 级
- D. III 级
- E. IV 级

【答案】D

217. COPD 典型的症状是

- A. 慢性咳嗽
- B. 咳痰
- C. 气短及呼吸困难
- D. 喘息和胸闷
- E. 食欲减退

【答案】C

218. COPD 急性加重期的重要治疗措施是

- A. 止咳、祛痰
- B. 解痉、平喘
- C. 控制感染
- D. 避免及减少各种诱因
- E. 抗过敏

【答案】C

219. 下列各项，有助于判断气流阻塞严重程度的是

- A. 病史
- B. 肺气肿体征
- C. X 线检查
- D. 肺功能检查
- E. 血气分析

【答案】D

220. 可以改善 COPD 患者生存率的治疗措施是

- A. 及时应用抗菌药物
- B. 支气管扩张药
- C. 长期家庭氧疗
- D. 康复治疗
- E. 肺减容手术

【答案】C

221. COPD 患者长期家庭氧疗的氧流量是

- A. $0.5 \sim 1L/min$
- B. $1 \sim 2L/min$

- C. 1.5~2.5L/min
- D. 2~3L/min
- E. 3.5~4.5L/min

【答案】B

222. COPD 急性加重期控制性氧疗应达到的满意的氧合水平是

- A. $\text{PaO}_2 > 45\text{mmHg}$, $\text{SaO}_2 > 75\%$
- B. $\text{PaO}_2 > 50\text{mmHg}$, $\text{SaO}_2 > 80\%$
- C. $\text{PaO}_2 > 55\text{mmHg}$, $\text{SaO}_2 > 85\%$
- D. $\text{PaO}_2 > 60\text{mmHg}$, $\text{SaO}_2 > 90\%$
- E. $\text{PaO}_2 > 65\text{mmHg}$, $\text{SaO}_2 > 95\%$

【答案】D

223. 慢性肺心病肺动脉高压形成的最主要机制是

- A. 血液黏滞度增加
- B. 急性缺氧反复发作
- C. 长期慢性缺氧
- D. 血流阻力增加
- E. 肺血管慢性炎症

【答案】C

224. 慢性肺心病最多见的并发症是

- A. 肺性脑病
- B. 心律失常
- C. 酸碱失衡
- D. 消化道出血
- E. 肾衰竭

【答案】C

225. 属慢性肺心病肺动脉高压 X 线检查表现的是

- A. 双肺纹理增多
- B. 右心室肥厚
- C. 右下肺动脉干扩张
- D. 双肺透亮度增高
- E. 右心房肥大

【答案】C

226. 治疗慢性肺心病心衰合并房性早搏应选用的药物是

- A. 利多卡因
- B. 美托洛尔
- C. 地高辛
- D. 阿托品
- E. 胺碘酮

【答案】C

227. 治疗慢性肺心病右心衰竭选用洋地黄制剂的原则是

- A. 速效类、常规剂量
- B. 速效类、常规剂量的 $1/2 \sim 2/3$
- C. 缓效类、小剂量
- D. 缓效类、常规剂量
- E. 缓效类、常规剂量的 $1/2 \sim 2/3$

【答案】B

228. 提示 COPD 患者出现肺动脉高压的体征是

- A. P_2 亢进
- B. 剑突下心脏搏动增强
- C. 颈静脉充盈
- D. 三尖瓣区收缩期杂音
- E. 三尖瓣区舒张期奔马律

【答案】A

229. 慢性肺心病急性加重期并发肺性脑病时应慎用的药物是

- A. 镇静剂
- B. 祛痰剂
- C. 解痉平喘药
- D. 呼吸兴奋剂
- E. 抗生素

【答案】A

230. 慢性肺心病早期诊断的主要依据是

- A. 肺气肿征象
- B. 肺动脉高压征象
- C. 右心衰竭体征
- D. 反复咳嗽、咳痰病史
- E. 心悸、气促症状

【答案】B

231. 慢性肺心病急性加重期，应用利尿剂不当常诱发的是

- A. 代谢性酸中毒
- B. 代谢性碱中毒
- C. 低血压
- D. 房性早搏
- E. 消化道出血

【答案】B

232. 社区获得性肺炎的主要致病菌是

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 大肠埃希菌

- C. 克雷白杆菌
- D. 肺炎链球菌
- E. 链球菌

【答案】D

233. 对放射治疗最敏感的肺癌组织学类型是

- A. 鳞状上皮癌
- B. 类癌
- C. 腺癌
- D. 小细胞肺癌
- E. 大细胞肺癌

【答案】D

234. 慢性左心衰竭患者的体征中，最不具有诊断价值的是

- A. 心音低钝
- B. 肺动脉瓣区第二心音亢进
- C. 心率减慢
- D. 心脏扩大
- E. 舒张期奔马律

【答案】C

235. 一度房室传导阻滞听诊心音时的表现是

- A. 第一心音增强
- B. 第一心音减弱
- C. 第二心音增强
- D. 第二心音减弱
- E. 闻及第三心音

【答案】B

236. 十二指肠溃疡的好发部位是

- A. 球部
- B. 乳头的近段降部
- C. 乳头的远段降部
- D. 十二指肠水平段
- E. 十二指肠升段

【答案】A

237. 不属类风湿关节炎临床特点的是

- A. 女性多见
- B. 起病隐匿
- C. 好发于 60 岁以上老年人
- D. 早期小关节受累
- E. 可致关节畸形与功能障碍

【答案】C

238. 王某，男，45岁。发热1天，微恶风，汗少，肢体酸重，头昏重胀痛，咳嗽痰黏，鼻涕浊涕，心烦口渴，渴不多饮，胸闷脘痞，泛恶，腹胀便溏，舌苔薄黄而腻，脉濡数。其治疗应首选的方剂是

- A. 银翘散
- B. 加减葳蕤汤
- C. 荆防达表汤
- D. 新加香薷饮
- E. 参苏饮

【答案】D

239. 患者，男，56岁。发热1天，微恶风寒，少汗，头昏，心烦，口干咽燥，干咳少痰，舌红少苔，脉细数。其证候诊断是

- A. 常人感冒风寒束表证
- B. 常人感冒暑湿伤表证
- C. 常人感冒风热犯表证
- D. 虚体感冒气虚感冒证
- E. 虚体感冒阴虚感冒证

【答案】E

240. 下列各项，不属咳嗽病因的是

- A. 外感六淫
- B. 痰湿痰热
- C. 肝郁化火
- D. 禀赋不足
- E. 肺阴亏虚

【答案】D

241. 咳嗽的基本病机是

- A. 风寒袭肺，肺气失宣
- B. 风热犯肺，肺失清肃
- C. 痰热壅肺，肺失肃降
- D. 肝郁化火，上逆侮肺
- E. 邪犯于肺，肺气上逆

【答案】E

242. 咳嗽，咯吐粉红色泡沫痰，咳而气喘，呼吸困难者，多属

- A. 肺阴不足
- B. 肺脾气虚
- C. 肺肾气虚
- D. 脾肾阳虚
- E. 心肺阳虚

【答案】E

243. 治疗咳嗽之肺阴亏耗证，应首选的方剂是

- A. 桑菊饮
- B. 生脉散合补肺汤
- C. 桑杏汤
- D. 生脉地黄汤
- E. 沙参麦冬汤

【答案】E

244. 患者，女，63岁。咳嗽反复发作半年，咳声重浊，痰多色白，痰出咳平，每于早晨咳甚痰多，胸闷脘痞，呕恶食少，舌苔白腻，脉濡滑。其证候诊断是

- A. 肝火犯肺证
- B. 痰湿蕴肺证
- C. 痰热郁肺证
- D. 肺阴亏耗证
- E. 风热犯肺证

【答案】B

245. 哮病发作时的基本病理变化是

- A. 肺失宣降
- B. 痰阻气闭
- C. 伏痰引触
- D. 肺气不清
- E. 肺气虚寒

【答案】B

246. 治疗哮病发作期冷哮证，应首选的方剂是

- A. 定喘汤或越婢加半夏汤
- B. 小青龙加石膏汤
- C. 三子养亲汤
- D. 射干麻黄汤或小青龙汤
- E. 平喘固本汤

【答案】D

247. 治疗哮病发作期风痰哮证，应首选的方剂是

- A. 定喘汤或越婢加半夏汤
- B. 厚朴麻黄汤
- C. 三子养亲汤
- D. 射干麻黄汤
- E. 平喘固本汤

【答案】C

248. 治疗哮病缓解期肺肾两虚证，应首选的方剂是

- A. 平喘固本汤
- B. 六君子汤

- C. 定喘汤
- D. 三子养亲汤
- E. 生脉地黄汤合金水六君煎

【答案】E

249. 下列各项，对于鉴别哮病与喘证无意义的是

- A. 是否幼年起病
- B. 是否反复发作
- C. 是否喉中哮鸣
- D. 气喘是否突发突止
- E. 是否伴有发热

【答案】E

250. 治疗实喘风寒壅肺证，首选的方剂是

- A. 麻杏石甘汤
- B. 荆防达表汤
- C. 麻黄汤合华盖散
- D. 桑白皮汤
- E. 麻黄连翘赤小豆汤

【答案】C

251. 患者，男，28岁。2天来，喘逆上气，息粗鼻扇，咳而不爽，痰吐稠黏，形寒身热，身痛无汗，口渴，苔薄黄，舌质红，脉浮数。治疗应首选的方剂是

- A. 麻黄汤
- B. 小青龙汤
- C. 麻杏石甘汤
- D. 桑白皮汤
- E. 三子养亲汤

【答案】C

252. 肺病的特征性临床表现中，错误的是

- A. 咳嗽
- B. 胸痛
- C. 发热
- D. 咳吐腥臭脓痰
- E. 咯铁锈色痰

【答案】E

253. 肺痈成痈期的病机是

- A. 风热外袭，卫表不和，邪热壅肺，肺失清肃
- B. 邪毒渐去，肺体损伤，阴伤气耗
- C. 热毒蕴肺，蒸液成痰，热壅血瘀，蕴酿成痈
- D. 热壅血瘀，血败肉腐，痈肿内溃，脓液外泄
- E. 邪热蕴肺，蒸液成痰，痰热壅滞，肺失清肃

【答案】C

254. 肺痈患者的脓血痰吐入水中，结果是

- A. 痈脓浮在水上
- B. 痈脓悬浮在水中
- C. 痈脓沉入水底
- D. 痈脓溶解在水中
- E. 痰分成三层

【答案】C

255. 肺痈病情转归的关键期是

- A. 成痈期
- B. 初期
- C. 迁延期
- D. 恢复期
- E. 溃脓期

【答案】E

256. 治疗肺痈恢复期，首选的方剂是

- A. 银翘散
- B. 千金苇茎汤
- C. 加味桔梗汤
- D. 桔梗杏仁煎
- E. 如金解毒散

【答案】D

257. 关于肺痈溃脓期病情顺证与逆证的论述中，属于顺证表现的是

- A. 音嘎无力，脓血如败卤，腥臭异常
- B. 脓血稀而渐少，腥臭味转淡，热退
- C. 气喘，鼻扇，胸痛，坐卧不安
- D. 饮食少进，身热不退，颧红
- E. 爪甲青紫，脉短涩或弦急

【答案】B

258. 王某，男，25岁。咳吐大量脓痰，痰血相兼，腥臭异常，胸中烦满而痛，身热面赤，烦渴喜饮，舌苔黄腻，舌质红，脉滑数。治疗应首选的方剂是

- A. 银翘散
- B. 《千金》苇茎汤
- C. 加味桔梗汤
- D. 桔梗杏仁煎
- E. 如金解毒散

【答案】C

259. 下列选项中，属于心悸病因的是

- A. 跌仆损伤
- B. 感受外邪
- C. 疫毒侵袭
- D. 先天遗传
- E. 久病入络

【答案】B

260. 胸痹的辨证，应首辨的要点是

- A. 标本虚实
- B. 病情轻重
- C. 寒热虚实
- D. 脉象变化
- E. 外感内伤

【答案】A

261. 下列各项，属于胁痛病因的是

- A. 体虚年老
- B. 外感湿热
- C. 虫毒感染
- D. 外感燥热
- E. 外感风湿

【答案】B

262. 胁痛病的病理因素是

- A. 气滞
- B. 痰饮
- C. 水湿
- D. 热毒
- E. 风热

【答案】A

263. 下列各项，不属于黄疸病因的是

- A. 外感疫毒
- B. 内伤饮食
- C. 外感湿热
- D. 病后续发
- E. 情志内伤

【答案】E

264. 治疗黄疸疫毒炽盛证，首选的方剂是

- A. 茵陈蒿汤
- B. 甘露消毒丹
- C. 《千金》犀角散
- D. 龙胆泻肝汤

E. 大柴胡汤

【答案】C

265. 水肿风水相搏证，其病位在

A. 心

B. 肺

C. 肝

D. 脾

E. 肾

【答案】B

266. 痹证日久病邪可累及脏腑，最常见的脏腑痹是

A. 肺痹

B. 心痹

C. 肝痹

D. 肾痹

E. 脾痹

【答案】B

267. 益气托毒法的常用方剂是

A. 透脓散

B. 仙方活命饮

C. 黄连解毒汤

D. 托里消毒散

E. 神功内托散

【答案】D

268. 温阳托毒法的代表方剂是

A. 右归丸

B. 托里消毒散

C. 金匱肾气丸

D. 神功内托散

E. 四君子汤

【答案】D

269. 太乙膏的功效是

A. 清热消肿，散瘀化痰

B. 活血祛腐，解毒止痛

C. 消肿止痛，提脓祛腐

D. 消肿清火，解毒生肌

E. 温经和阳，祛风散寒

【答案】D

270. 具有腐蚀性的膏药是

- A. 千捶膏
- B. 太乙膏
- C. 咬头膏
- D. 阳和解凝膏
- E. 红油膏

【答案】C

271. 下列各项中属于提脓祛腐药的是

- A. 九一丹
- B. 红灵丹
- C. 八宝丹
- D. 白降丹
- E. 金黄散

【答案】A

272. 性偏寒凉，能消肿、解毒、提脓、祛腐、止痛的药物是

- A. 咬头膏
- B. 金黄膏
- C. 千捶膏
- D. 冲和膏
- E. 玉露膏

【答案】C

273. 对升丹过敏者，提脓祛腐时宜选用的外用药是

- A. 红灵丹
- B. 八宝丹
- C. 平胥丹
- D. 黑虎丹
- E. 九一丹

【答案】D

274. 常用挂线法来治疗的疾病是

- A. 内痔
- B. 脱肛
- C. 瘰癧
- D. 肛漏
- E. 脱疽

【答案】D

275. 红丝疔砭镰法的操作要点是

- A. 沿红线两头，针刺出血
- B. 梅花针沿红线打刺，微微出血
- C. 用三棱针从中挑断红线，微令出血
- D. 梅花针沿红线打刺，并加神灯照法

E. 用三棱针沿红线寸寸挑断，令微出血

【答案】E

276. 由于疮、疔引起的流注一般称

- A. 暑湿流注
- B. 髓窝流注
- C. 余毒流注
- D. 瘀血流注
- E. 湿痰流注

【答案】C

277. 乳痈热毒炽盛证最常用的方剂是

- A. 瓜蒌牛蒡汤加減
- B. 牛蒡解肌汤加減
- C. 透脓散加減
- D. 橘叶散加減
- E. 开郁散加減

【答案】C

278. 患者女性，45岁。结喉正中偏右有一半圆形包块，边界清楚，表面光滑，皮色如常，可随吞咽上下移动，其诊断是

- A. 气瘰
- B. 肉瘰
- C. 筋瘰
- D. 血瘰
- E. 石瘰

【答案】B

279. 关于圆癣的描述，哪项不正确

- A. 好发于长夏高温、潮湿季节
- B. 好发于面部、躯干及四肢近端
- C. 皮损为环形，边界清楚，中心消退
- D. 边缘处可见水疱、鳞屑、结痂
- E. 愈后常留有疤痕

【答案】E

280. 妇女终生不潮而能受孕者，称为

- A. 激经
- B. 暗经
- C. 季经
- D. 避年
- E. 居经

【答案】B

281. 对继发性痛经的患者，应注意询问的是

- A. 有无家族遗传史
- B. 有无盆腔炎史
- C. 居住环境
- D. 饮食嗜好
- E. 有无结核病史

【答案】B

282. 下列各项，不属于补益肾气法方剂的是

- A. 寿胎丸
- B. 济生肾气丸
- C. 归肾丸
- D. 肾气丸
- E. 补肾固冲丸

【答案】B

283. 下列各项，不属于月经病常见病因的是

- A. 寒热湿邪
- B. 跌仆损伤
- C. 内伤七情
- D. 房劳多产
- E. 饮食不节

【答案】B

284. 月经先期阴虚血热证的经血特点是

- A. 色淡红，质清稀
- B. 色深红，质稠
- C. 色淡暗，质清稀
- D. 色红，质黏稠
- E. 色深红，有血块

【答案】D

285. 治疗月经后期肾虚证，应首选的方剂是

- A. 大补元煎
- B. 当归地黄饮
- C. 补中益气汤
- D. 艾附暖宫丸
- E. 人参养荣汤

【答案】B

286. 患者月经周期延后，量少，色淡红，质清稀，小腹隐痛，喜暖喜按；腰酸无力，小便清长，大便稀溏；舌淡，苔白，脉沉迟或细弱。治疗应首选的方剂是

- A. 温经汤（《妇人大全良方》）
- B. 乌药汤

- C. 肾气丸
- D. 艾附暖宫丸
- E. 大补元煎

【答案】D

287. 月经先后无定期肝郁肾虚证的经血特点是

- A. 色红，质黏稠
- B. 色淡，质黏
- C. 色淡暗，质清稀
- D. 色淡暗，有血块
- E. 色红，有血块

【答案】D

288. 患者月经先后无定期，量少，色淡暗，质清；腰脊酸痛，头晕耳鸣，舌淡，苔白，脉细弱。治疗应首选的方剂是

- A. 肾气丸
- B. 六味地黄
- C. 大补元煎
- D. 固阴煎
- E. 归肾丸

【答案】D

289. 崩漏的常见病因是

- A. 脾虚、肾虚、肝郁、血热
- B. 湿热、肾虚、血热、血瘀
- C. 脾虚、肾虚、血热、血瘀
- D. 脾虚、肾虚、血热、气滞
- E. 气虚、肾虚、瘀热、血虚

【答案】C

290. 治疗闭经气滞血瘀证，应首选的方剂是

- A. 少腹逐瘀汤
- B. 桃红四物汤
- C. 乌药汤
- D. 血府逐瘀汤
- E. 柴胡疏肝散

【答案】D

291. 胎儿期体重增长快的阶段是

- A. 妊娠早期 4 周
- B. 妊娠早期 12 周
- C. 妊娠中期 10 周
- D. 妊娠中期 15 周
- E. 妊娠晚期 13 周

【答案】E

292. 按公式计算，5个月婴儿正常体重是

- A. 5kg
- B. 6.5kg
- C. 6.8kg
- D. 7kg
- E. 7.2kg

【答案】B

293. 按公式计算，5岁小儿正常身高是

- A. 85cm
- B. 90cm
- C. 95cm
- D. 100cm
- E. 110cm

【答案】E

294. 患儿，12个月。体重8.5kg，身长65cm，前囟闭合，乳牙7个，不会摆放积木。其中正常的是

- A. 体重
- B. 身长
- C. 前囟
- D. 乳牙萌出
- E. 精细运动

【答案】B

295. 热退疹出，疹细稠密如玫瑰红色者是

- A. 麻疹
- B. 风疹
- C. 奶麻
- D. 丹痧
- E. 瘾疹

【答案】C

296. 下列属于生理性黄疸的是

- A. 生后24h以内出现黄疸
- B. 黄疸持续时间足月儿>2周
- C. 早产儿可延迟至3~4周消退
- D. 足月儿血清总胆红素 $>221\mu\text{mol/L}$ ，早产儿 $>257\mu\text{mol/L}$
- E. 血清总胆红素每日上升幅度 $>85.5\mu\text{mol/L}$ 或每小时上升幅度 $>8.5\mu\text{mol/L}$

【答案】C

297. 患儿，6岁。喉核赤肿，咽喉疼痛，吞咽不利，发热重，鼻塞流涕，头痛身痛，舌红，

苔薄黄，脉浮数。应首选的方剂是

- A. 银翘马勃散
- B. 牛蒡甘桔汤
- C. 养阴清肺汤
- D. 普济消毒饮
- E. 荆防败毒散

【答案】A

298. 麻疹好发的年龄是

- A. 1 个月
- B. 1~5 个月
- C. 6 个月~5 岁
- D. 6~7 岁
- E. 10~12 岁

【答案】C

299. 患儿，3 岁。高热不退，面色青灰，烦躁不安，咳嗽气促，鼻翼扇动，喉间痰鸣，唇周发绀，皮疹稠密，疹色紫暗，大便秘结，小便短赤，舌红苔黄，脉数有力。治疗应首选的方剂是

- A. 定喘汤
- B. 二陈汤
- C. 大青龙汤
- D. 麻杏石甘汤
- E. 葶苈大枣泻肺汤

【答案】D

300. 患儿，5 岁。壮热不退，烦躁不安，口渴欲饮，面红目赤，皮疹稠密，疹色紫暗，疱浆混浊，可见出血性皮疹、紫癜，大便干结，小便短赤，舌质红绛，苔黄糙而干，脉数有力。治疗应首选的方剂是

- A. 银翘散
- B. 白虎汤
- C. 清营汤
- D. 玉女煎
- E. 清胃解毒汤

【答案】E



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

医学培训知名品牌
致力于建立完整的医学服务产业链



金鹰直播课



王牌直播课



王牌联盟班



上课提醒

医学优选,金英杰教育

全国免费咨询热线: 400-900-9392 客服及投诉电话: 400-606-1615

地址: 北京市海淀区学清路甲38号金码大厦B座22层