

2 0 2 2 执 业 医 师 考 试

# 模拟卷

2022年

青海临床医师资格考试

延期专用

## 第二单元

题型：A1/A2 型题

题目：

关于疾病监测的论述，正确的是

选项：

- A.疾病检测是一种横向研究
- B.疾病监测获得的信息应该纵向反馈，而不能横向反馈
- C.漏报调查属于主动监测
- D.常规报告系统是一种主动监测
- E.哨点监测属于被动监测

答案：C

解析：疾病监测包括被动监测、主动监测、哨点监测，被动监测是下级单位按照要求常规向上级单位报告监测需要的数据，上级单位被动接受，如法定传染病报告体系、癌症等级体系、突发公共卫生事件报告系统等；主动监测是指上级单位主动的、有计划的组织到下级单位收集资料或开展定期的调查收集资料，如传染病漏报调查、中国的历次全国范围的乙肝流行病学抽样、结核病流行病学抽样调查等；哨点监测是指为了更好的掌握特定公共卫生问题，依据疾病、健康状况或危险因素分布特定，选择若干有代表性的地区或人群作为监测点，按照统一要求收集资料，如选择有代表性的地区或艾滋病高危人群，用统一的检测方法开展艾滋病病毒抗体检测，同时收集高危行为信息，作为艾滋病哨点监测，故选C。

题型：A1/A2 型题

题目：

男，22岁。反复发作全身抽搐伴意识丧失1年，约1个月发作1次，从未服药物治疗，既往有脑外伤病史。查体：未见明显神经系统阳性体征。对该患者的发作性症状的正确处理原则是

选项：

- A.服药后不发作即停药
- B.首选多药联合治疗
- C.每天的总量一次性服用
- D.首选大剂量冲击
- E.首选单药治疗

答案：E

解析：癫痫药物治疗原则是：根据类型来选药，单药小剂量起始；合用避免同类药，毒副作用要监测；分次服用缓慢停，换药上新减老药。

题型：A1/A2 型题

题目：

公共卫生监测的目的不包括

选项：

- A.提供个体化的健康指导
- B.掌握公共卫生问题的分布和趋势
- C.查明公共卫生问题原因，采取干预措施
- D.预测疾病流行

E.评价干预措施效果

答案：A

解析：公共卫生监测的目的包括：①确定主要的公共卫生问题，掌握其分布和趋势②查明原因，采取干预措施③评价干预措施的效果④预测疾病流行⑤制定公共卫生策略和措施，故选A。

题型：A1/A2 型题

题目：

最容易引起枕骨大孔疝的颅内占位性病变是

选项：

- A.颞叶肿瘤
- B.侧脑室肿瘤
- C.第二脑室肿瘤
- D.鞍区肿瘤
- E.第四脑室肿瘤

答案：E

解析：脑肿瘤引发的颅高压常为慢性，但第四脑室肿瘤堵塞脑脊液回流，最易引发明显颅高压，进而导致枕骨大孔疝。

题型：A1/A2 型题

题目：

医护人员根据个体的健康危险因素指导制定健康维护计划的原则，以下原则不包括

选项：

- A.健康为导向
- B.统一性内容
- C.综合性利用
- D.动态性调整
- E.个人积极参与

答案：B

解析：个体化健康维护计划包括：①健康为导向的原则②个性化原则③综合利用的原则④动态性原则⑤个人积极参与的原则，故选B。

题型：A1/A2 型题

题目：

男，25岁。发作性意识丧失伴四肢抽搐8年。2天前自行调整治疗药物，次日出现频发发作，意识不清。应立即采取的处理措施是

选项：

- A.鼻饲苯妥英钠
- B.口服丙戊酸钠
- C.静脉注射地西洋
- D.肌注苯巴比妥
- E.气管切开

答案：C

解析：患者癫痫自行调整药物后出现癫痫频繁发作，发作之间意识不清或间隔小于30分钟，

符合癫痫持续状态。首选地西洋静脉注射。

题型：A1/A2 型题

题目：

下列哪项不是慢性肺源性心脏病失代偿期的临床表现

选项：

- A. 下肢水肿
- B. 神志恍惚
- C. 肝颈静脉回流征阳性
- D. 肺动脉瓣区第二心音亢进或分裂
- E. 肝脏肿大

答案：D

解析：A、C、E 为右心衰竭，B 为呼吸衰竭，均为肺心病失代偿期表现；P2 亢进或分裂提示肺动脉高压，如无右心衰竭和呼吸衰竭，诊断为肺心病代偿期。故选 D，不选 A、B、C、E。

题型：A1/A2 型题

题目：

不符合小脑病变临床表现的是

选项：

- A. 静止性震颤(+)
- B. 指鼻试验(+)
- C. 跟膝胫试验(+)
- D. 轮替试验(+)
- E. Romberg 征(+)

答案：A

解析：静止性震颤主要病变部位为锥体外系，比如帕金森病。锥体外系疾病还可表现为肌张力异常。其余均为小脑病变表现。如 Romberg 征主要由小脑蚓部病变导致，而指鼻、轮替、跟膝胫试验不能完成主要由同侧小脑半球病变引起

题型：A1/A2 型题

题目：

女，58 岁。COPD 病史 5 年，近 3 天因“感冒”症状加重伴双下肢水肿入院，诊断为慢性肺源性心脏病失代偿期。目前最重要的治疗措施是

选项：

- A. 控制感染+利尿剂
- B. 控制感染+无创正压通气
- C. 控制感染+低流量吸氧
- D. 控制感染+纠正酸碱失衡
- E. 控制感染+强心剂

答案：C

解析：慢性肺源性心脏病失代偿期的首要治疗原则为控制感染、通畅气道；低流量吸氧可减轻肺动脉痉挛、改善症状，同时避免加重 CO<sub>2</sub> 潴留。经上述治疗无效的右心衰竭，可适当应用利尿剂、洋地黄和血管扩张剂；纠正酸碱失衡为并发症治疗。故选 C，不选 A、B、D、E。

E。

题型：A1/A2 型题

题目：

与动眼神经功能不符合的是

选项：

- A. 睁眼
- B. 内视
- C. 外下视
- D. 晶状体变厚
- E. 瞳孔缩小

答案：C

解析：眼球运动滑车神经支配上斜肌，控制眼球向外向下运动；外展神经支配外直肌，控制眼球向外运动。其余向内（内直肌）、内上（上直肌）、内下（内直肌），外上（下斜肌），均由动眼神经支配。此外动眼神经还支配上睑提肌，控制眼睑上提；支配瞳孔括约肌缩小瞳孔；支配睫状肌，使晶状体变厚看近物。

题型：A1/A2 型题

题目：

男，28岁。支气管哮喘病史15年。平时规律吸入福莫特罗+布地奈德，症状控制较好。近3天患者过敏性鼻炎发作，哮喘症状出现波动。为增强抗炎效果，应加用的药物是

选项：

- A. 沙丁胺醇
- B. 噻托溴铵
- C. 孟鲁司特
- D. 色甘酸钠
- E. 茶碱缓释片

答案：C

解析：白三烯调节剂孟鲁司特、扎鲁司特具有抗炎、舒张支气管平滑肌作用，尤其适用于阿司匹林、运动性和伴有过敏性鼻炎的哮喘患者，故选C。A、B、E选项均为舒张支气管药物，无抗炎作用，可排除。色甘酸钠主要用于花粉、冷空气所致哮喘的预防，排除D。

题型：A1/A2 型题

题目：

男，30岁。每年发作性情绪低落1~2个月，自感孤立无援，认为自己毫无价值而悲观失望，觉得自己活在世上是多余的人。近来又出现明显的情绪低落，对该患者主要应防止

选项：

- A. 伤人毁物
- B. 攻击行为
- C. 自伤自杀
- D. 意外伤害
- E. 离家出走

答案：C

解析：从题干考虑抑郁症，情绪低落是核心症状，自感孤立无援（无助），认为自己毫无价

值而悲观失望（无望），觉得自己活在世上是多余的人（自罪），进一步发展是自杀，故答案选 C。A、B、D、E 项多见于精神分裂症患者，故不选 A、B、D、E。

题型：A1/A2 型题

题目：

慢性阻塞性肺疾病的特征性改变是

选项：

- A. 肺泡通气量下降
- B. 大气道阻力明显升高
- C. 气道、肺实质及肺血管的慢性炎症
- D. 气道结构重塑
- E. 肺泡弹性回缩力减退

答案：C

解析：慢性阻塞性肺疾病与气道和肺组织对香烟烟雾等有害气体或有害颗粒的异常慢性炎症反应有关，故应选 C；早期病变局限在细小气道，病变不完全可逆，逐渐侵及大气道，通气明显障碍，最大通气量下降，故不选 A、B；肺气肿加重导致大量肺泡周围的毛细血管受膨胀肺泡的挤压而退化，致使肺毛细血管大量减少，故不选 D；随病情发展，肺组织的弹性逐渐减退，肺泡持续扩大，回缩障碍，则残气量和残气量占肺总量的百分比增加，故不选 E。

题型：A1/A2 型题

题目：

以下不是抑郁症发作表现的是

选项：

- A. 随境转移
- B. 伴发焦虑
- C. 情绪低落
- D. 木僵状态
- E. 食欲、性欲减退

答案：A

解析：随境转移：属于思维形式障碍中的思维奔逸，主题虽环境而发生改变（随境转移，精神病学版 15 页），多见于躁狂症发作，故答案选 A。抑郁症：以情绪（心境）低落为核心症状、兴趣减退、快感缺失的三低，无望、无助、无用的三无，心理症状的自责（自罪、自杀的三自，同时伴躯体症状：睡眠障碍（早醒）、自主神经功能紊乱（焦虑、头晕、心悸）、精神运动性迟滞或激越（蓬头垢面、亚木僵或木僵状态）进食紊乱（食欲下降）、性功能障碍（性欲减退），B、C、D、E 项都是抑郁症表现，故答案不选 B、C、D、E。

题型：A1/A2 型题

题目：

剑突下心脏搏动增强多见于

选项：

- A. 急性左心衰竭
- B. 冠状动脉粥样硬化性心脏病
- C. 慢性肺源性心脏病
- D. 扩张型心肌病

E.肥厚型梗阻性心肌病

答案：C

解析：三尖瓣区出现收缩期杂音或剑突下可见明显心脏搏动见于右心室肥厚与扩大，故应选C。

题型：A1/A2 型题

题目：

碳酸锂中毒的早期症状为

选项：

- A.震颤、共济失调
- B.胃肠道反应
- C.高热、意识障碍
- D.粗大震颤
- E.血压下降、少尿

答案：B

解析：碳酸锂是一种心理稳定剂，主要用于躁狂发作治疗作用比较好。锂盐治疗量和中毒量接近，血锂浓度上限 $> 1.4\text{mmol/L}$ ，碳酸锂中毒的主要症状有：早期的消化系统表现：口干、烦渴、多饮、多尿、腹泻、恶心、呕吐、上腹部疼痛。神经系统不良反应有：双手细震颤、精神萎靡、无力、眼视物模糊、反射亢进。答案选B。不选A、C、D、E。

题型：A1/A2 型题

题目：

下列关于支气管哮喘的说法正确的是

选项：

- A.多为不可逆气流受限
- B.危重患者哮鸣音响亮而弥漫
- C.常在白天尤其是午后发作
- D.随病程延长会引起气道重构
- E.气道对刺激因素的反应性降低

答案：D

解析：典型症状为发作性伴有哮鸣音的呼气性呼吸困难。症状可在数分钟内发生，并持续数小时至数天，可经平喘药物治疗后缓解或自行缓解，故不选A；非常严重的哮喘发作，哮鸣音反而减弱，甚至完全消失，表现为“沉默肺”，是病情危重的表现，故不选B。夜间及凌晨发作或加重是哮喘的重要临床特征，故不选C；气道反应性增高是哮喘的共同病理生理特征，故不选E。

题型：A1/A2 型题

题目：

女，30岁。突然听到丈夫在车祸中去世的消息，表现为不认识亲人，凭空看到丈夫就站在自己面前，说：“你给我做饭吧”，随即进厨房做饭，家人劝阻也不理睬，两天后突然清醒，对病情经过不能完全回忆。该患者的状态是

选项：

- A.朦胧状态
- B.强迫状态

- C. 谵妄状态
- D. 幻觉妄想状态
- E. 抑郁状态

答案：D

解析：幻觉妄想状态：患者受到重大创伤事件（丈夫在车祸中去世）出现幻视（看到死去亲人）妄想（家人劝阻也不理睬）两天后突然清醒（小于6个月），符合幻觉妄想状态（幻觉为主，在幻觉基础上产生妄想），故答案选D。朦胧状态：意识清晰程度下降同时意识活动范围极度缩小，故不选A。强迫状态表现为观念的观念或思维，明知想法不必要，但控制不住自己，故不选B。在意识清晰度下降的同时出现意识内容变化（错觉、幻觉）属于谵妄状态，没有妄想症状，与题干不符，故不选C。抑郁状态表现为持久的心境低落与其处境不相称，故不选E。

题型：A1/A2 型题

题目：

不属于缓解哮喘急性发作药物的是  
选项：

- A. 静脉用糖皮质激素
- B. 抗胆碱能药物
- C. 短效茶碱
- D. 速效 $\beta_2$ 受体激动剂
- E. 白三烯调节剂

答案：E

解析：白三烯调节剂属于抗炎药物，主要用于哮喘的预防，是目前除吸入型糖皮质激素外，唯一可单独应用的哮喘控制性药物，尤其适用于伴有过敏性鼻炎的哮喘患者，故选E。其余都属于缓解哮喘急性发作的药物。

题型：A1/A2 型题

题目：

病理性赘述常见于  
选项：

- A. 强迫症
- B. 谵妄状态
- C. 躁狂发作
- D. 精神分裂症
- E. 老年性痴呆

答案：E

解析：病理性赘述：属于思维形式障碍，思维联想活动迂回曲折，联想枝节过多，过分详述，言语啰嗦，见于器质性精神障碍（如癫痫）、老年痴呆，故答案选E。不见于其他四症状，故不选A、B、C、D。

题型：A1/A2 型题

题目：

痰定量培养分离肺部感染的致病菌，其浓度标准应  
选项：

- A.  $\geq 104$ cfu/ml
- B.  $\geq 105$ cfu/ml
- C.  $\geq 106$ cfu/ml
- D.  $\geq 107$ cfu/ml
- E.  $\geq 108$ cfu/ml

答案：D

解析：定量培养分离的致病菌或条件致病菌浓度 $\geq 107$ cfu/ml，可认为是肺炎的致病菌， $\leq 104$ cfu/ml 为污染菌，介于两者之间的应重复痰培养。故应选 D。

题型：A1/A2 型题

题目：

医生问：“你想什么？”患者答：“详细地讲就是细菌问题，细菌在我们脑子里有些冲动力空气不大新鲜,也不奇怪，冻死苍蝇。”该患者的精神症状属于

选项：

- A.思维不连贯
- B.音联意联
- C.思维破裂
- D.强制性思维
- E.思维奔逸

答案：C

解析：思维破裂：患者的言语或书写内容有结构完整的句子，但各句含意互不相关，语句堆积，不能理解，题干符合此概念，故选 C。思维不连贯：在意识障碍背景下出现言语支离破碎和杂乱无章状态;故不选 A。音联意联：出现在思维形式障碍中思维奔逸和原发性妄想中，属于思维内容障碍，题干不符合，故不选 B。强制性思维：强制性大量涌现无现实意义的联想，故不选 D。思维奔逸：速度快、语量多、音联意联，故不选 E。

题型：A1/A2 型题

题目：

患者，男性，26岁。发热，咳嗽2个月，胸部X线片示：左上肺不规则片状阴影，予抗结核治疗1月余。查体：T 36.5℃，巩膜稍黄染。双肺未闻及干湿啰音。血WBC  $4.3 \times 10^9/L$ 。N 0.55。肝功能检查示：ALT、AST正常，总胆红素  $40.6 \mu\text{mol/L}$ ，直接胆红素  $17.8 \mu\text{mol/L}$ 。该患者现停用的药物是

选项：

- A.利福平
- B.异烟肼
- C.吡嗪酰胺
- D.乙胺丁醇
- E.链霉素

答案：A

解析：肺结核患者应用抗结核药物治疗后出现巩膜稍黄染，考虑肝功能损伤，最常见引起的药物是利福平，一过性转氨酶上升加保肝药，出现黄疸立即停药，故选 A。异烟肼最常见副作用为周围神经炎，一旦出现应先予对症处理，口服维生素 B，故不选 B；吡嗪酰胺不良反应主要为高尿酸血症，故不选 C；乙胺丁醇不良反应为视神经炎，故不选 D；链霉素不良反应为耳毒性、前庭功能损害和肾毒性，故不选 E。

题型：A1/A2 型题

题目：

男，65 岁。近半年来记忆力渐差，刚讲过的话就忘记了，把别人做的事情说成是自己做的，出门找不到回家路，且有时在深夜看到有人影晃动，大量饮酒 10 年，最可能的诊断是选项：

- A. Wernicke 脑病
- B. 酒精性狂想综合征
- C. 酒精性痴呆
- D. 科萨科夫综合征
- E. 酒精性幻觉症

答案：D

解析：科萨科夫综合征：记忆障碍（近半年来记忆力渐差，刚讲过的话就忘记了）、虚构（把别人做的事情说成是自己做的）、定向障碍（出门找不到回家路），故答案选 D。Wernicke 脑病=维生素 B1 缺乏+眼球震颤+眼球不能外展+意识障碍伴定向+记忆+震颤谵妄。酒精性痴呆=持续性智力减退（失认、失语、失用）伴记忆障碍+人格改变。酒精性幻觉症=突然停饮后（48 小时后）出现的幻觉（+其他精神症状）。酒精性妄想症=意识清醒下，出现的妄想（嫉妒妄想，其他精神症状）故不选 A、B、C、E 项。

题型：A1/A2 型题

题目：

女，62 岁。反复咳嗽、痰中带血伴低热 1 个月余。查体：气管向左移位，左肺可闻及细湿啰音。为明确诊断，首选的检查是

选项：

- A. 结核抗体检测
- B. 胸部 X 线
- C. 支气管镜
- D. 痰结核分枝杆菌培养
- E. 结核菌素试验

答案：B

解析：患者反复咳嗽、痰中带血伴低热 1 个月余，气管向左移位，考虑肺结核、胸腔积液可能性大，确诊首选胸部 X 线，故应选 B。结核抗体检测可提示结核杆菌感染，但不能明确肺结核诊断，故不选 A；支气管镜在结核病常用于支气管结核和淋巴结支气管瘘的诊断，故不选 C；痰结核分枝杆菌培养确诊价值最大，但阳性率不高，一般不作为诊断首选，故不选 D；结核菌素试验可确定结核分枝杆菌感染，但不能明确肺结核，故不选 E。

题型：A1/A2 型题

题目：

“定向力”是指

选项：

- A. 患者对自己精神状态的认识和判断能力
- B. 一个人对时间、地点、人物以及自身状态的认识能力
- C. 患者在妄想支配下持续地坚持某些行为，具有极大的顽固性
- D. 主动注意的兴奋性增高，表现为过分关注某些事物

E.身体内部某--部位或某一脏器虚幻的知觉体验

答案：B

解析：定向力：一个人对时间、地点、人物以及自身状态的认识能力，故答案选B。患者对自己精神状态的认识和判断能力是自知力概念，故不选A。患者在妄想支配下持续地坚持某些行为，具有极大的顽固性属于意志增强症状，故不选C。

主动注意的兴奋性增高，表现为过分关注某些事物属于注意障碍中注意增强概念，故不选D。身体内部某--部位或某一脏器虚幻的知觉体验属于知觉体验中内脏幻觉，故不选E。

题型：A1/A2 型题

题目：

急性心包炎典型的心包摩擦音的特点是

选项：

A.与呼吸时相一致

B.三相摩擦音

C.侧胸壁听诊最明显

D.深吸气时摩擦音减弱

E.心包积液增多时摩擦音相应增强

答案：B

解析：急性心包炎典型的心包摩擦音可听到与心房收缩、心室收缩和心室舒张相一致的三个成分，称为三相摩擦音（B）。多位于心前区，以胸骨左缘第3~4肋间、胸骨下端、剑突区较为明显。深吸气后增强。积液增多将两层心包分开时，摩擦音消失。胸膜摩擦音与呼吸相一致。

题型：A1/A2 型题

题目：

初孕妇，26岁。于妊娠34周出现头痛、眼花。血压 180 / 100mmHg，尿蛋白(++)，眼底动静脉比为 1: 2，视网膜水肿。诊断应是

选项：

A.轻度子痫前期

B.重度子痫前期

C.子痫

D.妊娠合并原发性高血压

E.妊娠合并肾性高血压

答案：B

解析：妊娠期高血压疾病分为：妊娠期高血压、轻度子痫前期、重度子痫前期、子痫、慢性高血压并发子痫前期、妊娠合并慢性高血压。妊娠34周，血压高，头痛、眼花，可诊断为妊娠期高血压疾病，尿蛋白(++)，眼底动静脉比为 1: 2，故可为重度子痫前期。妊娠期高血压尿蛋白(-)，轻度子痫前期尿蛋白(+)。临床表现除高血压及蛋白尿外，出现头痛、眼花、恶心、胃区疼痛及呕吐等症状，预示即将发生抽搐。

题型：A1/A2 型题

题目：

各类休克共同的病理生理改变是

选项：

- A.大量出血或体液丢失
- B.迷走神经过度兴奋
- C.有效循环血容量减少
- D.抗原-抗体反应
- E.体液积存于第三间隙

答案：C

解析：休克的病理生理改变是由于有效循环血容量锐减（C）及组织灌注不足，以及产生炎症介质。

题型：A1/A2 型题

题目：

妊娠剧吐无需终止妊娠的临床情况是

选项：

- A.体温升高，持续在 38℃ 以上
- B.持续黄疸
- C.持续蛋白尿
- D.心动过缓
- E.伴发 Wernicke 综合征

答案：D

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：

患者，男，58 岁。因右下肢剧烈疼痛、麻木、发凉、苍白 6 小时就诊。既往有多年房颤病史，最可能的诊断是

选项：

- A.血管闭塞性脉管炎
- B.动脉硬化性闭塞症
- C.动脉栓塞
- D.雷诺氏病
- E.深静脉血栓形成

答案：C

解析：患者有房颤史，突然出现下肢剧烈疼痛、麻木、发凉、苍白（5P 征象），最可能的诊断是动脉栓塞（C）。血栓闭塞性脉管炎多见于青年，有吸烟史，可有游走性静脉炎史，主要表现为间歇性跛行。动脉硬化性闭塞症常见于老年人，三高史，主要表现为间歇性跛行。雷诺氏病常于情绪波动时发病，受累部位程序性出现苍白及发冷、青紫及疼痛、潮红后复原。深静脉血栓形成患肢皮温升高，伴肿胀和压痛。

题型：A1/A2 型题

题目：

初孕妇，妊娠 38 周，空腹血糖 5.3mmol/L，估计胎儿体重 > 4kg。建议采取的分娩方式是

选项：

- A.阴道试产，放宽剖宫产指征
- B.剖宫产

- C.等待自然分娩
- D.产钳助产
- E.预防性引产

答案：B

解析：糖尿病不是剖宫产指征。选择性剖宫产指征：伴有微血管病变及其他产科指征，如怀疑巨大儿、胎盘功能不良、胎位异常等。妊娠期血糖控制不佳，胎儿偏大或既往有死胎、死产史者，应适当放宽剖宫产手术指征。

题型：A1/A2 型题

题目：

治疗心动过缓-心动过速综合征，首选

选项：

- A.起搏治疗
- B.β受体阻滞剂
- C.胺碘酮
- D.阿托品
- E.钙拮抗剂

答案：A

解析：心动过缓-心动过速综合征最常见于病态窦房结综合征，治疗首选心脏起搏器（A对，为本题答案）。同时排除BCDE。

题型：A1/A2 型题

题目：

不属于急性胎儿窘迫的重要临床征象的是

选项：

- A.胎心基线率<100bpm
- B.胎动<6次/2小时
- C.重度变异减速
- D.频繁晚期减速
- E.胎儿头皮血pH<7.5

答案：E

解析：急性胎儿窘迫主要表现：出现胎心率基线无变异并反复出现晚期减速或变异减速或胎心过缓（<110次/分）；羊水胎粪污染；胎动异常；酸中毒，胎儿头皮血气PH<7.2，PO<sub>2</sub><10mmHg，PCO<sub>2</sub>>60mmHg。

题型：A1/A2 型题

题目：

下列哪种脉搏见于房颤患者

选项：

- A.吸停脉
- B.水冲脉
- C.交替脉
- D.脱落脉
- E.短绌脉

答案：E

解析：吸停脉临床意义：大量心包积液、右心衰、严重哮喘；水冲脉临床意义：主动脉瓣关闭不全、甲亢、动脉导管未闭；交替脉临床意义：左心衰；脱落脉临床意义：二度房室传导阻滞；短绌脉临床意义：房颤（E对，为本题答案）

题型：A1/A2 型题

题目：

属于女性生殖系统生理的项目，正确的是  
选项：

- A.排卵发生在月经周期第 14 天
- B.月经来潮时基础体温升高 0.3~0.5℃
- C.月经期子宫内膜自基底层脱落
- D.排卵后的卵泡称为闭锁卵泡
- E.28 天月经周期第 21 天为分泌期子宫内膜

答案：E

解析：排卵发生在下次月经来潮前 14 天，故 A 错误。：排卵后受孕激素影响基础体温升高 0.3~0.5℃，故 B 错误。月经期子宫内膜自功能层脱落，故 C 错误。妇女生育期每月发育一批卵泡，其中一般只有一个优势卵泡可达完全成熟，并排出卵子。其余的卵泡发育到一定程度通过细胞凋亡机制而自行退化，称卵泡闭锁。因此 D 错误。月经周期第 15~28 日为分泌期。因此 E 正确。

题型：A1/A2 型题

题目：

关于右心室心肌梗死，下列处理错误的是  
选项：

- A.引起右心衰竭者宜用利尿药
- B.伴有房室传导阻滞者可予以临时起搏
- C.发生右心衰竭伴低血压时宜扩张血容量
- D.低血压难纠正时可用多巴酚丁胺
- E.不宜使用硝酸酯类药物

答案：A

解析：右心室心肌梗死时，右心室收缩力下降，导致低血压，因此禁用利尿剂和硝酸酯类药物，故本题答案 A。

题型：A1/A2 型题

题目：

关于雌、孕激素生物合成与代谢，正确的是  
选项：

- A.卵巢不能合成雌酮
- B.孕激素来自雄烯二酮
- C.雌三醇活性最强
- D.甾体激素主要在肝脏代谢
- E.雌激素是由颗粒细胞单独产生

答案：D

解析：卵巢合成的激素主要是雌激素和孕激素，及少量雄激素，均为甾体激素。甾体激素的前身是孕烯醇酮，孕烯醇酮可进一步合成孕激素，雄烯二酮是孕激素的中间代谢产物，故 B 项错误。雌激素主要由卵泡的内膜细胞和颗粒细胞共同合成；包括雌酮、雌二醇和雌三醇，其中雌二醇活性最强。故 C、E 选项错误。甾体激素主要在肝脏代谢，从肾排出，故正确选项为 D。

题型：A1/A2 型题

题目：

二尖瓣狭窄时超声心动图表现为

选项：

- A.二尖瓣前叶在收缩期前移
- B.二尖瓣瓣环扩大
- C.二尖瓣前叶呈“城墙样”改变
- D.二尖瓣反流
- E.二尖瓣瓣口面积 5cm<sup>2</sup>

答案：C

解析：A.二尖瓣前叶在收缩期前移临床意义：肥厚梗阻型心肌病；B.二尖瓣瓣环扩大临床意义：左心室扩大；C.二尖瓣前叶呈“城墙样”改变临床意义：二尖瓣狭窄；D.二尖瓣反流临床意义：二尖瓣关闭不全；E.二尖瓣瓣口面积 5cm<sup>2</sup> 临床意义：正常的二尖瓣瓣口面积 4-6cm<sup>2</sup>

题型：A1/A2 型题

题目：

下列骨盆类型中，临产后最可能允许试产的是

选项：

- A.类人猿型
- B.男型
- C.扁平型
- D.漏斗型
- E.严重畸形骨盆

答案：C

解析：扁平型骨盆入口呈横扁圆形，骨盆入口前后径短，临界性狭窄多数可以经阴道分娩，可试产。其余均不宜试产。

题型：A1/A2 型题

题目：

肥厚梗阻型心肌病患者心脏杂音增强的情况是

选项：

- A.使用  $\beta$  受体拮抗剂
- B.含服硝酸甘油
- C.使用钙通道阻滞剂
- D.卧位抬高下肢
- E.取蹲位

答案：B

解析：增加心肌收缩力或减轻心脏后负荷的措施：①杂音增强：含服硝酸甘油、洋地黄、作

Valsalva 动作或取站立位（因此答案为 B）。②杂音减弱：β 受体拮抗剂、钙离子拮抗剂、取蹲位、抬腿（排除 ACDE）。

题型：A1/A2 型题

题目：

以下哪项不是 hCG 的功能

选项：

- A.维持月经黄体寿命，使之增大为妊娠黄体
- B.促进胰岛素生成，使母血胰岛素值增高
- C.与母体甲状腺细胞 TSH 受体结合，刺激甲状腺活性
- D.避免胚胎滋养层被母体淋巴细胞攻击
- E.促进雄激素芳香化转化为雌激素

答案：B

解析：本题中 A、C、D、E 选项均是 HCG 的作用，而 B 选项促进胰岛素生成，使母血胰岛素值增高为人胎盘生乳素的作用，故本题选 B。

题型：A1/A2 型题

题目：

休克未得到纠正，则尿量应在

选项：

- A.10ml/h
- B.17ml/h
- C.30ml/h
- D.25ml/h
- E.50ml/h

答案：D

解析：尿量（ml/h）<20 临床意义：急性肾衰；尿量（ml/h）<25 临床意义：休克；尿量（ml/h）>30 临床意义：休克被纠正；尿量（ml/h）>40 临床意义：见尿补钾

题型：A1/A2 型题

题目：

妊娠晚期心血管系统生理功能变化，错误的是

选项：

- A.心脏容量增加 10%左右
- B.妊娠晚期心率增快而有心悸
- C.叩诊心浊音界稍扩大
- D.心尖部可闻及柔和吹风样收缩期杂音
- E.增大的子宫压迫下腔静脉使血液回流受阻，心搏量减少

答案：E

解析：妊娠晚期心血管系统生理功能变化有：心脏位置向左、上、前方移位；心脏容量至妊娠末期约增加 10%；心率于妊娠晚期休息时每分钟增加 10~15 次；心尖区可闻及 I~II 级柔和吹风样收缩期杂音。心排出量自妊娠 10 周逐渐增加，至妊娠 32~34 周达高峰；临产后在第二产程心排出量显著增加。由于子宫压迫下腔静脉，下肢、外阴及直肠静脉压增高，加之妊娠期静脉壁扩张，孕妇易发生下肢、外阴静脉曲张和痔。故本题 E 选项说法错误。

题型：A1/A2 型题

题目：

功能性消化不良按罗 III 标准，病程应

选项：

- A.少于 6 个月
- B.超过 6 个月
- C.少于 3 个月
- D.超过 3 个月
- E.超过 1 年

答案：B

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：

子宫颈癌最常见的转移途径是

选项：

- A.直接蔓延
- B.淋巴转移
- C.血行转移
- D.直接蔓延和种植
- E.直接蔓延和淋巴转移

答案：A

解析：①直接蔓延：癌组织向上浸润破坏整段子宫颈，但很少侵犯子宫体。向下可累及阴道穹隆及阴道壁，向两侧可侵及宫旁及盆壁组织，若肿瘤侵犯或压迫输尿管可引起肾盂积水。晚期可侵及膀胱，向后可累及直肠。②淋巴道转移：癌组织首先转移至子宫旁淋巴结，然后依次至闭孔、髂内、髂外、髂总、腹股沟及骶前淋巴结，晚期可转移至锁骨上淋巴。③血行转移：血行转移较少见，晚期可经血行转移到肺、骨及肝。

题型：A1/A2 型题

题目：

有关胃食管反流病发病机制的论述，不正确的是

选项：

- A.胃酸分泌过多
- B.抗酸反流屏障结构与功能异常
- C.胃酸、胃蛋白酶等对食管黏膜的损害
- D.食管黏膜屏障功能降低
- E.食管酸清除作用降低

答案：A

解析：胃酸分泌过多为十二指肠溃疡的发病机制，故答 A。B、C、D、E 均可导致胃食管反流病的发生，故不答。

题型：A1/A2 型题

题目：

女，32岁。体检发现左侧附件区囊性肿块。腹腔镜手术剥离左侧卵巢子宫内膜异位囊肿，术后不宜使用的药物为

选项：

- A.孕激素
- B.GnRH-a
- C.达那唑
- D.孕烯三酮
- E.雌激素

答案：E

解析：孕激素可以通过抑制垂体促性腺激素分泌，造成无周期性的低雌激素状态，导致高孕激素性闭经，称为假孕疗法。孕烯三酮、达那唑均可抑制FSH、LH峰值，使体内雌激素水平降低导致子宫内膜萎缩，称为假绝经疗法。促性腺激素释放激素激动剂（GnRH-a）可竞争性抑制垂体GnRH受体，使促性腺激素释放减少，卵巢激素水平降低而闭经，称为药物性卵巢切除；以上方法均可治疗子宫内膜异位症。雌激素可促进子宫内膜增生，故禁用于子宫内膜异位症的治疗。

题型：A1/A2型题

题目：

下列符合A型胃炎特点的选项为

选项：

- A.50%患者壁细胞抗体(+)
- B.同B型胃炎相比更容易癌变
- C.血清促胃液素水平正常或偏低
- D.多由幽门螺杆菌感染引起
- E.多见于胃底、胃体部

答案：E

解析：A型胃炎多见于胃底、胃体部，故答E。A型胃炎90%患者壁细胞抗体(+)，故不答A。A、B型胃炎均为萎缩性胃炎，相比于非萎缩性胃炎更容易癌变，故不答B。A型胃炎血清促胃液素水平增高，故不答C。A型胃炎多由自身免疫引起，非幽门螺杆菌，故不答D。

题型：A1/A2型题

题目：

为预防子宫内膜异位症，下述措施错误的是

选项：

- A.尽量避免多次的宫腔手术操作
- B.不孕症患者输卵管通畅试验禁止在月经前进行
- C.宫颈及阴道手术不宜在月经前进行
- D.吸宫术结束时应在高负压下迅速拔出吸管
- E.缝合子宫壁时避免缝线穿过子宫内膜层

答案：D

解析：负压不宜过高，避免突然将吸管拔出。

题型：A1/A2型题

题目：

不符合肝硬化患者肝功能改变的是  
选项：

- A.肝脏对致热因子灭活减少
- B.肝脏对雄激素灭活减少
- C.肝脏对醛固酮灭活减少
- D.肝脏对抗利尿激素灭活减少
- E.肝脏对促黑细胞激素灭活减少

答案：E

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：

关于子宫脱垂的曼氏手术，不正确的  
选项：

- A.适用于年龄较大的患者
- B.手术缩短主韧带
- C.手术修补阴道前后壁
- D.适用于宫颈较长的患者
- E.手术应切除部分宫颈

答案：A

解析：对于年轻宫颈延长子宫脱垂患者可行曼氏手术，包括阴道前后壁修补、主韧带缩短及宫颈部分切除术。

题型：A1/A2 型题

题目：

对鉴别肝硬化腹水和心包炎腹水最有价值的体征是  
选项：

- A.下肢水肿
- B.肝颈静脉回流征
- C.肝脏肿大
- D.心率增快
- E.腺肿大

答案：B

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：

王女士，停经 9 周，行人工流产手术过程中出现恶心呕吐、心动过缓、心律不齐、面白大汗、头昏胸闷、血压下降等症状，最可能原因是

选项：

- A.迷走神经兴奋
- B.交感神经兴奋
- C.术中出血过多
- D.子宫穿孔

E.羊水栓塞

答案：A

解析：人工流产综合征为迷走神经兴奋症状，应立即停止手术，吸氧，严重者用阿托品 0.5-1mg 静脉注射。

题型：A1/A2 型题

题目：

男，45 岁。5 年来每于餐后半小时出现上腹饱胀、疼痛，持续约 2 小时后可自行缓解，常有反酸、暖气、偶有大便颜色发黑。近期行上消化道 X 线钡剂造影提示胃窦小弯侧 1 cm 大小壁外龛影，边缘光滑。该患者若手术治疗，常采用的术式是

选项：

A.胃大部切除术（毕 II 式吻合）

B.胃大部切除术（毕 I 式吻合）

C.高选择性迷走神经切断术

D.全胃切除术

E.选择性迷走神经切除术

答案：B

解析：患者既往长期规律上腹痛病史 5 年，多于餐后加重，2 小时后自行缓解，且近期上消化道钡剂造影提示胃窦小弯侧 1 cm 大小壁外龛影，边缘光滑，故诊断为胃溃疡，确有必要手术时可选择胃大部切除术（毕 I 式吻合）治疗，故答 B。胃大部切除术（毕 II 式吻合）适用于十二指肠溃疡，故不答 A。高选择性迷走神经切断术及选择性迷走神经切除术目前临床少用，故不答 C、E。全胃切除术术后并发症繁多，显然不适合题干中胃溃疡的治疗，故不答 D。

题型：A1/A2 型题

题目：

王女士 30 岁，G1P0，停经 39 周，规律宫缩 8 小时。查体：下腹压痛明显并出现凹陷。枕左前位，胎心 148 次/分。宫口开大 5cm，胎先露-2，预测胎儿体重 3300g。应首先采取的措施是

选项：

A.哌替啶肌肉注射

B.观察产程进展

C.地西洋静推

D.缩宫素静滴

E.肥皂水灌肠

答案：A

解析：下腹部压痛明显并出现凹陷，提示病理性缩复环，为先兆子宫破裂表现。此时应抑制宫缩，肌内注射哌替啶 100mg，或静脉全身麻醉，尽快手术。

题型：A1/A2 型题

题目：

女，48 岁。既往阵发性右上腹痛 6 年，餐后发作，每次发作约持续 1-3 小时，伴有恶心，无呕吐，时有腹胀。身高 161cm，体重 86Kg。首选辅助检查为

选项：

- A. B 超
- B. 胃镜
- C. 立位腹平片
- D. 腹部 CT
- E. X 线钡剂造影

答案：A

解析：患者中年女性，体型肥胖，既往阵发性右上腹痛 6 年，每于餐后发作，伴恶心，腹胀，考虑胆石症，首选 B 超，故答 A。胃镜不适用于胆石症的辅助检查，故不答 B。立位腹平片适用于消化性溃疡穿孔等疾病的检查，故不答 C。腹部 CT 对诊断腹部肿瘤及其转移、浸润情况有一定价值，故不答 D。X 线钡剂造影适用于消化性溃疡的检查，不适用于胆道疾病，故不答 E。

题型：A1/A2 型题

题目：

王女士，30 岁，初产妇，经阴分娩 1 男婴。胎儿娩出后 8 分钟产妇出现大量阴道流血，约 700ml，可凝固。此时胎盘已娩出，检查胎盘胎儿面有断裂血管。产妇出血原因最可能是选项：

- A. 凝血功能障碍
- B. 子宫收缩乏力
- C. 膀胱充盈
- D. 胎盘植入
- E. 副胎盘残留

答案：E

解析：胎儿娩出几分钟后出现阴道流血，考虑胎盘因素。胎盘已娩出且有断裂血管，考虑胎盘残留。

题型：A1/A2 型题

题目：

胆囊结石患者行胆囊切除时，应同时行胆总管探查术的情况是选项：

- A. 胆总管扩张直径超过 0.5cm
- B. 胆囊结石直径  $\geq 2\sim 3\text{cm}$
- C. 伴有梗阻性黄疸
- D. 伴有 1cm 以上的胆囊息肉
- E. 充满型胆囊结石

答案：C

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：

导致子宫破裂的最常见原因是

选项：

- A. 梗阻性难产
- B. 瘢痕子宫

- C.缩宫素剂量过大
- D.子宫发育异常
- E.产科手术损伤

答案：B

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：

急性结石性胆囊炎超声检查的典型征象是

选项：

- A.双边征
- B.杯口征
- C.落雪征
- D.木梳征
- E.跳跃征

答案：A

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：

张女士，26岁。妊娠38周在家中经阴道分娩，产后血性恶露持续10天，无异味。患者于一天前出血突然增多，无寒战、高热。查体：子宫如孕3个月大，质软，压痛不明显，宫口能容2指。其阴道流血最可能原因是

选项：

- A.子宫颈裂伤
- B.蜕膜残留
- C.子宫脱垂
- D.子宫内膜炎
- E.胎盘、胎膜残留

答案：E

解析：胎盘胎膜残留是经阴分娩后晚期产后出血最常见的原因，多产产后10日左右发生。

题型：A1/A2 型题

题目：

女，50岁。左侧腹股沟疝嵌顿12小时。查体：急性病貌，腹部胀满明显，左侧腹股沟下方可见4×4cm大小的隆起肿块，压痛明显。术中可见：嵌顿肠管呈紫黑色，刺激后无蠕动。以下正确的术式为

选项：

- A.切除嵌顿肠管+单纯疝囊高位结扎术
- B.切除嵌顿肠管+McVay法疝修补术
- C.切除嵌顿肠管+Shouldice法疝修补术
- D.切除嵌顿肠管+Halsted法疝修补术
- E.嵌顿肠管送回腹腔+McVay法疝修补术

答案：A

解析：本患者左侧腹股沟疝嵌顿 12 小时。术中可见：嵌顿肠管呈紫黑色，刺激后无蠕动，考虑肠管已嵌顿坏死，因肠管嵌顿坏死常伴局部严重感染，感染又常使修补失败，故通常只采取单纯疝囊高位结扎，避免施行修补术，故答 A，不答 B、C、D、E。

题型：A1/A2 型题

题目：

关于子宫内膜异位症的治疗，下列哪项错误？

选项：

- A.期待治疗
- B.假孕治疗
- C.假绝经治疗
- D.腹腔镜手术
- E.放射治疗

答案：E

解析：子宫内膜异位症的治疗主要方法有手术、药物治疗、联合治疗三种。其中药物治疗主要是假孕治疗、假绝经治疗。症状轻的可以期待治疗，即定期随访+非甾体抗炎药止痛。放射治疗不是子宫内膜异位症的治疗方法。

题型：A1/A2 型题

题目：

对无腹腔内大出血的腹部闭合性损伤患者行开腹探查术，现已探查肝、脾、膈肌、胆囊、胃以及十二指肠球部，接下来应探查

选项：

- A.十二指肠降部
- B.结肠
- C.回肠
- D.空肠
- E.十二指肠水平部

答案：D

解析：如果没有腹腔内大出血，则应对腹腔脏器进行系统、有序的探查，做到既不遗漏伤情，又避免不必要的重复探查。探查次序依次为：肝、脾、膈肌、胆囊、胃、十二指肠第一段、空肠、回肠、大肠及其系膜、盆腔脏器、胃后壁、胰腺、查十二指肠二、三、四段。故本题答 D。

题型：A1/A2 型题

题目：

女，63 岁。阴道脱出物 3 个月。查体：屏气用力时宫颈及部分宫体脱出阴道口外，宫颈前唇有一溃疡。首选的治疗是

选项：

- A.曼氏手术
- B.经阴道子宫全切除术
- C.阴道纵隔成形术
- D.子宫托
- E.腹腔镜圆韧带缩短术

答案：B

解析：子宫脱垂的治疗应个体化。对于年轻宫颈延长，希望保留子宫的Ⅱ、Ⅲ度患者可行曼氏手术（Manchester 手术），即阴道前后壁修补、主韧带缩短及宫颈部分切除术。经阴道子宫全切除及阴道前后壁修补术：适用于Ⅱ、Ⅲ度子宫脱垂，且年龄较大、无生育要求者。纵隔形成术（LeFort 手术）：仅适用于无性生活要求者、年老体弱不能耐受较大手术，且子宫无恶变可疑者。子宫托：适用于全身情况较差不宜手术者；其作用支持子宫和阴道壁，禁用于局部炎症、溃疡。本例患者年龄较大、无生育要求，应行经阴道子宫全切除术，故选 B。

题型：A1/A2 型题

题目：

色素沉着息肉综合征属于

选项：

- A.错构瘤性肠息肉
- B.化生性肠息肉
- C.炎性肠息肉
- D.腺瘤性肠息肉
- E.血吸虫性肠息肉

答案：A

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：

婴儿期和幼儿期的小儿共有特点是

选项：

- A.智能发育迅速
- B.容易发生意外伤害
- C.性格形成的关键时期
- D.容易发生免疫性疾病
- E.容易发生营养障碍性疾病和腹泻病

答案：E

解析：①婴儿期：自出生到 1 周岁之前。特点：此期是生长发育极其旺盛的阶段，对营养的需求相对较高，各系统器官生长发育虽在持续进行，但不够成熟，尤其是消化系统，故易发生消化道功能紊乱；同时，婴儿体内来自母体的抗体逐渐减少，自身免疫功能不成熟，易发生各种感染和传染性疾病。②幼儿期：自 1 岁到满 3 周岁之前，体格生长发育速度较前稍减慢，但智能发育迅速，此阶段消化功能仍不完善，营养的需求量相对较高；此期小儿对危险的识别和自我保护能力有限，易发生意外伤害。结合本题题干，正确答案选 E。智能发育迅速见于幼儿期，不见于婴儿期，故排除 A。幼儿期易发生意外伤害，不发生于婴儿期，故排除 B。学龄前期是智力发育加速，性格形成的关键时期；有关免疫反应疾病，如肾炎、结缔组织病等等，在学龄前期开始增多，均不发生于婴儿和幼儿期，故排除 C、D。

题型：A1/A2 型题

题目：

升结肠癌的主要临床表现为

选项：

- A.黑便（贫血）
- B.里急后重
- C.胆道狭窄
- D.便秘
- E.肠梗阻

答案：A

解析：实记题。升结肠癌属于右半结肠癌范畴，右半结肠肠梗阻发生少，但容易破溃出血和继发感染。腹痛、排便性状改变、腹块、贫血、消瘦、低热或恶病质表现较左侧多见，故答A，不答B、C、D、E。

题型：A1/A2 型题

题目：

符合小儿出生后运动发育规律的是

选项：

- A.由远及近
- B.自下而上
- C.从全掌抓握到手指拾取
- D.从手到臂
- E.从脚到腿

答案：C

解析：小儿出生后运动发育规律：先抬头后抬胸，再会坐立行（由上到下）；从臂到手，从腿到脚的活动（由近到远）；从全掌抓握到手指拾取（由粗到细）；先画直线后画圆圈图形（简单到复杂）。故本题正确答案为C，排除ABDE。

题型：A1/A2 型题

题目：

急性阑尾炎最常见的病因是

选项：

- A.阑尾管腔阻塞
- B.嗜银细胞增生
- C.肠道细菌入侵
- D.阑尾血运障碍
- E.淋巴滤泡增生

答案：A

解析：实记题。阑尾管腔阻塞是急性阑尾炎最常见的病因，故答A，不答B、C、D、E。

题型：A1/A2 型题

题目：

以下哪项符合单纯型热性惊厥的特点？

选项：

- A.多为全面性发作
- B.最常见原因为颅内感染
- C.时间多在10分钟以上
- D.24小时内可反复多次

E.多见于6个月以下小婴儿

答案：A

解析：热性惊厥发生在热性疾病初期体温骤然升高(38.5℃~40℃或更高)时，70%以上与上呼吸道感染有关，亦可伴发于出疹性疾病、中耳炎、下呼吸道感染等疾病，但绝不包括颅内感染和各种颅脑病变引起的急性惊厥，惊厥呈全身性、次数少、时间短、恢复快、无异常神经系统症状、一般预后好。热性惊厥分为单纯型热性惊厥与复杂型热性惊厥，详见下表，正确答案为A选项。

题型：A1/A2型题

题目：

诊断急性胰腺炎特异性最强的指标是

选项：

A.血清淀粉酶

B.尿淀粉酶

C.血清脂肪酶

D.C-反应蛋白

E.血钙

答案：C

解析：无

题型：A1/A2型题

题目：

新生儿时期最常见的脑膜炎是

选项：

A.病毒性脑膜炎

B.流行性脑膜炎

C.大肠杆菌脑膜炎

D.流感嗜血杆菌脑膜炎

E.脑膜炎双球菌脑膜炎

答案：C

解析：新生儿和<3个月婴儿以肠道革兰阴性杆菌(大肠杆菌最多见，其次为变形杆菌、铜绿假单胞菌等)和金黄色葡萄球菌为主。故正确答案为C选项。

题型：A1/A2型题

题目：

胰腺癌患者最常见的首发症状是

选项：

A.消化不良

B.腹水

C.黄疸

D.消瘦乏力

E.上腹不适

答案：E

解析：实记题。胰腺癌患者上腹疼痛、不适为常见的首发症状，故答E，不答A、B、C、D。

题型：A1/A2 型题

题目：

与散发性先天性甲状腺功能减低症病因无关的是

选项：

- A.促甲状腺激素不足
- B.甲状腺发育不全
- C.甲状腺激素合成障碍
- D.甲状腺异位
- E.碘缺乏

答案：E

解析：本题为选非题，地方性甲状腺功能减退症见于甲状腺肿流行地区，系由于地区性水、土和食物中碘缺乏所致，故正确答案为 E 选项。先天性甲状腺功能减退症的病因可分为两类：散发性和地方性。散发性甲状腺功能减退症是由于先天性甲状腺发育不良、异位或甲状腺激素合成途径缺陷所致，临床较常见，排除 A、B、C、D 选项

题型：A1/A2 型题

题目：

先天性甲状腺功能减退症新生儿筛查的检测项目是

选项：

- A.T3、T4
- B.T4、TSH
- C.TRH 刺激试验
- D.X 线测患儿骨龄
- E.TSH

答案：E

解析：出生后 2~3 天的新生儿干血滴纸片检测 TSH 浓度作为初筛，结果  $>15\sim20\text{mU/L}$  时，再检测血清 T4 和 TSH 以确诊。此筛查已列入我国《母婴保健法》，是法定的筛查病之一，故正确答案为 E 选项。

题型：A1/A2 型题

题目：

以下关于先天性甲状腺功能减退症的治疗，错误的是

选项：

- A.早期确诊，尽早治疗
- B.L-甲状腺素钠起始剂量为  $8\sim9\ \mu\text{g/kg.d}$
- C.用药应使 TSH 浓度正常而血 Ts 正常或偏高值
- D.服用甲状腺制剂至 25 岁
- E.治疗过程中应注意随访

答案：D

解析：本题为选非题。先天性甲状腺功能减退症患者早期诊断，早期治疗，终身替代。一旦诊断确立，应终身服用甲状腺制剂，不能中断，否则前功尽弃。故正确答案为 D 选项。

题型：A1/A2 型题

题目：

不属于苯丙酮尿症患儿症状表现的是

选项：

- A.智能落后
- B.癫痫小发作
- C.头发变黄
- D.特殊体味
- E.张口伸舌

答案：E

解析：张口伸舌是先天性甲状腺功能低下患儿的常见症状，故选 E。智能落后、癫痫小发作、头发变黄、特殊体味是苯丙酮尿症患儿的常见表现，故不选 A、B、C、D。

题型：A1/A2 型题

题目：

男孩，6岁。咳嗽伴喘息1天，无发热。既往有反复喘息发作4~5次。其外祖父患有支气管哮喘。查体：呼吸急促，可见轻度三凹征，呼气相延长，双肺满布哮鸣音。目前应首选的治疗是

选项：

- A.吸入沙丁胺醇
- B.静脉滴注青霉素
- C.口服白三烯调节剂
- D.静脉注射地塞米松
- E.口服西替利嗪

答案：A

解析：根据题意诊断为哮喘； $\beta_2$ 受体激动剂（沙丁胺醇）应用最广的支气管舒张剂故选 A。哮喘一般不用消炎药，故不选 B；白三烯调节剂用于哮喘慢性持续期的治疗，故不选 C；重症急性病例、哮喘持续状态用激素治疗，排除 D；西替利嗪一般用于过敏性疾病的治疗，故不选 E。

题型：A1/A2 型题

题目：

以下符合川崎病诊断标准的是

选项：

- A.稽留热或弛张热 5 天以上
- B.皮肤环形红斑和皮下小结
- C.草莓舌和口周苍白圈
- D.化脓性球结合膜炎
- E.化脓性颈淋巴结炎

答案：A

解析：川崎病体温达到  $39\sim 40^\circ\text{C}$ ，持续 7 到 14 天或更长，稽留热或弛张热，抗生素治疗无效，故选 A。皮肤环形红斑和皮下小结是小儿风湿热的表现，故不选 B。草莓舌和口周苍白圈是猩红热的表现，故不选 C。川崎病球结合膜充血，但无脓性分泌物，故不选 D。川崎病颈淋巴结肿大，但不红，不化脓，故不选 E。

题型：A1/A2 型题

题目：

麻疹的主要传染源是

选项：

- A.蚊子
- B.患者
- C.病毒携带者
- D.隐性感染者
- E.潜伏感染者

答案：B

解析：麻疹患者是唯一的传染源，故选 B。

题型：A1/A2 型题

题目：

下列感染性疾病主要经粪-口途径传播的是

选项：

- A.手足口病
- B.麻疹
- C.风疹
- D.水痘
- E.流行性腮腺炎

答案：A

解析：手足口病主要通过粪-口途径传播，也可通过接触患者而感染，故选 A。麻疹患者是唯一的传染源主要通过呼吸道传播，故不选 B。风疹是通过呼吸道传播的疾病，故不选 C。水痘是通过呼吸道飞沫或直接接触感染者的皮肤损伤处传染，故不选 D。流行性腮腺炎主要通过空气飞沫或直接接触传播的，故不选 E。

题型：A1/A2 型题

题目：

先天性风疹综合征--般发生在

选项：

- A.妊娠早期
- B.妊娠中期
- C.妊娠晚期
- D.分娩期
- E.哺乳期

答案：A

解析：孕妇在早期感染病毒感染风疹后，病毒通过胎盘传给胎儿而致各种先天缺陷称为先天性风疹综合征，故选 A。

题型：A1/A2 型题

题目：

小儿手足口病的致死原因主要为

选项：

- A.肺炎
- B.休克
- C.心肌炎
- D.重型脱水
- E.脑干脑炎

答案：E

解析：小儿手足口病多在一周痊愈，预后良好，少数出现无菌脑膜炎、脑干脑炎、脑脊髓炎、急性弛缓性麻痹、神经性肺水肿或肺出血等重症表现，病情进展迅速甚至导致死亡，故选E。

题型：A1/A2 型题

题目：

治疗猩红热的首选药物是

选项：

- A.阿昔洛韦
- B.青霉素
- C.红霉素
- D.三代头孢
- E.庆大霉素

答案：B

解析：猩红热是溶血链球菌感染，所以首选的抗生素是青霉素，故选B。阿昔洛韦是抗病毒的药，故不选A。红霉素只要治疗支原体和衣原体感染，故不选C。第三代头孢对革兰氏阴性菌、铜绿假单胞菌、沙雷杆菌等效果较好，故不选D。庆大霉素用于敏感的痢疾、肠炎等肠道感染性疾病，故不选E。

题型：A1/A2 型题

题目：

以下疾病中外周血白细胞计数明显增高的是

选项：

- A.猩红热
- B.麻疹
- C.水痘
- D.流行性腮腺炎
- E.手足口病

答案：A

解析：猩红热是链球菌感染属细菌感染，所以白细胞计数明显增高，故选A。麻疹、水痘、手足口病是病毒感染，不会出现白细胞增高，故不选B、C、D、E。

题型：A1/A2 型题

题目：

手足皮肤呈大片状脱皮且无色素沉着的疾病是

选项：

- A.猩红热
- B.麻疹
- C.幼儿急疹

D.水痘

E.风疹

答案：A

解析：猩红热是溶血性链球菌感染引起的急性呼吸道传染病。猩红热皮疹消退后开始脱皮，颈、躯干部位常为糠屑样，四肢特别是手掌、脚底常为大片状，有时甚至呈手套、袜套状，无色素沉着。故选A。麻疹疹退后有糠麸样脱屑和棕色色素沉着，不选B；幼儿急疹，无色素沉着，无脱屑、无脱皮，故不选C；水痘不留疤痕，故不选D；风疹是所有出疹性疾病中最轻的，不脱皮，故不选E。

题型：A1/A2 型题

题目：

婴儿生理性贫血的时间是出生后

选项：

A.2~3周

B.2~3个月

C.5~6个月

D.8~10个月

E.10~12个月

答案：B

解析：由于婴儿生长发育迅速，循环血量迅速增加等因素，红细胞数和血红蛋白量逐渐降低，至2~3个月时红细胞降至 $3.0 \times 10^{12}/L$ 左右，血红蛋白降至 $100g/L$ 左右，出现轻度贫血，称为“生理性贫血”。故正确答案为B选项。

题型：A1/A2 型题

题目：

下列哪项符合营养性缺铁性贫血

选项：

A.红细胞下降显著于血红蛋白下降，总铁结合力降低

B.红细胞与血红蛋白平行下降，总铁结合力升高

C.血红蛋白下降比红细胞下降显著，总铁结合力升高

D.红细胞与血红蛋白平行下降，总铁结合力降低

E.血红蛋白下降比红细胞下降显著，总铁结合力降低

答案：C

解析：铁是合成血红蛋白的原料，缺铁时血红素生成不足，进而血红蛋白合成减少，导致新生的红细胞内血红蛋白含量不足，细胞质减少，细胞变小；而缺铁对细胞的分裂、增殖影响较小，从而形成小细胞低色素性贫血。由于铁不足，转铁蛋白与铁的亲和力增加，总铁结合力结合力升高。故正确答案为C选项。

题型：A1/A2 型题

题目：

以下不是胚胎期造血组织或器官的是

选项：

A.卵黄囊

B.黄骨髓

C.淋巴结

D.肝

E.脾

答案：B

解析：本题为选非题。中胚叶造血期：在胚胎第3周开始出现卵黄囊造血，其中主要是原始的有核红细胞。肝脏在胚胎第6~8周时出现造血组织，并成为胎儿中期的主要造血部位。胎儿期4~5月时达高峰，至6个月后逐渐减退。肝造血主要产生有核红细胞。脾脏约于胚胎第8周开始造血，以生成红细胞占优势。胎儿5个月之后，脾脏造血功能逐渐减退，至出生时成为终生造血淋巴器官。胸腺是中枢淋巴器官，6~7周已出现胸腺，并开始生成淋巴细胞。自胚胎第11周淋巴结开始生成淋巴细胞并成为终生造淋巴细胞和浆细胞的器官。骨髓出现在胚胎第6周，造血活动开始于胎儿4个月，并迅速成为主要的造血器官，直至出生2~5周后成为唯一的造血场所。黄骨髓主要是脂肪组织，当人体贫血时，它可以转化为红骨髓，故正确答案为B选项。

题型：A1/A2型题

题目：

小儿缺铁性贫血给予铁剂治疗后，首先升高的指标是

选项：

A.血红蛋白

B.红细胞计数

C.网织红细胞

D.细胞内含铁酶

E.血清铁蛋白

答案：D

解析：补给铁剂12~24小时后，细胞内含铁酶开始恢复，烦躁等精神症状减轻，食欲增加。网织红细胞（判断是否有效最初的指针）于服药2~3天后开始上升，5~7天达高峰，2~3周后下降至正常。治疗1~2周后血红蛋白逐渐上升，通常于治疗3~4周达到正常。故正确答案为D选项，排除C选项。

题型：A1/A2型题

题目：

女婴，11个月。近2个月面黄虚胖，毛发稀疏，表情呆滞，目光发直，智力发育倒退。查体：反应迟钝，头部及四肢颤抖，腱反射亢进，踝阵挛(+)。血常规：MCV98fl，MCH38pg，MCHC34%。患儿治疗不恰当的是

选项：

A.可给予少量镇静剂

B.如震颤严重不能吞咽，治疗早期可鼻饲

C.治疗初期应预防性补钾

D.以维生素B12治疗为主

E.以叶酸治疗为主，同时口服维生素C促进叶酸吸收

答案：E

解析：本题为选非题。有精神神经症状者，应以维生素B12治疗为主，用维生素B12治疗后6~7小时骨髓内巨幼红细胞可转为正常幼红细胞；一般精神症状2~4天后好转。有精神症状的一定先补B12后补叶酸，因叶酸可以加重精神症状。叶酸口服剂量为5mg，每日3

次，连续数周至临床症状好转、血象恢复正常为治疗的停药指针，故正确答案为 E 选项。

题型：A1/A2 型题

题目：

女孩，2 岁。发热、流涕、咳嗽 3 天，皮疹 6 小时。查体：精神萎靡，前额及耳后有浅红色斑丘疹，眼结膜充血，口腔黏膜粗糙，两肺呼吸音粗，最可能的诊断是

选项：

- A. 幼儿急疹
- B. 麻疹
- C. 风疹
- D. 川崎病
- E. 咽结合膜热

答案：B

解析：麻疹黏膜斑、粗糙：早期诊断麻疹特征性的重要依据。根据本题患儿发热、流涕、咳嗽 3 天，皮疹 6 小时，口腔黏膜粗糙，两肺呼吸音粗，考虑诊断为麻疹。故本题正确答案为 B。幼儿急疹主要表现为“热退疹出”，不符合本题内容，故排除 A。风疹特点及规律：“发热第 2 天出疹，一天内出齐”，与本题内容不符，故排除 C。川崎病往往应用抗生素 5 天以上无效、稽留热、球结膜充血（无脓性）、口唇充血皴裂，草莓舌、手足硬性水肿；指趾末端性脱皮/猩红热样皮疹、颈部淋巴结肿大、疼痛、无化脓。本题内容与其不符，故排除 D。咽结合膜热主要表现为发热+咽炎+结合膜炎，故排除答案 E。

题型：A1/A2 型题

题目：

接种卡介苗后，符合 PPD 试验阳性反应的是

选项：

- A. 硬结颜色较深
- B. 硬结较硬，边缘清晰
- C. 硬结直径多为 10~15mm
- D. 反应强度逐年减弱
- E. 阳性反应持续时间约 7~10 天

答案：D

解析：接种卡介苗后 PPD 试验阳性反应，与自然感染阳性反应不同，接种卡介苗后硬结直径多为 5~9mm，硬结颜色浅红，硬结质地较软、边缘不整，故排除 ABC，阳性反应持续时间较短，2-3 天即消失，故排除 E。阳性反应有较明显的逐年减弱的倾向，一般于 2-5 年内逐渐消失，故本题正确答案为 D。

题型：A1/A2 型题

题目：

患有原发型肺结核的婴幼儿，最常见的症状是

选项：

- A. 食欲不振、精神萎靡
- B. 低热、盗汗
- C. 体重不增
- D. 眼疱疹性结膜炎

E.干咳、轻度呼吸困难

答案：E

解析：原发性肺结核症状轻重不一。轻者可无症状，一般起病缓慢，可有低热、食欲缺乏、疲乏、盗汗等结核中毒症状，多见于年龄较大儿童，故本题排除答案 AB。婴幼儿及其症状较重者可急性起病，高热可达 39-40℃，但一般情况尚好，与发热不相称，持续 2-3 周后转为低热，并伴结核中毒症状，干咳和轻度呼吸困难是最常见的症状，故本题正确答案为 E。婴幼儿可表现为体重不增或生长发育障碍，故排除答案 C。部分高度敏感状态小儿可出现眼泡疹性结膜炎，皮肤结节性红斑和（或）多发性一过性关节炎，故本题排除 D。

题型：A1/A2 型题

题目：

小儿结核性脑膜炎，正确的治疗原则是

选项：

- A.强化治疗阶段联合使用 3~4 种抗结核药，疗程 2 个月
- B.巩固治疗阶段联合使用 2~3 种抗结核药，疗程 4 个月
- C.抗结核药物治疗总疗程不少于 12 个月，或待脑脊液恢复正常后继续治疗 6 个月
- D.必须在足量应用抗结核药物的前提下才能降颅压治疗
- E.抗结核药物治疗总疗程不少于 6 个月

答案：C

解析：结核性脑膜炎主要为抗结核治疗和降低颅高压两个重点环节。抗结核治疗---联合应用易透过血、脑屏障的抗结核杀菌药物，分阶段治疗，3HRZS/9HR(HE)，总疗程不少于 12 个月或脑脊液正常后继续治疗 6 个月，故本题正确答案为 C，排除答案 E。强化治疗联合使用异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、链霉素，疗程 3~4 个月，排除答案 A。巩固治疗继续用异烟肼、利福平或乙胺丁醇，9~12 个月，故排除 B。患儿最早于 10 天即可出现颅高压，故应及时控制颅高压，故排除 D 答案。

题型：A1/A2 型题

题目：

小儿消化系统解剖生理的论述错误的是

选项：

- A.小儿唾液腺不够发达，口腔黏膜易受损伤和发生局部感染
- B.婴儿胃略呈水平位，当行走时其位置变为垂直
- C.小儿肝细胞再生能力较强，不易发生肝硬化
- D.单纯母乳喂养小儿，肠道细菌以嗜酸杆菌占绝对优势
- E.小儿肠壁通透性更高，屏障功能差

答案：D

解析：本题为反选题。新生儿及婴幼儿口腔黏膜薄嫩，血管丰富，唾液腺不够发达，口腔黏膜易受损伤和发生局部感染，故排除 A 答案。婴儿胃略呈水平位，当行走时其位置变为垂直，胃分泌的盐酸和各种酶均较成人为少，且酶活性低下，故消化功能差，排除答案 B。婴儿肝结缔组织发育较差，肝细胞再生能力强，不易发生肝硬化，但受各种不利因素的影响可使肝细胞发生肿胀、脂肪浸润、变性、坏死、纤维增生而肿大，影响其正常功能，故排除答案 C。婴幼儿肠黏膜基层发育差，肠系膜柔软而唱，肠壁薄，故通透性高，屏障功能差，肠内毒素、消化不全产物等可能作为抗原经肠粘膜进入体内，加之口服耐受的免疫机制尚不完善，容易引起全身感染和过敏性疾病，故本题排除 E。单纯母乳喂养儿以双歧杆菌占绝对优

势，人工喂养和混合喂养儿肠道内的大肠埃希菌、嗜酸杆菌、双歧杆菌及肠球菌所占比例几乎相等，故本题答案正确为 D。

题型：A1/A2 型题

题目：

小儿先天性巨结肠的基本病理变化是

选项：

- A.痉挛段肠管肌层变肥薄，黏膜炎症
- B.痉挛段肠管缺乏神经节细胞
- C.痉挛段肠管交感神经纤维数量增加
- D.扩张段肠管缺乏神经节细胞
- E.扩张段肠管肌层变薄，黏膜炎症

答案：B

解析：先天性巨结肠基本病理变化：痉挛段---肠管肠壁肌间和黏膜下神经丛内缺乏神经节细胞，无髓鞘的副交感神经纤维数量增多，形态增粗、增大，紧密交织成束，故本题正确答案为 B，排除 C；扩张段---肠管肌层肥厚，黏膜炎症，可伴有小溃疡，肠壁肌间和黏膜下神经节细胞正常，故本题排除 ADE。

题型：A1/A2 型题

题目：

小儿结核性脑膜炎早期的临床特点是

选项：

- A.意识模糊
- B.性格改变
- C.前囟饱满
- D.惊厥
- E.脑膜刺激征

答案：B

解析：小儿结核性脑膜炎早期（前驱期）约 1~2 周，以小儿性格改变为主，如少言、懒动、易疲劳、喜哭、易怒等。临床症状可有发热、纳差、盗汗、消瘦、呕吐、便秘（婴儿可为腹泻）等。年长儿可自诉头痛，婴儿则表现为皱额或凝视、嗜睡等。故正确答案为 B 选项。意识模糊、昏迷为晚期表现，排除 A 选项；前囟饱满、惊厥、脑膜刺激征为中期表现，排除 C、D、E 选项。

题型：A1/A2 型题

题目：

结核自然感染，PPD 阳性反应的特点包括

选项：

- A.硬结质地较硬，颜色深
- B.反应持续时间可达 7~10 天
- C.硬结消退后留有色素沉着，脱屑
- D.硬结直径多在 15 mm 以上
- E.自然感染后 PPD 阳性持续 3~5 年

答案：A

解析：结核自然感染硬结颜色深红，质地较硬，边缘清楚，硬结直径多在 10-15 mm，PPD 阳性持续若干年、甚至终身，故正确答案为 A 选项。自然感染反应持续时间可达 7~10 天以上，排除 B 选项；硬结消退后无色素沉着，脱屑，排除 C 选项；硬结直径多在 10-15 mm，排除 D 选项；PPD 阳性持续若干年、甚至终身，排除 E 选项。

题型：A1/A2 型题

题目：

以下哪种情况所致结核菌素试验阴性反应不属于假阴性反应？

选项：

- A. 粟粒性肺结核
- B. 结核初次感染后 4~8 周内
- C. 同时患有麻疹
- D. 重度营养不良
- E. 重度脱水

答案：B

解析：本题为选非题。假阴性反应（机体免疫功能低下或受抑制）：危重结核病；急性传染病如麻疹、水痘、风疹、百日咳等；体质极其衰弱，如重度营养不良、重度水肿、重度脱水等；应用激素或免疫抑制剂治疗时；原发或继发免疫缺陷病。初次感染后 4~8 周内属于迟发变态反应前期，是阴性反应，故正确答案为 B 选项。

题型：A1/A2 型题

题目：

结核性脑膜炎发生脑神经障碍常见为

选项：

- A. 第 II 对、第 V 对、第 VI 对
- B. 第 III 对、第 VI 对、第 VII 对
- C. 第 I 对、第 II 对、第 II 对
- D. 第 IV 对、第 V 对、第 VI 对
- E. 第 II 对、第 VI 对、第 IX 对

答案：B

解析：结核性脑膜炎脑神经损害，常见为面神经、舌下神经、动眼神经、外展神经障碍，即 3、6、7（最常见）、12 对脑神经受累。故正确答案为 B 选项。

题型：A1/A2 型题

题目：

PPD 阳性反应的临床意义中，正确的是

选项：

- A. 三岁以上儿童 PPD 阳性表示体内有活动结核
- B. 三岁以上儿童 PPD 强阳性表示体内有活动结核
- C. PPD 硬结直径 5 mm 以上为强阳性
- D. PPD 强阳性表示病情较重
- E. PPD 强阳性表示曾接种过卡介苗

答案：B

解析：3 岁以上儿童 PPD 试验（+~++）代表曾经感染；（+++~++++）强阳性或极强阳性代

表活动性感染。故正确答案为 B 选项，排除 A 选项。PPD 硬结直径 20 mm 以上为强阳性，排除 C 选项；PPD 反应的是受过结核杆菌感染，阳性程度则表明感染程度，和发病与否不完全对等。其受多种因素影响。反应越强，对结核病的诊断，尤其是对婴幼儿诊断越重要，考虑需要治疗的必要性越大，排除 D 选项；接种卡介苗后 PPD 试验可呈阳性反应，排除 E 选项。

题型：A1/A2 型题

题目：

先天性肥厚性幽门狭窄的特有体征是

选项：

- A.胃蠕动波
- B.振水音
- C.右上腹肿块
- D.左上腹肿块
- E.脐周压痛

答案：C

解析：右上腹肿块，在右上腹肋缘下与右腹直肌之间可触诊枣核或橄榄大小肿物，是本病特有体征，具有诊断意义。临床检出率 60~80%，故正确答案为 C 选项，排除 D 选项。胃蠕动波在喂奶和呕吐前出现，从左季肋下向右上腹移动，呕吐后消失，排除 A 选项；振水音往往提示幽门梗阻，排除 B 选项；脐周压痛是指以脐周为中心的腹痛，常见于各种胃肠道疾病，是胃肠道炎症、溃疡、肿瘤的重要体征，排除 E 选项。

题型：A3/A4 型题

题目：

男，30 岁，2 年前离婚。今日下班回家后突然出现强烈的恐惧感，有如大祸临头，全身多汗、脸红、手脚发麻、四肢颤抖，同时心悸、胸闷、呼吸困难，有窒息感。急诊查体及辅助检查未见异常。患者最可能的诊断是

选项：

- A.恐惧症
- B.精神分裂症
- C.广泛性焦虑障碍
- D.惊恐发作
- E.心理生理障碍

答案：D

解析：惊恐发作：又称急性焦虑发作（精神症状和躯体症状，精神症—惊恐体验，伴濒死感、窒息感或失控感，持续 1 个月以上）故答案选 D。恐惧症：患者对外界某些处境、物体或与人交往，产生异乎寻常的恐惧与紧张不安可致脸红、气促、出汗、心悸、血压变化、恶心、无力甚至晕厥，有具体恐惧担心事物，惊恐没有具体事物对象区别之，故不选 A。精神分裂症：是感知、思维、情感、行为等多方面的障碍和精神活动的不协调，病程 1 年以上才可诊断，惊恐持续持续 1 个月以上即可诊断，故不选 B。广泛性焦虑障碍：没有濒死感，表现为晕眩、心悸、心律不齐，呼吸急促、胸部发紧，口干、胃部不适、便秘或腹泻，阵发性地发冷发热、皮肤潮红或苍白，出汗、手脚冰凉或发热、小便过频、喉头有阻塞感，时间持续至少数周或数月以上，惊恐发作持续 1 个月以上，故不选 C。心理生理障碍：又称心理因素相关生理障碍，是指一组与心理社会因素有关的以进食、睡眠及性行为异常为主的精神障碍。包

括进食障碍(神经性厌食、神经性贪食、神经性呕吐)、睡眠障碍(失眠症、嗜睡症和发作性睡眠障碍)、性功能障碍(性欲减退、阳痿、早泄、等),与题干不符,故不选E。

题型: A3/A4 型题

题目:

男,30岁,2年前离婚。今日下班回家后突然出现强烈的恐惧感,有如大祸临头,全身多汗、脸红、手脚发麻、四肢颤抖,同时心悸、胸闷、呼吸困难,有窒息感。急诊查体及辅助检查未见异常。应首选的快速起效药物是

选项:

- A.氯米帕明
- B.氟西汀
- C.氯丙嗪
- D.劳拉西泮
- E.普萘洛尔

答案: D

解析: 惊恐发作: 心理疗法的行为疗法(暴露)是首选, 药物治疗: 苯二氮卓类药物: 控制焦虑恐惧; 抗抑郁药物: S S R I s (选择性5-羟色胺再摄取抑制剂: 氟西汀、舍曲林等), 社交焦虑障碍用;  $\beta$ 受体拮抗剂: 普萘洛尔。故答案选D。氯米帕明: 四环类抗抑郁药(氯米帕明), 不用于惊恐治疗, 故不选A。氟西汀: 可用于惊恐治疗, 但不是首选, 故不选B。氯丙嗪: 第一代抗精神病药, 不用于惊恐发作, 故不选C。普萘洛尔: 可用于惊恐发作, 但不是首选, 故不选E。

题型: A3/A4 型题

题目:

男,30岁,2年前离婚。今日下班回家后突然出现强烈的恐惧感,有如大祸临头,全身多汗、脸红、手脚发麻、四肢颤抖,同时心悸、胸闷、呼吸困难,有窒息感。急诊查体及辅助检查未见异常。除药物治疗外,还应行

选项:

- A.森田疗法治疗
- B.认知行为治疗
- C.脱敏疗法
- D.暴露冲击疗法
- E.电抽搐治疗

答案: B

解析: 除药物治疗外, 惊恐发作的心理疗法的行为疗法(暴露)是首选, 故答案选B。森田疗法治疗: 用于强迫症、焦虑症、恐惧症, 不用于惊恐发作, 故不选A。脱敏疗法: 用于恐惧症首选, 故不选C。暴露冲击疗法: 用于恐惧症患者, 不选D。电抽搐治疗: 重症抑郁和躁狂病人及有自杀倾向精神病人, 惊恐病人没有生命危险, 故不用此疗法, 故选E。

题型: A3/A4 型题

题目:

王女士,28岁,G2P1,妊娠36+3周。晨起发现阴道多量流血,无腹痛。无宫缩,枕左前位,胎头高浮,耻骨联合上方闻及胎盘杂音。胎心140次/分。最可能的诊断为

选项:

- A.完全性前置胎盘
- B.部分性前置胎盘
- C.边缘性前置胎盘
- D.胎盘前置状态
- E.植入性胎盘

答案：B

解析：妊娠 36 周，无诱因无痛性阴道流血，可诊断为前置胎盘。完全性前置胎盘出血发生时间较早，多在妊娠 28 周；边缘性前置胎盘出血量较少。所以根据症状出现的时间及特点，最可能的是部分性前置胎盘。

题型：A3/A4 型题

题目：

王女士，28 岁，G2P1，妊娠 36+3 周。晨起发现阴道多量流血，无腹痛。无宫缩，枕左前位，胎头高浮，耻骨联合上方闻及胎盘杂音。胎心 140 次/分。该孕妇胎盘应附着于

选项：

- A.子宫底部
- B.子宫左侧壁
- C.子宫右侧壁
- D.子宫前壁
- E.子宫后壁

答案：D

解析：耻骨联合上方闻及胎盘杂音，代表胎盘位于前壁。

题型：A3/A4 型题

题目：

王女士，28 岁，G2P1，妊娠 36+3 周。晨起发现阴道多量流血，无腹痛。无宫缩，枕左前位，胎头高浮，耻骨联合上方闻及胎盘杂音。胎心 140 次/分。本例治疗应首选

选项：

- A.期待疗法
- B.经阴道分娩
- C.产钳助产
- D.剖宫产
- E.静滴缩宫素

答案：D

解析：妊娠 36 周后，不适于期待疗法。前置胎盘最佳分娩方式为剖宫产。

题型：A3/A4 型题

题目：

女，40 岁，进行性痛经 8 年，近 2 年经期延长，经量增多，曾用药物保守治疗无效。现痛经逐渐加重，止痛药无效。查体：皮肤口唇粘膜苍白，子宫后倾去位，妊娠 3 个月大，质硬，有压痛，双侧附件未触及异常。根据病史，该患者的初步诊断时

选项：

- A.子宫腺肌病
- B.子宫肌瘤

- C.子宫内膜癌
- D.有排卵型功血
- E.子宫内膜炎

答案：A

解析：根据题干，患者进行性痛经，经量增多，经期延长，子宫均匀性增大，考虑诊断为子宫腺肌病。子宫肌瘤、子宫内膜癌、有排卵性功血、子宫内膜炎都不会出现进行性痛经。

题型：A3/A4 型题

题目：

女，40岁，进行性痛经8年，近2年经期延长，经量增多，曾用药物保守治疗无效。现痛经逐渐加重，止痛药无效。查体：皮肤口唇粘膜苍白，子宫后倾去位，妊娠3个月大，质硬，有压痛，双侧附件未触及异常。对于该病人有价值的辅助检查时

选项：

- A.血常规检查
- B.尿常规检查
- C.肝肾功能检查
- D.血CA125测定
- E.血糖测定

答案：D

解析：子宫腺肌病常伴有血清CA125升高，有辅助诊断价值。其他选项没有特异性。

题型：A3/A4 型题

题目：

女，40岁，进行性痛经8年，近2年经期延长，经量增多，曾用药物保守治疗无效。现痛经逐渐加重，止痛药无效。查体：皮肤口唇粘膜苍白，子宫后倾去位，妊娠3个月大，质硬，有压痛，双侧附件未触及异常。该患者的最佳的治疗方法是

选项：

- A.全子宫切除
- B.GnRH-a 治疗
- C.止痛药物治疗
- D.期待疗法
- E.全子宫切除术+双侧附件切除术

答案：A

解析：子宫腺肌病症状严重应首选全子宫切除术，该患者药物治疗无效，所以B、C、D不正确，患者40岁，不宜行双侧附件切除术所以E不正确。

题型：A3/A4 型题

题目：

患者女性，27岁。发热伴下腹坠痛5天。5天前行人工流产吸宫术，术后出现下腹坠痛，阴道分泌物增多，伴有发热。查体：T39.6℃，下腹部明显压痛、反跳痛；双合诊检查触及左侧附件区包块，直径约4cm，触痛明显。血常规显示：白细胞 $20 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞占0.8。根据题干，该患者最可能的诊断是

选项：

- A.盆腔结核

- B.宫外孕
- C.盆腔脓肿
- D.子宫穿孔
- E.阑尾炎

答案：C

解析：宫腔内手术操作后感染为急性盆腔炎的常见病因。患者人流后出现下腹痛，高热，阴道分泌物增多，右侧附件区压痛性包块，外周白细胞总数增高，所以考虑为急性盆腔脓肿。盆腔结核常慢性起病，病程迁延，不会出现高热及严重腹膜刺激征。宫外孕常表现为突然下腹痛，腹腔内出血，而不是腹膜刺激征。急性阑尾炎表现为转移性右下腹疼痛。患者病程仅5天，发展为阑尾脓肿的可能性不大。子宫穿孔常见于人流术过程中出现，不是术后出现。

题型：A3/A4 型题

题目：

患者女性，27岁。发热伴下腹坠痛5天。5天前行人工流产吸宫术，术后出现下腹坠痛，阴道分泌物增多，伴有发热。查体：T39.6℃，下腹部明显压痛、反跳痛；双合诊检查触及左侧附件区包块，直径约4cm，触痛明显。血常规显示：白细胞 $20 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞占0.8。该病最可能的病原体是

选项：

- A.葡萄球菌
- B.淋病奈瑟菌
- C.结核分枝杆菌
- D.大肠杆菌
- E.支原体

答案：A

解析：引起盆腔炎的病原体可以单纯为需氧菌、单纯厌氧菌或需氧菌及厌氧菌的混合感染；可伴有或不伴有性传播疾病的病原体。需氧菌及兼性厌氧菌包括大肠杆菌、棒杆菌、链球菌、肠球菌、葡萄球菌等；厌氧菌包括消化球菌、消化链球菌、脆弱类杆菌等。葡萄球菌：革兰阳性球菌，是产后、手术后生殖器炎症及伤口感染常见的病原菌，常沿阴道、子宫、输卵管粘膜上行感染。以金黄色葡萄球菌的致病力最强，其脓液色黄、稠厚、不臭，常伴有转移性脓肿，对一般常用的抗生素易产生耐药，根据药敏试验用药较为理想。常用有效药物为苯唑西林钠、氯唑西林钠等。大肠杆菌：革兰阴性杆菌，是肠道及阴道的正常寄生菌，一般不致病，但当机体极度衰弱时可引起严重感染，甚至产生内毒素，常与其他致病菌混合感染。大肠杆菌感染的脓液不臭，当有混合感染时，产生稠厚脓液和粪臭。氨苄西林、阿莫西林有效，但易产生耐药菌株，最好作药敏试验，选择敏感药物。支原体：支原体是一类无细胞壁的原核细胞微生物，形态上呈多形性，是正常阴道菌群的一种。在一定条件下支原体可引起生殖道炎症。淋病奈瑟菌：为革兰阴性双球菌，淋病奈瑟菌的特点是侵袭生殖、泌尿系统粘膜的柱状上皮与移行上皮。淋病奈瑟菌主要感染下生殖道，10~17%的患者可发生上生殖道的感染，引起淋病奈瑟菌性盆腔炎，多于月经期或经后7日内发病，起病急，可有高热，体温在38℃以上，常引起输卵管积脓，对治疗反应敏感。淋病奈瑟菌对青霉素、二代或三代头孢菌素、氨基糖甙类药物敏感。

题型：A3/A4 型题

题目：

患者女性，27岁。发热伴下腹坠痛5天。5天前行人工流产吸宫术，术后出现下腹坠痛，阴

道分泌物增多，伴有发热。查体：T39.6℃，下腹部明显压痛、反跳痛；双合诊检查触及左侧附件区包块，直径约4cm，触痛明显。血常规显示：白细胞 $20 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞占0.8。经过7天的治疗后，盆腔包块无缩小趋势，正确的处理是

选项：

- A.手术治疗
- B.更改治疗药物
- C.加用红外线物理疗法
- D.加用中药疗法
- E.加大原有药物剂量

答案：A

解析：经治疗后脓肿没有缩小，即保守治疗无效，则应行脓肿切开术。

题型：A3/A4 型题

题目：

王女士，28岁G1P0，枕左后位，2小时前宫口开全，S+2,1小时前宫缩由强转弱，间歇期7~8分钟。宫缩由强转弱最可能的原因是

选项：

- A.原发性子宫收缩乏力
- B.骨盆入口平面狭窄
- C.中骨盆平面狭窄
- D.骨盆出口平面狭窄
- E.产妇体力消耗过大

答案：C

解析：中骨盆平面狭窄，影响胎头俯屈及内旋转，产妇多表现为活跃期或第二产程严重及停滞、宫缩乏力等。关联知识点：入口平面狭窄—影响入盆，相对狭窄（对角径10-11cm）试产，绝对狭窄（对角径 $\leq 9.5cm$ ）剖宫产。出口平面狭窄—剖宫产。

题型：A3/A4 型题

题目：

王女士，28岁G1P0，枕左后位，2小时前宫口开全，S+2,1小时前宫缩由强转弱，间歇期7~8分钟。此时恰当的处理措施是

选项：

- A.肌注哌替啶
- B.产钳助娩
- C.剖宫产结束分娩
- D.静滴缩宫素
- E.继续观察产程进展

答案：C

解析：中骨盆平面狭窄，弱宫口凯泉，胎头双顶径达坐骨棘水平或更低，可经阴道徒手旋转胎头转为枕前位，待其自然分娩，或行助产。若双顶径未达到坐骨棘水平或出现胎儿窘迫，应行剖宫产。

题型：A3/A4 型题

题目：

女，30岁。妊娠33周，反复阴道流血3次，量少于月经量，无腹痛不适，臀位。胎心正常，G3P3，曾人工流产4次。最可能的诊断是

选项：

- A.生理性子宫收缩
- B.先兆早产
- C.胎盘早剥
- D.前置胎盘
- E.早产临产

答案：D

解析：妊娠晚期无痛性阴道流血伴有胎位异常首先考虑前置胎盘。该产妇有前置胎盘高危因素(多次流产刮宫史)更加支持诊断。妊娠<36周、胎儿存活、一般情况好、阴道流血量少、无需紧急分娩的孕妇可行期待治疗。该产妇目前一般状况可，胎心正常，无终止妊娠指征。治疗原则是抑制宫缩、纠正贫血、预防感染和适时终止妊娠。

题型：A3/A4型题

题目：

女，30岁。妊娠33周，反复阴道流血3次，量少于月经量，无腹痛不适，臀位。胎心正常，G3P3，曾人工流产4次。目前应采取的处理措施是

选项：

- A.抗感染
- B.抑制宫缩
- C.前列腺素引产
- D.立即剖宫产
- E.静滴缩宫素引产

答案：B

解析：妊娠晚期无痛性阴道流血伴有胎位异常首先考虑前置胎盘。该产妇有前置胎盘高危因素(多次流产刮宫史)更加支持诊断。妊娠<36周、胎儿存活、一般情况好、阴道流血量少、无需紧急分娩的孕妇可行期待治疗。该产妇目前一般状况可，胎心正常，无终止妊娠指征。治疗原则是抑制宫缩、纠正贫血、预防感染和适时终止妊娠。

题型：A3/A4型题

题目：

女，47岁。白带多，接触性出血1月余。妇科检查:宫颈糜烂样改变，宫体正常大小，双附件无异常。阴道镜下活检病理示鳞癌，间质浸润深度4mm。该患者临床分期应是

选项：

- A.宫颈原位癌
- B.宫颈癌 IA1 期
- C.宫颈癌 IA2 期
- D.宫颈癌 IB1 期
- E.宫颈癌 IB2 期

答案：C

解析：本例间质浸润深度4mm，应属于IA2期，故选C。

题型：A3/A4型题

题目：

女，47岁。白带多，接触性出血1月余。妇科检查：宫颈糜烂样改变，宫体正常大小，双附件无异常。阴道镜下活检病理示鳞癌，间质浸润深度4mm。最适合的手术方式为

选项：

- A.筋膜内子宫全切术
- B.筋膜外子宫全切术
- C.广泛子宫全切术+盆腔淋巴结切除术
- D.改良广泛子宫全切术+盆腔淋巴结切除术
- E.广泛子宫全切术+盆腔淋巴结切除术+腹主动脉旁淋巴结取样

答案：D

解析：宫颈癌的主要手术方式：① I A1 期：筋膜外子宫全切（无脉管浸润）② I A2 期：改良广泛性子宫切除术+盆腔淋巴结切除术③ I B1 和 II A1 期：“二联切”——广泛性子宫切除术+盆腔淋巴结切除术（必要时做腹主动脉旁淋巴结取样）④部分 I B2 和 II A2 期：“三联切”——广泛性子宫切除术+盆腔淋巴结切除术+选择性腹主动脉旁淋巴结取样，筋膜内子宫全切术主要适用于良性子宫病变。本例患者为 I A2 期，故选 D。

题型：A3/A4 型题

题目：

女，47岁。白带多，接触性出血1月余。妇科检查：宫颈糜烂样改变，宫体正常大小，双附件无异常。阴道镜下活检病理示鳞癌，间质浸润深度4mm。术后应给予

选项：

- A.2年内每3~4个月随访复查1次
- B.放疗+化疗
- C.以铂类为基础的联合化疗
- D.局部腔内照射放射治疗
- E.物理治疗

答案：A

解析：宫颈癌治疗后复发50%在1年内，80%在2年内，故治疗后2年内应每3个月复查1次，3-5年内每6个月复查1次，第6年开始每年复查一次。化疗主要用于晚期或复发转移的患者和根治性同期放化疗，也可用于手术前后的辅助治疗。放疗主要用于部分 I B2 和 II A2，II B-IV A 以及全身情况无法手术的 I A1 和 II A1 期的患者。故本例应选 A。

题型：A3/A4 型题

题目：

男婴，6个月。发热伴咳嗽4天，近2天频繁呕吐，每天10余次。查体：T38.7°C，P138次/分，R32次/分，嗜睡，前囟饱满，颈项强直。心、肺未见异常。脑脊液检查：外观混浊，WBC1500×10<sup>6</sup>/L，N 0.82，蛋白2g/L，糖0.8mmol/L，氯化物98mmol/L。患儿最可能的诊断是

选项：

- A.化脓性脑膜炎
- B.结核性脑膜炎
- C.病毒性脑膜炎
- D.隐球菌性脑膜炎
- E.中毒性菌痢

答案：A

解析：化脓性脑膜炎又称急性细菌性脑膜炎，是各种化脓性细菌引起的脑膜炎症，部分患者病变累及脑实质。是小儿、尤其婴幼儿时期常见的中枢神经系统感染性疾病。临床以急性发热、惊厥、意识障碍、颅内压增高和脑膜刺激征以及脑脊液脓性改变为特征，化脓性脑膜炎脑脊液外观浑浊、细胞数 $>1000 \times 10^6/L$ 、以中性粒为主、糖明显降低，蛋白显著升高，故正确答案为A选项。结核性脑膜炎外观毛玻璃样，排除B选项；病毒性脑膜炎，脑脊液清亮，排除C选项；隐球菌性脑膜炎外观呈墨汁样，排除C选项；中毒性菌痢一般上吐下泻，排除E选项。

题型：A3/A4 型题

题目：

男婴，6个月。发热伴咳嗽4天，近2天频繁呕吐，每天10余次。查体： $T38.7^{\circ}C$ ，P138次/分，R32次/分，嗜睡，前囟饱满，颈项强直。心、肺未见异常。脑脊液检查：外观混浊， $WBC1500 \times 10^6/L$ ，N 0.82，蛋白2g/L，糖0.8mmol/L，氯化物98mmol/L。针对病因，首选的治疗药物是

选项：

- A.阿昔洛韦
- B.异烟肼
- C.甘露醇
- D.头孢曲松
- E.氟康唑

答案：D

解析：病原菌未明确前的抗生素选用对肺炎链球菌、脑膜炎球菌和流感嗜血杆菌三种常见致病菌皆有效的抗生素。目前主张选用头孢曲松钠或头孢噻肟治疗，疗效差时加用万古霉素。故正确答案为D选项。阿昔洛韦片是一种抗病毒药，排除A选项；异烟肼属于抗结核药物，排除B选项；甘露醇是一种高渗性的组织脱水剂，临床上广泛应用于治疗脑水肿，预防急性肾衰，治疗青光眼，加速毒物及药物从肾脏的排泄，排除C选项；氟康唑是治疗真菌感染的一种药物，为广谱抗真菌药，对人和动物的真菌感染均有治疗作用，排除E选项。

题型：A3/A4 型题

题目：

男婴，6个月。发热伴咳嗽4天，近2天频繁呕吐，每天10余次。查体： $T38.7^{\circ}C$ ，P138次/分，R32次/分，嗜睡，前囟饱满，颈项强直。心、肺未见异常。脑脊液检查：外观混浊， $WBC1500 \times 10^6/L$ ，N 0.82，蛋白2g/L，糖0.8mmol/L，氯化物98mmol/L。拟对患儿行放液治疗，放液量每次、每侧不超过

选项：

- A.15ml
- B.20ml
- C.30ml
- D.50ml
- E.100ml

答案：A

解析：少量积液无需处理，如果积液量大引起颅内压增高症状时，应做硬脑膜下穿刺放出积液，放液量每次每侧不超过15ml。故正确答案为A选项。

题型：A3/A4 型题

题目：

女孩，7岁。水肿、尿少3天。查体：颜面眼睑水肿，双下肢非凹陷性水肿，血压135/92mmHg，余无异常。尿常规有红细胞(+++)，蛋白(+)。半月前曾患扁桃体炎。患儿最可能的诊断是选项：

- A.急性泌尿系感染
- B.单纯性肾病
- C.肾炎性肾病
- D.急进性肾小球肾炎
- E.急性肾小球肾炎

答案：E

解析：急性肾小球肾炎多见于5~14岁儿童和青少年，病因不一，临床表现为急性起病，多有前期感染，以血尿为主，伴不同程度蛋白尿，可有水肿、高血压或肾功能不全，故正确答案为E选项。急性泌尿系感染往往有白细胞增高表现，排除A选项；肾病综合征的诊断标准为大量蛋白尿、低蛋白血症、高脂血症、水肿，排除B选项；肾炎性肾病综合征会出现血尿（红细胞 $\geq 10$ 个/HP）、高血压、肾功能不全、持续低补体血症，排除C选项；急性肾小球肾炎疾病初期即可出现少尿或无尿，出现氮质血症，排除D选项。

题型：A3/A4 型题

题目：

女孩，7岁。水肿、尿少3天。查体：颜面眼睑水肿，双下肢非凹陷性水肿，血压135/92mmHg，余无异常。尿常规有红细胞(+++)，蛋白(+)。半月前曾患扁桃体炎。当前该患儿24小时尿量应

选项：

- A.<50ml
- B.<100ml
- C.<200ml
- D.<300ml
- E.<400ml

答案：E

解析：学龄儿童每日排尿量少于400ml为少尿，故正确答案为E选项。学龄前儿童少于300ml为少尿，排除D选项；婴幼儿少于200ml时为少尿，排除C选项；每日尿量少于50ml

题型：A3/A4 型题

题目：

女孩，7岁。水肿、尿少3天。查体：颜面眼睑水肿，双下肢非凹陷性水肿，血压135/92mmHg，余无异常。尿常规有红细胞(+++)，蛋白(+)。半月前曾患扁桃体炎。3天后，患儿水肿加剧，端坐呼吸，颈静脉怒张，咳粉红色泡沫痰，两肺满布湿啰音。以下哪项不是出现此种情况的机制？

选项：

- A.水钠潴留
- B.血浆容量增加
- C.心肌泵衰竭

D.严重循环充血

E.GFR 降低

答案：C

解析：本题为选非题。患儿表现为严重循环充血，由于水钠潴留、血浆容量增加而出现循环充血。表现为尿少加剧、烦躁、呼吸增快，甚至呼吸困难、咳粉红色泡沫痰、双肺湿啰音、心率增快，可有奔马律，肝大等。临床表现类似左心衰，但不是左心衰，而是严重循环充血，实际为肾滤过率降低所致的水钠潴留。治疗要限制水钠、快速利尿扩血管。故正确答案为 C 选项。

题型：A3/A4 型题

题目：

女孩，2 岁，未曾接种过卡介苗，一直与父母生活在一起。其父患活动性肺结核，常有咳痰、咯血。小儿目前无任何症状，胸部 X 线摄片无异常，PPD 试验硬结直径为 7mm。根据小儿的 PPD 试验结果，应判定为

选项：

A.阳性

B.阴性

C.中度阳性

D.强阳性

E.极强阳性

答案：A

解析：结核菌素试验结果判定：硬结<5mm---阴性(-)、5-9mm---阳性(+)、10-19mm---中度阳性(++)、硬结≥20mm---强阳性(+++)、不管多大，有水疱、破溃、淋巴管炎及双圈反应等---极强阳性(++++)。根据本题 PPD 试验硬结直径为 7mm，提示小儿 PPD 试验阳性，故本题正确答案为 A，其余答案均不正确。

题型：A3/A4 型题

题目：

女孩，2 岁，未曾接种过卡介苗，一直与父母生活在一起。其父患活动性肺结核，常有咳痰、咯血。小儿目前无任何症状，胸部 X 线摄片无异常，PPD 试验硬结直径为 7mm。对于本题小儿，宜采取的措施是

选项：

A.密切观察，暂不处理

B.口服异烟肼，疗程 9~12 个月

C.口服利福平，疗程 6~9 个月

D.口服异烟肼+利福平，疗程 3 个月

E.立即接种卡介苗

答案：D

解析：根据本题情况，其父患活动性肺结核，常有咳痰、咯血，对于与开放性结核病患者密切接触者，其处理宜进行药物预防性治疗（排除 AE 答案），所用药物主要为口服异烟肼，6-9 个月，或口服异烟肼+利福平，3 个月。故本题正确答案为 D，排除 BC。

题型：B1 型题

题目：

能够确定子宫内膜异位症临床分期的检查是

选项：

A.动态检测 CA125

B.B 超

C.盆腔 CT

D.腹腔镜检查

E.诊刮

答案：D

解析：腹腔镜是诊断内异症的最佳方法。CA125 不作为内异症独立的诊断依据，但有助于监测病情变化、评估疗效和预测复发。

题型：B1 型题

题目：

有助于评估子宫内膜异位症疗效和预测复发的检查是

选项：

A.动态检测 CA125

B.B 超

C.盆腔 CT

D.腹腔镜检查

E.诊刮

答案：A

解析：腹腔镜是诊断内异症的最佳方法。CA125 不作为内异症独立的诊断依据，但有助于监测病情变化、评估疗效和预测复发。

题型：B1 型题

题目：

IUD 的避孕机制主要是

选项：

A.使宫颈黏液粘稠度增加

B.抑制排卵

C.影响受精卵着床

D.阻止精子与卵子结合

E.毒胚

答案：C

解析：宫内节育器的主要作用机制是影响受精卵着床。复方短效避孕药的主要作用机制是抑制排卵。单孕激素制剂的主要避孕机制是改变宫颈粘液。阴茎套的主要机制是阻碍精子和卵子结合。

题型：B1 型题

题目：

复方短效口服避孕药的作用机制主要是

选项：

A.使宫颈黏液粘稠度增加

B.抑制排卵

- C.影响受精卵着床
- D.阻止精子与卵子结合
- E.毒胚

答案：B

解析：宫内节育器的主要作用机制是影响受精卵着床。复方短效避孕药的主要作用机制是抑制排卵。单孕激素制剂的主要避孕机制是改变宫颈粘液。阴茎套的主要机制是阻碍精子和卵子结合。

题型：B1 型题

题目：

最能反映小儿短期营养状态变化的指标是

选项：

- A.腹围
- B.头围
- C.胸围
- D.身高
- E.体重

答案：E

解析：体重反映了体格发育及近期营养状况。身高是反映骨骼发育及远期营养状况指标。

题型：B1 型题

题目：

最能反映小儿长期营养状态变化的指标是

选项：

- A.腹围
- B.头围
- C.胸围
- D.身高
- E.体重

答案：D

解析：体重反映了体格发育及近期营养状况。身高是反映骨骼发育及远期营养状况指标。

题型：B1 型题

题目：

小儿出生后前囟最迟闭合时间是

选项：

- A.1 岁
- B.2 月龄
- C.出生时
- D.1.5 岁
- E.2 岁

答案：E

解析：小儿前囟测量：对边中点连线。前囟出生时 1-2cm（九版儿科学），最迟 2 岁闭合（九版儿科学）；1-1.5 岁（旧版）。后囟很小或出生时已经闭合，最迟于生后 6-8 周闭合。

题型：B1 型题

题目：

小儿出生后后囟最迟闭合时间是

选项：

- A.1 岁
- B.2 月龄
- C.出生时
- D.1.5 岁
- E.2 岁

答案：B

解析：小儿前囟测量：对边中点连线。前囟出生时 1-2cm（九版儿科学），最迟 2 岁闭合（九版儿科学）；1-1.5 岁（旧版）。后囟很小或出生时已经闭合，最迟于生后 6-8 周闭合。

题型：B1 型题

题目：

小儿 8 个月时

选项：

- A.开始能懂“再见”等词句
- B.开始能将玩具从一手换入另一手
- C.开始能模仿和重复大人所发简单音
- D.开始能喃喃地发出单词音节
- E.开始能用单词，一个单词表示很多意义

答案：C

解析：运动发育记忆：①3 抬 4 握 6 会坐，7 翻 8 爬周会走，1、2、3 走跳跑。②4 握 5 扶能站直，6 摇 7 换 8 拍手；9、10 个月捡豆豆。语言发育：发音—理解—表达。新生儿能哭叫，2 个月微微笑，3 个月发啾呀音，4 个月笑出声，5-6 个月发单音，7 个月叫“爸爸妈妈”，8 个月重复大人所发简单音节，9 个月听懂“再见”，10-11 个月用单词，1 岁说再见，3 岁唱歌谣。

题型：B1 型题

题目：

小儿 7 个月时

选项：

- A.开始能懂“再见”等词句
- B.开始能将玩具从一手换入另一手
- C.开始能模仿和重复大人所发简单音
- D.开始能喃喃地发出单词音节
- E.开始能用单词，一个单词表示很多意义

答案：B

解析：运动发育记忆：①3 抬 4 握 6 会坐，7 翻 8 爬周会走，1、2、3 走跳跑。②4 握 5 扶能站直，6 摇 7 换 8 拍手；9、10 个月捡豆豆。语言发育：发音—理解—表达。新生儿能哭叫，2 个月微微笑，3 个月发啾呀音，4 个月笑出声，5-6 个月发单音，7 个月叫“爸爸妈妈”，8 个月重复大人所发简单音节，9 个月听懂“再见”，10-11 个月用单词，1 岁说再见，3 岁

唱歌谣。

题型：B1 型题

题目：

我国 1989 年小儿血液会议建议：1~4 个月小儿贫血为血红蛋白

选项：

A.<145g/L

B.<120g/L

C.<110g/L

D.<100g/L

E.<90g/L

答案：E

解析：小儿贫血（九版儿科学 P324）新生儿 HB 标准：<145g/L 1~4 个月 HB 标准：<90g/L  
4~6 个月 HB 标准：<100g/L 6~59 个月 HB 标准：<110g/L 5~11 岁 HB 标准：<115g/L 12~14 岁 HB 标准：<120g/L

题型：B1 型题

题目：

根据世界卫生组织的资料，6 个月~5 岁小儿贫血为血红蛋白选项：

A.<145g/L

B.<120g/L

C.<110g/L

D.<100g/L

E.<90g/L

答案：C

解析：小儿贫血（九版儿科学 P324）新生儿 HB 标准：<145g/L 1~4 个月 HB 标准：<90g/L  
4~6 个月 HB 标准：<100g/L 6~59 个月 HB 标准：<110g/L 5~11 岁 HB 标准：<115g/L 12~14 岁 HB 标准：<120g/L

题型：B1 型题

题目：

结核性脑膜炎患儿，早期主要表现为

选项：

A.眼疱疹性结膜炎

B.皮肤瘀点、瘀斑

C.性格改变

D.多汗、枕秃

E.面神经瘫痪

答案：C

解析：结核性脑膜炎患儿主要表现：①早期（前驱期）：性格改变---懒动、易疲劳、易怒、喜哭。②中期（脑膜刺激期）：颅内压增高、脑膜刺激征阳性、面神经瘫痪。累及脑神经损害：3、6、7、12 脑神经。记忆：“鸭翅面”。③晚期（昏迷期）：昏迷。

题型：B1 型题

题目：

结核性脑膜炎患儿，中期主要表现为

选项：

- A.眼疱疹性结膜炎
- B.皮肤瘀点、瘀斑
- C.性格改变
- D.多汗、枕秃
- E.面神经瘫痪

答案：E

解析：结核性脑膜炎患儿主要表现为：①早期（前驱期）：性格改变---懒动、易疲劳、易怒、喜哭。②中期（脑膜刺激期）：颅内压增高、脑膜刺激征阳性、面神经瘫痪。累及脑神经损害：3、6、7、12 脑神经。记忆：“鸭翅面”。③晚期（昏迷期）：昏迷。

题型：B1 型题

题目：

幼儿急疹的病原体是

选项：

- A.柯萨奇病毒
- B.带状疱疹病毒
- C.腺病毒
- D.人疱疹病毒 6 型
- E.呼吸道合胞病毒

答案：D

解析：幼儿急疹又称婴儿玫瑰疹，是婴幼儿常见的急性发热出疹性疾病，其特点为婴幼儿在高热 3~5 天以后，体温突然下降，同时出现玫瑰红色的斑丘疹，为小儿常见的病毒感染性疾病之一。目前研究已经证实，幼儿急疹大部分是 A 人疱疹病毒 6 型（HHV-6B）引起的。疱疹性咽峡炎是由柯萨奇病毒 A4 引起的一种口腔黏膜感染性疾病，临床上以局限于口腔后部的成簇小水疱为特征。其主要通过飞沫、唾液及疱疹液直接接触传播。

题型：B1 型题

题目：

疱疹性咽峡炎的病原体是

选项：

- A.柯萨奇病毒
- B.带状疱疹病毒
- C.腺病毒
- D.人疱疹病毒 6 型
- E.呼吸道合胞病毒

答案：A

解析：幼儿急疹又称婴儿玫瑰疹，是婴幼儿常见的急性发热出疹性疾病，其特点为婴幼儿在高热 3~5 天以后，体温突然下降，同时出现玫瑰红色的斑丘疹，为小儿常见的病毒感染性疾病之一。目前研究已经证实，幼儿急疹大部分是 A 人疱疹病毒 6 型（HHV-6B）引起的。疱疹性咽峡炎是由柯萨奇病毒 A4 引起的一种口腔黏膜感染性疾病，临床上以局限于口腔后部的成簇小水疱为特征。其主要通过飞沫、唾液及疱疹液直接接触传播。

题型：B1 型题

题目：

类似百日咳样痉挛性咳嗽

选项：

- A. 支气管淋巴结结核压迫气管分叉处
- B. 支气管淋巴结结核压迫支气管使其完全阻塞
- C. 支气管淋巴结结核压迫支气管使其部分阻塞
- D. 支气管淋巴结结核压迫喉返神经
- E. 支气管淋巴结结核压迫上腔静脉

答案：A

解析：当胸内淋巴结高度肿大时产生压迫症状。气管分叉处症状：百日咳样的痉挛性咳嗽；支气管症状：喘鸣；喉返神经症状：声嘶；静脉症状：胸部一侧或双侧静脉怒张

题型：B1 型题

题目：

声嘶症状

选项：

- A. 支气管淋巴结结核压迫气管分叉处
- B. 支气管淋巴结结核压迫支气管使其完全阻塞
- C. 支气管淋巴结结核压迫支气管使其部分阻塞
- D. 支气管淋巴结结核压迫喉返神经
- E. 支气管淋巴结结核压迫上腔静脉

答案：D

解析：当胸内淋巴结高度肿大时产生压迫症状。气管分叉处症状：百日咳样的痉挛性咳嗽；支气管症状：喘鸣；喉返神经症状：声嘶；静脉症状：胸部一侧或双侧静脉怒张