

332 儿科学

相关专业知识

1. 小儿洋地黄中毒的最常见表现是
 - A. 食欲缺乏、呕吐
 - B. 室性早搏
 - C. 传导阻滞
 - D. 黄视
 - E. 嗜睡、头晕
2. 有关肾小管酸中毒叙述错误的是
 - A. 肾小管排泌氢离子及重吸收碳酸氢根障碍
 - B. 阴离子间隙减低（正常）
 - C. 一般肾小球滤过功能正常
 - D. 分为近端、远端、混合型和高钾型肾小管酸中毒
 - E. 临床可表现为恶心、呕吐、呼吸深快、生长缓慢
3. 肾小球疾病通常具有以下特点，哪项说法是错误的
 - A. 肾小球性蛋白尿，以球蛋白为主
 - B. 肾小球源性血尿，可伴管型尿
 - C. 可出现高血压、水肿
 - D. 可伴肾小管损伤
 - E. 肾小球滤过功能损伤先并重于肾小管功能障碍
4. 下列哪项不属于遗传性肾小球疾病
 - A. Alport综合征
 - B. 薄基底膜病
 - C. 甲髌综合征
 - D. 生后1个月因先天性梅毒感染所致的肾病综合征
 - E. 芬兰型肾病综合征
5. 关于急性链球菌感染后肾小球肾炎，下列说法正确的是
 - A. 抗链球菌溶血素O（ASO）7~10天达到高峰
 - B. 抗透明质酸酶增高
 - C. 抗脱氧核糖核酸酶降低
 - D. 血沉一般正常
 - E. 补体C3初期降低，病程第2周恢复正常
6. 下列哪项不是风湿病活动的指标
 - A. 体重不增
 - B. 血沉增快
 - C. 发热
 - D. 心电图示窦性心律不齐
 - E. 关节疼痛
7. 以下哪种类型的幼年特发性关节炎最易出现HLA-B27阳性
 - A. 全身型
 - B. 多关节型RF阳性型
 - C. 多关节型RF阴性型
 - D. 少关节型

- E.与附着点炎症相关的关节炎
- 8.关于过敏性紫癜的胃肠道症状描述不正确的是
- A.约见于2/3病例可并发肠套叠、肠梗阻或肠穿孔
 - B.15%胃肠道症状出现于皮疹前
 - C.常位于脐周或下腹部
 - D.可伴呕吐，少见呕血
 - E.可有鲜血便
- 9.下列哪项不是渗出性多形性红斑的临床特点
- A.单纯疱疹病毒感染是轻型多形性红斑最常见的病因
 - B.皮疹好发四肢端，向四肢伸侧，肘膝关节发展
 - C.可出现黏膜受损
 - D.不累及眼睛
 - E.重症者皮疹融合，尼氏征阳性
- 10.在进行癫痫患儿脑电图检查时，以下处理不妥的是
- A.视频脑电图可较好发现发作与脑电之间的关系
 - B.记录应包括清醒期及睡眠期
 - C.检查时停用原口服的抗癫痫药物
 - D.尽量避免使用镇静剂
 - E.对失神癫痫患儿可进行过度换气试验
- 11.脑性瘫痪运动障碍的特征是
- A.进行性中枢性运动障碍
 - B.进行性周围性运动障碍
 - C.非进行性中枢性运动障碍
 - D.非进行性周围性运动障碍
 - E.复发缓解性中枢性运动障碍
- 12.重症肌无力属于
- A.肌肉本身疾病
 - B.神经肌肉接头传递障碍性疾病
 - C.外周神经疾病
 - D.脊髓前角细胞疾病
 - E.脑干疾病
- 13.急性小脑共济失调最常见的语言障碍是
- A.运动性失语
 - B.感觉性失语
 - C.构音障碍
 - D.声音低微
 - E.声音嘶哑
- 14.急性横贯性脊髓炎脊髓休克期表现为
- A.受损节段下感觉障碍、痉挛性瘫、大小便障碍
 - B.受损节段下感觉障碍、弛缓性瘫、病理征阳性、大小便障碍
 - C.受损节段下感觉障碍、痉挛性瘫、病理征阴性、大小便障碍
 - D.受损节段下感觉障碍、弛缓性瘫、病理征阴性、大小便障碍
 - E.受损节段下感觉障碍、痉挛性瘫、病理征阳性、大小便障碍
- 15.关于小儿急性偏瘫，错误的是
- A.多因闭塞性脑血管病变造成局部脑组织缺血或坏死所致，以大脑后动脉最常见

- B.感染、免疫性疾病、凝血异常、心脏病、代谢病为常见病因
C.惊厥为最常见伴随症状之一
D.2岁以内小儿一般无失语
E.预后较成年人好
- 16.多发性硬化的典型临床表现是
A.慢性起病后中枢神经上有多发病灶
B.急性和亚急性起病后中枢神经上多发病灶
C.急性和亚急性起病后病情缓解和复发
D.慢性起病后中枢神经上多发病灶，进行性加重
E.急性和亚急性起病后中枢神经上有多发病灶，病程中缓解后复发
- 17.诊断各类染色体微缺失和微重复综合征的首选方法是
A.染色体核型分析
B.荧光原位杂交技术
C.DNA分析
D.基因芯片技术
E.生化学测定
- 18.苯丙酮尿症患儿初现症状通常在
A.生后1~2个月
B.生后3~6个月
C.生后7~9个月
D.生后10~12个月
E.生后1~3岁
- 19.戈谢病是由于葡萄糖脑苷酶缺乏和减少，因而
A.在单核-巨噬细胞系统的细胞内积聚大量葡萄糖脑苷脂而形成
B.在骨髓积聚大量葡萄糖脑苷脂而形成
C.在脾脏积聚大量葡萄糖脑苷脂而形成
D.在肝脏积聚大量葡萄糖脑苷脂而形成
E.在脑组织积聚大量葡萄糖脑苷脂而形成
- 20.原发性免疫缺陷病的共同临床表现是
A.生长发育明显落后
B.不同程度智力低下
C.特殊面容
D.反复感染
E.易发生神经母细胞瘤
- 21.天然血型抗体是
A.IgA
B.IgM
C.IgG
D.IgE
E.IgD
- 22.关于甲状旁腺功能减退症的临床表现错误的是
A.甲状旁腺素减少或作用障碍而引起的钙、磷代谢异常
B.低钙血症和高磷血症
C.可表现为手足抽搐、癫痫发作
D.可出现转移性钙化

E.PTH不降低时可除外甲状旁腺功能减退症

23.先天性甲状腺功能低下用甲状腺素适量治疗后，向家长交代最重要的一条是

- A.经常补充维生素
- B.注意监测身高
- C.注意膳食营养
- D.加强智能训练
- E.症状改善后不能自动停药

24.儿童哮喘糖皮质激素是最有效的抗变态反应炎症的药物，其作用机制是

- A.干扰花生四烯酸代谢，减少白三烯和前列腺素的合成
- B.抑制细胞因子合成
- C.减少微血管渗漏
- D.增加细胞膜上 β_2 受体的合成
- E.以上都是

25.以下抗结核药物中能引起视神经炎的是哪个

- A.异烟肼
- B.利福平
- C.乙胺丁醇
- D.链霉素
- E.吡嗪酰胺

26.结核性胸膜炎胸腔积液不可能是

- A.渗出液
- B.漏出液
- C.血性胸水
- D.乳糜胸
- E.草黄色液体

27.下列发疹性感染中，哪项的皮疹出现最早

- A.水痘、风疹
- B.猩红热
- C.麻疹
- D.斑疹伤寒
- E.伤寒

28.伤寒发病第1周内，阳性率最高的化验是

- A.粪培养
- B.尿培养
- C.血培养
- D.肥达反应
- E.以上都不是

29.2岁小儿，身高60cm，体重10千克，智力发育良好，为了解其健康情况，首选检查是 A.

- 测量皮下脂肪厚度
- B.头颅正测位片
- C.头围、胸围比例
- D.上、下部量比例
- E.腕部X线摄片

30.患儿出生后1分钟皮肤颜色青紫，心率 >100 次/分，呼吸不规则，四肢肌张力松弛，原始反射引出不完全，该患儿1分钟Apgar评分为

- A.0分
- B.1分
- C.2分
- D.3分
- E.4分

31.患儿女，双胎儿，第2胎第1产，出生后即出现严重贫血、水肿、心力衰竭、肝脾大，另一胎儿多血质表现，抗人球蛋白试验为阴性，抗体释放试验为阴性，血型为Rh(D+)，母亲血型为Rh(D+)，正确的诊断是

- A.ABO溶血病
- B.Rh溶血病
- C.先天性心、脏病
- D.双胎输血综合征
- E.胎儿炎性反应综合征

32.给发绀和气促的新生儿输100%氧气后，发绀基本消退，此新生儿最可能患

- A.发绀型先天性心脏病
- B.新生儿颅内出血
- C.新生儿肺炎
- D.新生儿败血症
- E.以上都不是

33.胎龄27周的早产儿，出生体重975g，生后35天仍在持续使用持续气道正压通气(CPAP)和静脉营养；患儿反应比较差，皮下脂肪少，皮肤暗黄色。患儿仍需要CPAP治疗的主要原因是

- A.湿肺
- B.营养不良
- C.呼吸窘迫综合征
- D.持续肺动脉高压
- E.支气管肺发育不良

34.患儿胎龄36周，剖宫产，生后不久出现气促。查体：口周发绀，轻度吸气性凹陷，双肺闻及少量湿性啰音。胸部X线片提示双肺透亮度减低，右侧叶间胸膜积液。该患儿最可能的诊断是

- A.新生儿呼吸窘迫综合征
- B.湿肺
- C.胎粪吸入综合征
- D.先天性肺发育不良
- E.感染性肺炎

35.患儿36周早产，胎膜早破80小时，出生后立即出现发热，查体见脊柱裂，前囟饱满，颅缝宽，易激惹，考虑诊断为

- A.新生儿脑膜炎
- B.新生儿败血症
- C.新生儿肺炎
- D.颅内出血
- E.新生儿破伤风

36.患儿，女，7岁。因“腹痛1天”入院，急救过程中先后出现少尿、肺水肿、呼吸困难、嗜睡，意识障碍，消化道出血等症状，应诊断为

- A.DIC
- B.ARF
- C.MODS

D.ARDS

E.Curling溃疡

37.患儿女，6岁，发热、刺激性咳嗽1周，少痰。查体：右侧胸部腋下略叩浊，呼吸音略低，血白细胞 $7.0 \times 10^9/L$ ，中性54%，淋巴46%，胸透右下肺野可见云雾状阴影，曾用青霉素治疗5天，效果不佳，进一步的检查首选

A.C-反应蛋白

B.血沉

C.噬异凝集试验

D.肺炎支原体抗体

E.血培养

38.30周早产患儿，生后24小时因吸入性肺炎入院。查体：胸骨左缘第2肋间可闻及较响亮收缩期杂音，超声心动图显示动脉导管未闭，左向右分流，应如何治疗

A.治疗肺炎，待3~4岁后手术

B.观察到3个月后不闭合可手术

C.治疗肺炎同时，应用吲哚美辛(消炎痛)

D.立即手术治疗

E.立即应用心导管介入技术将未闭的动脉导管进行堵塞

39.患儿男，8岁，上呼吸道感染后9天出现肉眼血尿、水肿、尿量减少，查体见：血压120/80mmHg，眼睑、颜面及双下肢水肿，咽部充血，下列哪项说法不正确

A.SO升高基

B.新鲜尿检红细胞管型罕见

C.尿红细胞566个/HP，尿白细胞100个/HP，尿蛋白(++)

D.血白细胞计数正常，轻度贫血

E.补体C3下降

40.患儿1岁2个月，间断高热7天，眼结膜充血，口唇皲裂伴出血，草莓舌，肛周皮肤发红，血常规提示白细胞及中性粒细胞增多，血沉增快，诊断为川崎病，该患儿还可以有以下临床表现，除了

A.颈部淋巴结肿大

B.腹痛、呕吐及腹泻

C.肝大

D.胆囊炎

E.无菌性脑膜炎

41.6岁患儿因发热2周、双膝关节痛1周入院。查体：T38℃，P101次/分，咽稍充血，心肺(-)，双膝关节红肿，活动受限。化验：血沉98mm/h，CRP(+)。为证实风湿热的诊断，需化验的指标是

A.血常规

B.尿常规

C.免疫球蛋白

D.ASO

E.抗核抗体

42.6岁男孩，多饮多尿体重下降，夜间常起来饮水，尿量与之相当，尿比重1.002，渗透压减低，尿pH正常，血电解质正常。最可能诊断为

A.尿崩症

B.糖尿病

C.肾小管酸中毒

D.精神性烦渴

E.范克尼综合征

43.患儿男，7岁；7天前到养鸡场参观，2天前高热，全身酸痛，咳嗽，X线发现双肺实质炎症及左侧胸腔少量积液，临床诊断考虑

- A.传染性非典型肺炎
- B.流行性感
- C.钩端螺旋体病
- D.人禽流感
- E.恙虫病

44.患儿，6岁。昨日开始发热，咽痛，腹痛，口服速效感冒胶囊，热退，今晨又发热，体检：颜面潮红，口周苍白圈，咽部充血，双扁桃腺肿大，躯干皮肤见红色细小丘疹，压之退色，心肺正常，诊断最可能为

- A.麻疹
- B.风疹
- C.药疹
- D.肠道病毒感染
- E.猩红热

45.1岁6个月男婴，腹泻1个月，每日3~5次，时稀时稠。其为足月儿，生后奶粉加牛奶喂养，未加辅食。查体：神情，表情呆滞，体重5kg，眼窝及前囟明显凹陷，皮肤弹性差，泪少，心率120次/分，肺(-)，腹软，腹壁脂肪消失。入院诊断考虑

- A.轻度营养不良，慢性腹泻，重度脱水
- B.中度营养不良，慢性腹泻，中度脱水
- C.重度营养不良，慢性腹泻，轻度脱水
- D.重度营养不良，迁延性腹泻，中度脱水
- E.中度营养不良，迁延性腹泻，重度脱水

46.1岁6个月男婴，腹泻1个月，每日3~5次，时稀时稠。其为足月儿，生后奶粉加牛奶喂养，未加辅食。查体：神情，表情呆滞，体重5kg，眼窝及前囟明显凹陷，皮肤弹性差，泪少，心率120次/分，肺(-)，腹软，腹壁脂肪消失。治疗方案中哪项不妥

- A.补液总量比一般少1/3，速度宜稍慢
- B.尽可能给高蛋白，高热量，易吸收，消化的食物
- C.注意预防自发性低血糖
- D.立即给足够的热量，每日120~150kcal/kg
- E.扩容后应注意补钾，给钾约1周

47.1岁6个月男婴，腹泻1个月，每日3~5次，时稀时稠。其为足月儿，生后奶粉加牛奶喂养，未加辅食。查体：神情，表情呆滞，体重5kg，眼窝及前囟明显凹陷，皮肤弹性差，泪少，心率120次/分，肺(-)，腹软，腹壁脂肪消失。患儿住院过程中，晨起突然神志不清，面色苍白，脉搏细弱，呼吸浅表，多汗，首先应采取哪项紧急措施

- A.静脉注射洛贝林
- B.静脉注射毛花苷C
- C.静脉注射高渗葡萄糖
- D.静脉注射氨茶碱
- E.静脉注射甘露醇

48.患儿男，2岁，因发热、咳嗽，局部肌内注射2~3天后发现注射部位肿胀，既往曾反复有下肢淤斑。查体：轻度贫血貌，脾不大。血象：WBC $12 \times 10^9/L$ ，Hb85g/L，PLT $130 \times 10^9/L$ 。在对该患儿的家族史的询问时，哪项最具有针对性

- A.父亲的出血情况
- B.母亲的出血情况
- C.舅舅的出血情况

D.姑姑的出血情况

E.姐姐的出血情况

49.患儿男，2岁，因发热、咳嗽，局部肌肉注射2~3天后发现注射部位肿胀，既往曾反复有下肢淤斑。查体：轻度贫血貌，脾不大。血象：WBC $12 \times 10^9/L$ ，Hb85g/L，PLT $130 \times 10^9/L$ 。如果检查结果显示APTT95s，PT 12s，考虑诊断可能是

A.血友病

B.VII因子缺乏

C.V因子缺乏

D.血小板功能障碍

E.纤维蛋白原缺乏症

50.患儿男，2岁，因发热、咳嗽，局部肌肉注射2~3天后发现注射部位肿胀，既往曾反复有下肢淤斑。查体：轻度贫血貌，脾不大。血象：WBC $12 \times 10^9/L$ ，Hb85g/L，PLT $130 \times 10^9/L$ 。患儿局部肿胀进行性加重，诊断尚不清楚，应采取的处理措施是

A.局部加压包扎

B.输注凝血酶原复合物

C.输注全血

D.输注新鲜冰冻血浆

E.输注纤维蛋白原

51.抗休克首选补液方法为

A.10-20ml/kg，于1小时内输完

B.10-20ml/kg，于6小时内输完

C.5-10ml/kg，于1小时内输完

D.5-10ml/kg，于6小时内输完

E.20-50ml/kg，于6小时内输完

52.颅内压增高症主要指标不包括

A.前囟紧张

B.瞳孔不等大

C.视神经盘水肿

D.中枢性呼吸困难

E.昏睡

53.以下关于中毒的急救原则不正确的是

A.应用特异性解毒剂

B.脱离毒物或中毒环境

C.食物中毒8小时内给予洗胃

D.促进以吸收的毒物从体内排出

E.排出体内剩余毒物，阻止其吸收

54.中枢性呼吸衰竭主要表现为由野总

A.呼吸节律不整

B.呼吸加快

C.呼吸减慢

D.吸气困难

E.呼气困难

55.关于急性肾炎前驱临床表现的阐述正确的是

A.病前1-3周有链球菌感染史

B.临床出现少尿血尿高血压

- C.血清补体先降后升
 - D.尿检查有大量蛋白和红细胞
 - E.ASO不升高可除外该诊断
- 56.心包积液时有诊断意义的体征为
- A.动脉压下降，静脉压升高
 - B.颈静脉怒张
 - C.心浊音界扩大
 - D.脉压差减小，心音遥远
 - E.呼吸困难
- 57.小儿洋地黄中毒的最常见表现是
- A.食欲缺乏、呕吐
 - B.室性早搏
 - C.传导阻滞
 - D.黄视
 - E.嗜睡、头晕
- 58.有关肾小管酸中毒叙述错误的是
- A.肾小管排泌氢离子及重吸收碳酸氢根障碍
 - B.阴离子间隙减低(正常)
 - C.一般肾小球滤过功能正常
 - D.分为近端、远端、混合型和高钾型肾小管酸中毒
 - E.临床可表现为恶心呕吐、呼吸深快、生长缓慢
- 59.肾小球疾病通常具有以下特点，哪项说法是错误的
- A.肾小球性蛋白尿，以球蛋白为主
 - B.肾小球源性血尿，可伴管型尿
 - C.可出现高血压水肿
 - D.无肾小管损伤
 - E.肾小球滤过功能损伤先重于肾小管功能障碍
- 60.下列哪项不属于遗传性肾小球疾病
- A Alport综合征
 - B.基底膜病
 - C.甲髌综合征
 - D.生后1个月因先天性梅毒感染所致的肾病综合征
 - E.芬兰型肾病综合征
- 61.关于急性链球菌感染后肾小球肾炎，下列说法正确的是
- A.抗链球菌溶血素O(ASO)7-10天达到高峰
 - B.抗透明质酸酶增高
 - C.抗脱氧核糖核酸酶降低
 - D.血沉一般正常
 - E.补体C3初期降低，病程第2周恢复正常
- 62.下列哪项不是风湿病活动的指标
- A.体重不增
 - B.血沉增快
 - C.发热
 - D.心电图示窦性心律不齐
 - E.关节疼痛

63.以下哪种类型的幼年特发性关节炎最易出现HLA-B27 阳性

- A.全身型
- B.多关节型RF 阳性型
- C.多关节型RF 阴性型
- D.少关节型
- E.与附着点炎症相关的关节炎

64.关于过敏性紫癜的胃肠道症状描述不正确的是

- A.约见于2/3病例可并发肠套叠、肠梗阻或肠穿孔
- B.15%胃肠道症状出现于皮疹前
- C.常位于脐周或下腹部
- D.可伴呕吐，少见呕血
- E.可有鲜血便

65.下列哪项不是渗出性多形性红斑的临床特点

- A.单纯疱疹病毒感染是轻型多形性红斑最常见的病因
- B.皮疹好发于肢端，向四肢伸侧、肘膝关节发展
- C.可出现黏膜受损
- D.不累及眼睛
- E.重症者皮疹融合，尼氏征阳性

66.在进行癫痫患儿脑电图检查时；以下处理不妥的是

- A.视频脑电图可较好发现发作与脑电之间的关系
- B.记录应包括清醒期及睡眠期
- C.检查时停用原口服的抗癫痫药物
- D.尽量避免使用镇静剂
- E.对失神癫痫患儿可进行过度换气试验

67.脑性瘫痪运动障碍的特征是

- A.进行性中枢性运动障碍
- B.进行性周围性运动障碍
- C.非进行性中枢性运动障碍
- D.非进行性周围性运动障碍
- E.复发缓解性中枢性运动障碍

68.重症肌无力属于

- A.肌肉本身疾病
- B.神经肌肉接头传递障碍性疾病
- C.外周神经疾病
- D.脊髓前角细胞疾病
- E.脑干疾病

69.急性小脑共济失调最常见的语言障碍是

- A.运动性失语
- B.感觉性失语
- C.构音障碍
- D.声音低微
- E.声音嘶哑

70.急性横贯性脊髓炎脊髓休克期表现为

- A.受损节段下感觉障碍、痉挛性瘫、大小便障碍
- B.受损节段下感觉障碍、弛缓性瘫、病理征阳性.大小便障碍

- C.受损节段下感觉障碍、痉挛性瘫、病理征阴性、大小便障碍
- D.受损节段下感觉障碍、弛缓性瘫、病理征阴性、大小便障碍
- E.受损节段下感觉障碍、痉挛性瘫、病理征阳性、大小便障碍

(71-73题共用题干)

患儿，男，1岁8个月，不规则发热、咳嗽伴皮疹，耳溢脓4个多月，血红蛋白80.4g/L，血小板 $70 \times 10^9/L$ ，胸片两肺野透亮度减低，并呈弥散性网点状改变，头颅平片可见多个缺损阴影。

71.该例最可能的诊断是

- A.全身结核病
- B.朗格汉斯细胞组织细胞增生症(混合型)
- C.再生障碍性贫血合并感染
- D.颅内肿瘤合并肺部感染
- E.儿童艾滋病

72.为尽快明确诊断，患儿应做的检查是

- A.皮肤印片或病变部位活体组织检查
- B.应作部分凝血活酶时间试验
- C.应作骨髓涂片或(和)骨髓活检
- D.头颅MRI
- E.艾滋病确诊试验

73.一旦皮肤印片或组织活检发现朗格汉斯细胞；最具有确诊意义的检查是

- A.a-D甘露糖酶
- B.ATP酶
- C.CD31/S100
- D.电镜在病变细胞内发现Birbeck颗粒
- E.花生凝集素结合试验

(74-78题共用题干)

女孩5岁。因“发热1月，伴双下肢疼痛1周”住院。体检：体温38.5℃，面色苍白；无皮疹，下肢散在出血点；浅表淋巴结易及，心肺无特殊，肝肋下：3cm，；脾肋下未及，无关节红肿，神经系统阴性。血常规：Hb90g/L；WBC $20 \times 10^9/L$ ，N 12%，L 82%，PLT $50 \times 10^9/L$ 。血涂片示：原始幼稚细胞3%，直径 $< 12 \mu m$ ，核圆，偶有凹陷、折叠，核质较粗，核位142个、较小，细胞质少；浆偏蓝；浆内无明显颗粒，过氧化物酶染色阴性。血沉50cm/h。经骨髓检查证实为急性淋巴细胞白血病。免疫分型为前：B细胞型。细胞遗传学检查示有48条染色体。分子遗传学检查发现BCR/ABL融合基因。

74.下列骨髓象哪项与上述诊断相符

- A.异常细胞形态大，胞质嗜碱性强，多空泡
- B.异常细胞大小一致，以小型为主；PAS染色阳性
- C.异常细胞形态大，核呈镜影对称，且有明显核仁
- D.异常细胞过氧化物酶染色阳性
- E.异常细胞非特异性酯酶染色阳性，可被氟化物抑制

75.按上述资料，应属下列哪一型

- A.L1型，高危型
- B.L2型，标危型
- C.L2型，高危型
- D.L3型；高危型
- E.L1型；标危型

76.本例治疗的全部疗程是

- A.1-1.5年

- B.2.5-3年
- C.3.5-4年
- D.4-4.5年出
- E.5年

77.如本例早期强化治疗期间出现头痛、呕吐、面瘫。为明确原因，应首先采取哪项诊断措施

- A.复查骨髓象
- B.神经系统体格检查
- C.头颅CT
- D.脑电图检查
- E.腰椎穿刺，查脑脊液常规、生化及找异常细胞

78.如经检查确诊为中枢神经系统白血病，经积极治疗，再次取得完全缓解。为争取提高长期无病生存率，下列哪项治疗措施

- A.采用更强烈的化疗方案
- B.自身外周血干细胞移植
- C.增加大剂量甲氨蝶呤剂量
- D.异基因造血干细胞移植
- E.原方案继续治疗

(79-80题共用题干)

患儿男；5岁，5天前无诱因出现发热、寒战，诉腰部疼痛，哭闹不止，尿频，排尿后经短暂间歇又可排出较多尿量。

79.入院后需完善的检查，非必需的是

- A.泌尿系超声
- B.尿常规、血常规
- C.尿培养
- D.择期逆行排尿造影
- E.双肾核磁

80.如泌尿系超声及逆行排尿造影回报输尿管轻中度扩张，肾盂轻度扩张，轻度穹隆变钝，分级为

- A.I级
- B.I级
- C.Ⅲ级
- D.IV级
- E.V级

(81-83题共用题干)

患儿6岁女孩，发热2天，今晨出现臀部及双下肢皮疹，紫红色斑丘疹，伴腹痛，膝关节肿胀。超声提示关节腔可有浆液性积液。3天后患儿查尿蛋白+，尿红细胞14个/HFP。

81.该患儿最可能的诊断是

- A.败血症
- B.过敏性紫癜
- C.风湿性关节炎
- D.血小板减少性紫癜
- E.SLE

82.关于该患儿临床特点描述错误的是

- A.上呼吸道感染是过敏性紫癜的诱因
- B.皮疹突出于表面，压之不褪色，严重时可伴大疱及出血性坏死
- C.一般1-2周消退，不留痕迹

- D.关节肿胀可为对称性
- E.治疗不及时可致关节畸形

83.对于该患儿的肾脏损害描述不准确的是

- A.多发生在皮疹后2周内
- B.30%-60%可有肾脏累及
- C.可表现为单纯性血尿
- D.可表现为单纯性蛋白尿
- E.可出现急性肾炎、急进型肾炎表现

(84-86题共用题干)

患儿男，12岁，患I型糖尿病，近日因肺部感染诱发酮症酸中毒。

84.特征性症状是

- A.烦渴、多饮、多尿
- B.呼气有烂苹果味
- C.昏迷
- D.皮肤干燥，弹性差
- E.呼吸深大

85.胰岛素最佳使用方法

- A.大剂量胰岛素静脉注射+皮下注射
- B.大剂量胰岛素静脉滴注
- C.大剂量胰岛素皮下注射
- D.小剂量胰岛素静推
- E.小剂量胰岛素静滴

86.治疗错误的是

- A.积极碳酸氢钠液纠正酸中毒
- B.及时使用胰岛素
- C.积极补液纠正脱水
- D.随访血钾，防止低血钾
- E.治疗肺部感染

(87-90题共用题干)

患儿男，8岁，不慎溺水后2小时入院，查体：烦躁不安，明显呼吸困难，三凹征阳性，口唇发绀，心率125次/分，呼吸55次/分，血压100/70mmHg，双肺可闻及大量湿罗音。

87.该患儿首选的检查为

- A.胸部X线片
- B.胸部CT片
- C.超声心动图
- D.血气分析
- E.脑部CT

88.该患儿需尽早使用的是

- A.加强抗感染力度
- B.呼吸兴奋剂
- C.应用PEEP/CPAP
- D.高浓度面罩给氧
- E.扩容纠酸

89.如该患儿突然出现呼吸更急促；三凹征加重，反应差查体发绀加重，心率突然增加至190次/分；最可能导致此现象的因素为

- A.合并呼吸衰竭
- B.合并心力衰竭:
- C.合并缺氧性脑病
- D.低钾血症
- E.低钙血症

90.对该患儿的监护重点应观察:

- A.血压
- B.心功能
- C.尿量
- D.神经反射
- E.血氧饱和度

(91-92题共用备选答案)

- A.2岁
- B.3岁
- C.4岁
- D.5岁
- E.6岁

91.会骑三轮车,能说短歌谣的年龄

92.能单腿跳,开始识字的年龄

(93-95题共用备选答案)

- A.小脑幕上硬膜下出血路
- B.小脑幕下出血
- C.脑室内室管膜下出血
- D.脑室内脉络膜丛出血
- E.脑实质出血

93.足月新生儿生后意识障碍,呼吸不规则,呼吸暂停肌张力低下见于

94.足月新生儿生后不久激惹性尖叫,惊厥见于

95.早产儿,嗜睡,呼吸不规则,肌张力低下见于

(96-97题共用备选答案)

- A.幼年类风湿关节炎
- B.川崎病
- C.结节性多动脉炎
- D.过敏性紫癜
- E.风湿性心脏炎

96.男,2岁,高热7天,伴口唇干裂,杨梅舌,手掌、足底潮红

97.女,12岁,低热3周;近日出现游走性关节肿痛,活动后心悸。气促。体检发现心音低钝,心尖区有杂音,心音提示心脏扩大

(98-100题共用备选答案)

- A.血培养
- B.骨髓培养
- C.尿培养
- D.粪便培养
- E.胆汁培养

98.用过氯霉素未能确诊的疑似伤寒的病儿应采用

99.解除患儿隔离应采用

100.慢性伤寒患儿必要时采用