

330 妇产科学

专业知识

一、A1

1. 下列哪项提示该孕妇胎盘功能低下
 - A. NST 反应型
 - B. OCT 阴性
 - C. 羊水白色浊状
 - D. B 超示胎盘功能III级
 - E. 连续 3 日测孕妇尿 E3 值分别是 8mg/24 小时, 8mg/24 小时, 6mg/24 小时
2. 高张性宫缩乏力(子宫收缩不协调)临床表现特点, 正确的是
 - A. 宫缩极性倒置, 无对称性, 节律不协调
 - B. 比低张性宫缩乏力多见
 - C. 形成病理收缩环, 而产程停滞
 - D. 宫腔压力低
 - E. 子宫收缩间歇时, 子宫松弛好
3. 有关不协调性子宫收缩乏力, 以下哪项是正确的
 - A. 影响胎头内旋转
 - B. 可用缩宫素加强宫缩, 尽快使胎儿娩出
 - C. 对胎儿无影响
 - D. 可导致胎儿在宫内缺氧, 发生胎儿窘迫
 - E. 可不处理, 等待自然分娩
4. 持续性枕横(后)位对胎儿的主要影响是

- A. 常出现胎儿窘迫和新生儿窒息使围产儿死亡率增高
 - B. 新生儿 RDS 发生率增加
 - C. 可导致新生儿低血糖
 - D. 导致新生儿红细胞增多症
 - E. 导致新生儿呕吐
5. 关于产褥病率的叙述，正确的是
- A. 产后 1 个月恶露不净可引起产褥病率
 - B. 产褥病率的原因以产褥感染为主
 - C. 产后盆腔淤血综合征可引起产褥病率
 - D. 产褥病率不包括产后中暑
 - E. 胎盘或胎膜残留是产褥病率的主要原因
6. 在我国，目前最常见的性传播疾病是
- A. 梅毒
 - B. 淋病
 - C. 沙眼衣原体感染
 - D. 尖锐湿疣
 - E. 细菌性阴道病
7. 有关妊娠合并阑尾炎哪项不正确
- A. 妊娠不诱发阑尾炎
 - B. 妊娠子宫能使阑尾位置发生改变
 - C. 妊娠期阑尾炎易发生穿孔
 - D. 妊娠期阑尾炎由于增大的子宫推移，容易使炎症局限
 - E. 炎症波及子宫浆膜，可诱发宫缩

8. 有关产褥期下肢血栓性静脉炎哪项不正确

A. 病变单侧居多

B. 彩色超声多普勒检查可协助诊断

C. 也称“股白肿”

D. 产后 2~3 周多见

E. 表现为弛张热

9. 有关胎儿生长受限终止妊娠的指征，正确的是

A. 治疗中发现宫高增加不明显

B. 治疗后 B 超检查胎儿未见增长，而胎儿已成熟

C. NST 无反应型，缩宫素激惹试验阴性

D. 先兆子痫，孕妇水肿无减轻

E. 已见红

10. 有关 X 连锁显性遗传病，正确的是

A. 男性患者多于女性患者

B. 患者的双亲之一为患者

C. 女性患者的子女均为携带者

D. 男性患者的子女均为患者

E. 交叉遗传

11. 根据其安全性及可靠性，目前常用的产前染色体核型分析的诊断方法是

A. 绒毛活检术

B. 羊膜腔穿刺术

C. 经皮脐血穿刺术

D. 胎儿镜检查

E. 胚胎植入前诊断

12. 关于羊水的描述，下列哪项正确

- A. 羊水不属于胎儿附属物的一部分
- B. 妊娠晚期羊水主要来源于羊膜上皮细胞分泌
- C. 羊水量超过 3000ml，为羊水过多
- D. 羊水量低于 100ml，为羊水过少
- E. 足月妊娠时羊水量为 500~1000ml

13. 下列哪项描述正确

- A. 妊娠期血容量无明显变化
- B. 妊娠期红细胞计数下降
- C. 妊娠期凝血因子 II、V、VII、VIII
- D. 妊娠期凝血因子 XI、XII 升高
- E. 妊娠期白细胞变化不明显

14. 关于生理性宫缩，下列描述哪项正确

- A. 妊娠晚期才出现生理性宫缩（Braxton-Hicks 宫缩）
- B. 此宫缩对胎儿发育不利，可诱发早产
- C. 妊娠 28 周后增多
- D. 宫缩比较规则
- E. 宫缩时孕妇通常感到疼痛

15. 关于骨盆内测量哪项不正确

- A. 骨盆内测量时间为妊娠 24~36 周
- B. 对角径为耻骨联合下缘至骶岬上缘中点
- C. 对角径正常值为 12.5~13cm

D. 对角径减去 1.5~2cm 即为骨盆的真结合径

E. TO=7.5cm, 必须剖宫产终止妊娠

16. 软产道不包括

A. 子宫

B. 子宫下段

C. 子宫颈

D. 阴道

E. 盆底软组织

17. 有关异位妊娠, 哪项是正确的

A. 均有停经史

B. 尿妊娠试验阴性, 可排除异位妊娠

C. 迟早会发生内出血, 陷人休克

D. 后穹窿穿刺阴性, 可排除异位妊娠

E. 病程迁延较久者, 可因血液凝固与周围器官粘连形成包块

18. 盆腔肿块, 阴道少量出血, 下列哪项可以排除陈旧性宫外孕

A. 尿妊娠试验阴性

B. 血 HCG 试验阳性

C. 后穹窿穿刺未抽出血

D. 诊断性刮宫病理报告有少许变性的绒毛

E. 诊断性刮宫病理报告为子宫内膜 A-S 反应

19. 下列哪项不是氯米芬的适应证

A. 低促性腺激素性闭经

B. 无排卵性功血

C. 多囊卵巢综合征

D. 黄体功能不全

E. 下丘脑功能失调性闭经

20. III度子宫脱垂患者，阴道脱出物的特点是

A. 呈茄子状，末端为子宫颈外口

B. 有长蒂与脱出物相连

C. 脱出物呈球形，两侧可见输卵管开口

D. 脱出物表面呈暗红色海绵状

E. 肿物呈囊性位于阴道前壁，表面为阴道黏膜

21. 以下说法哪项正确

A. 人体站立时，子宫纵轴与阴道纵轴平行

B. 张力性尿失禁是指增加腹压时有尿液溢出

C. I 度子宫脱垂是指宫颈外口低于坐骨棘一水平

D. 子宫脱垂常引起月经失调

E. Manchester 手术是指阴道前后壁修补、骶韧带缩短，部分切除

22. 妊娠晚期提示胎盘早剥隐性出血的最主要的临床特征是

A. 导尿出现血尿，子宫体压痛

B. 子宫局部或大部有压痛伴阴道流血

C. 腹痛，子宫放松不好伴有胎心率异常

D. 下腹痛，子宫呈葫芦形，胎心率出现异常

E. 子宫下段压痛、血尿伴胎心率异常

23. 32 周妊娠，下列哪种表现可诊断为早产临产

A. 少量阴道流血

- B. 规律子宫收缩，宫颈管消退 75%，宫口无扩张
- C. 不规律子宫收缩，宫颈管消退 50%
- D. 不规律子宫收缩，宫颈管无消退
- E. 规律子宫收缩，宫颈管消退 75%，宫口扩张 2cm 以上

24. 下列哪项不是稽留流产导致严重出血的原因

- A. 刮宫困难易穿孔
- B. 绒毛膜促性腺激素的缺乏
- C. 稽留时间过长，可发生凝血功能障碍
- D. 雌激素不足，子宫对缩宫素不敏感，宫缩乏力
- E. 胚胎组织机化粘连，刮宫困难易致组织残留

25. Pre-eclampsia 患者住院后突然出现抽搐时，紧急的处理应首选

- A. 移送于暗室，放置开口器
- B. 测血压，查眼底
- C. 快速静滴 20%甘露醇 250ml
- D. 立即静脉推注 25%硫酸镁 20ml 及镇静药
- E. 立即行剖宫产术

26. 以下哪项不是妊高征严重的产科并发症

- A. 脑出血
- B. 妊高征心脏病
- C. 早产
- D. HELLP 综合征
- E. 肝包膜下出血

27. 病毒性肝炎合并妊娠的处理，下列哪项是错误的

- A. 禁用四环素治疗和预防感染
- B. 产时常规选用对肝脏无害的抗生素
- C. 近预产期应使用维生素 K 并备新鲜血
- D. 临产期间应及时加用肝素预防 DIC 发生
- E. 早期妊娠应行人工流产，中期妊娠一般不主张终止妊娠

28. 有关妊娠期贫血的说法以下哪项不正确

- A. Hb $61 \sim 90\text{g/L}$, RBC $(2.0 \sim 3.0) \times 10^{12}/\text{L}$ 为中度贫血
- B. 输血应在 Hb $< 60\text{g/L}$ ，近预产期或近期行剖宫产时实施，并少量多次输入浓缩红细胞
- C. 巨幼红细胞性贫血多发生在孕中晚期，常伴有中、重度贫血
- D. 中、重度贫血孕妇，产程中酌情助产缩短第二产程
- E. 中、重度的缺铁性贫血，常伴有血小板减少

29. 下述哪项不属乙型病毒性肝炎母婴传播途径

- A. 粪-口传播
- B. 经胎盘传播
- C. 乳汁传染
- D. 密切生活接触传染
- E. 娩出时接触母亲产道分泌液或血污染

30. 目前 HPV 感染的检测方法不包括

- A. 细胞学涂片
- B. 活体组织病理学
- C. 体外培养
- D. PCR

E. 原位杂交

31. 宫颈癌保留生育功能的手术是

- A. 广泛子宫切除术及盆腔淋巴结清扫术
- B. 筋膜外全子宫切除术
- C. 改良广泛子宫切除术及盆腔淋巴结清扫术
- D. 经阴道广泛子宫切除术及腹膜外淋巴结清扫术
- E. 宫颈锥切术及根治性宫颈切除术

32. 子宫肌瘤最常见的临床症状是

- A. 接触性出血
- B. 腹痛
- C. 白带增多
- D. 尿频
- E. 月经改变

33. 子宫内膜癌治疗中以下哪项对孕激素治疗反应好

- A. 组织学分级高分化
- B. PR(-)
- C. 肿瘤体积大
- D. 明确诊断后至治疗的时间长
- E. 已有转移

34. 关于子宫肉瘤的描述下列哪项不正确

- A. 子宫肉瘤可发生在宫颈或宫体
- B. 子宫平滑肌肉瘤最常见
- C. 手术是治疗的首选

- D. 淋巴转移是子宫肉瘤主要的转移途径
- E. 恶性中胚叶混合瘤也称癌肉瘤
35. 下列哪种情况属于卵巢恶性肿瘤 FIGO 分期的 II 期
- A. 肿瘤局限于一侧卵巢
- B. 肿瘤局限于卵巢和子宫
- C. 淋巴结有肿瘤转移
- D. 肿瘤局限于一侧卵巢，但盆腔外腹膜有显微镜下种植
- E. 肝表面转移
36. 治疗 IUD 所致月经过多较好的药物是
- A. 铁制剂
- B. 维生素 K 制剂
- C. 缩宫素
- D. 吲哚美辛（消炎痛）
- E. 抗生素
37. 以下哪种激素不由卵巢分泌
- A. 雌激素
- B. 孕激素
- C. 睾酮
- D. 双氢睾酮
- E. 雄烯二酮
38. 以下哪项临床表现提示卵巢已排卵
- A. 基础体温单项
- B. 子宫内膜呈现月经期改变

- C. 子宫内膜呈现增殖期改变
- D. 子宫内呈现分泌期改变
- E. 血清孕酮 $<3\text{nmol/L}$
39. 以下哪种说法是错误的
- A. 阴道下 1/3 段, 前方是尿道
- B. 阴道中 1/3 段, 后方是直肠
- C. 阴道中 1/3 段, 前方是膀胱颈和膀胱三角
- D. 阴道上 1/3 段, 前方是膀胱
- E. 阴道中 1/3 段两侧是主韧带
40. 关于绝经下列说法哪项是正确的
- A. 手术绝经者更年期症状更重
- B. 人工绝经指手术切除子宫
- C. 45 岁以前绝经为卵巢早衰
- D. 更年期症状一定出现在月经停止后
- E. 围绝经期卵巢抑制素升高
41. 关于月经周期中, 生殖激素的变化不正确的是
- A. 经前 2 天, 血 E₂、P 水平下降
- B. 经期 2 天, FSH 升高、LH 脉冲分泌频率增快
- C. 在 LH 峰出现后, 血 P 浓度下降
- D. 排卵后, E₂、P 升高
- E. 孕激素抑制 GnRH 分泌频率
42. 关于青春期发育机制与动因, 以下哪项错误
- A. 青春期前, 下丘脑对卵巢激素的负反馈作用不敏感

- B. 青春期垂体对 GnRH 反应性增强
 - C. 下丘脑对性腺的抑制增强
 - D. 下丘脑的多巴胺等单胺类递质促使青春期发动
 - E. 下丘脑中去甲肾上腺素对 GnRH 通路起易化作用
43. Asherman 综合征是指
- A. 染色体异常
 - B. 垂体功能低下
 - C. 闭经溢乳综合征
 - D. 宫腔粘连所导致的闭经
 - E. 先天性子宫缺如
44. 关于 PCOS, 以下哪项正确
- A. 雌酮的增多, 主要与睾酮在外周组织芳香化酶作用下的转化有关
 - B. LH 升高, 较恒定在月经周期中卵泡期上下水平
 - C. 50%~60%呈现 IR 并有发展为非胰岛素依赖性糖尿病的危险
 - D. HMG 促排卵优于氯米芬, 30%~35%的患者对氯米芬无效
 - E. 螺内酯(安体舒通)可同时抑制卵巢和肾上腺合成雄激素
45. 关于原发性痛经, 以下哪项不正确
- A. 无排卵性子宫内膜所含 PG 浓度甚低, 一般不发生痛经
 - B. 精神神经因素可加重痛经
 - C. B 超是最有价值的辅助诊断方法
 - D. 子宫内膜 PG 浓度越高, 痛经越严重
 - E. 口服避孕药对原发性痛经疗效达 90%以上
46. 关于功血的病理生理, 以下哪项不正确

- A. 青春期无排卵功血，FSH 呈持续高水平，无 LH 高峰形成
 - B. 围绝经期（更年期）无排卵功血，FSH 和 LH 同样升高
 - C. 雌激素突破性出血是因为雌激素水平过高而无孕激素对抗
 - D. 雌激素撤退性出血与外源性雌激素撤药后引起的出血类似
 - E. 青春期功血与更年期功血的发病机制类似
47. 关于低促性腺激素性闭经，以下哪项不正确
- A. 一般卵巢分泌雌激素不受影响
 - B. 雌、孕激素的周期疗法一般以 6 个周期为一疗程
 - C. 雌、孕激素周期疗法可纠正合并的高雄激素血症
 - D. 先行人工周期，再用氯米芬促排卵效果好
 - E. 氯米芬可以调整 FSH 与 LH 的比例
48. 关于妇女保健，下列哪项内容不正确
- A. 女童期保健是从幼儿期开始，直接影响到青春期和孕龄期妇女的健康
 - B. 青春期保健年龄范围为 WHO 规定的 10~20 岁
 - C. 青春期保健的重点是月经期卫生和开展恰当的性教育
 - D. 围婚期保健是为保障婚配双方和子代健康开展的保健措施
 - E. 孕产期保健是为降低孕产妇和围产儿死亡率而进行的保健服务措施
49. 以下哪项不支持 Empty sella syndrome 的诊断
- A. 一般无内分泌功能异常
 - B. 当 PRL 升高时，E2 低落
 - C. 有视力障碍和视野缺损
 - D. X 线片显示蝶鞍扩大
 - E. 可有闭经伴溢乳

50. 关于围绝经期和绝经早期的症状，以下哪项不正确

- A. 常出现有排卵性功能失调性子宫出血
- B. 血管舒缩症状可持续 2~3 年
- C. 出现“假性心绞痛”和高血压
- D. 不会发生骨质疏松症
- E. 可出现焦虑、抑郁、多疑、恐怖感等症状

51. 男性精液检查，少精症是指精液密度

- A. $\leq 2\ 000$ 万/ml
- B. $\leq 3\ 000$ 万/ml
- C. $\leq 4\ 000$ 万/ml
- D. $\leq 6\ 000$ 万/ml
- E. $\leq 8\ 000$ 万/ml

52. 女性，28 岁。婚后 3 年未孕，婚后月经周期不规则，近 1 年来闭经，伴少量溢乳，妇科检查正常，较为重要的检查手段是

- A. 黄体酮试验
- B. 促黄体释放激素试验
- C. 血 FSH、LH、E₂、P、T、PRL 测定
- D. 输卵管通畅试验
- E. B 超检查

53. 孕 30 周，腹胀 1 周。产检：宫高 37cm，腹围 104cm，胎位不清，胎心 146 次/分，心音遥远，以下哪项处理不适当

- A. B 超除外胎儿畸形
- B. 羊水穿刺注入地塞米松促肺成熟

- C. 穿刺放羊水每次不超过 1 000ml，以减轻腹部症状
- D. 行糖耐量检查，排除糖尿病.
- E. 可用吲哚美辛治疗，但不宜长用

54. 28 岁初产妇，足月临产，产程进展顺利，LOA，先露 S-0，胎心监护突然出现较频发的中、重度变异减速，此多为何种原因

- A. 胎盘功能减退
- B. 子宫松弛，胎先露不入盆
- C. 脐带牵拉或受压
- D. 慢性胎儿窘迫
- E. 宫缩过强

55. 28 岁初产妇，孕 39 周，规律宫缩 12 小时入院，当时为 LOA 位，胎心率 136 次/分，宫口开大 2cm，S-0，胎膜已破，宫缩 30~40 秒/1~2 分，产妇疼痛哭叫。此时的临床表现应是

- A. 协调性子宫收缩乏力
- B. 协调性子宫收缩过强
- C. 原发性宫缩乏力
- D. 继发性宫缩乏力
- E. 不协调性子宫收缩过强

56. 28 岁初产妇，孕 39 周，规律宫缩 12 小时入院，当时为 LOA 位，胎心率 136 次/分，宫口开大 2cm，S-0，胎膜已破，宫缩 30~40 秒/1~2 分，产妇疼痛哭叫。此时应该如何处理

- A. 缩宫素点滴加强宫缩
- B. 严密观察产程进展

C. 给哌替啶(杜冷丁) 100mg

D. 立即行剖宫产术

E. 立即产钳助产

57. 28岁初产妇, 孕39周, 规律宫缩12小时入院, 当时为LOA位, 胎心率136次/分, 宫口开大2cm, S-0, 胎膜已破, 宫缩30~40秒/1~2分, 产妇疼痛哭叫。

如经处理后, 宫缩30秒/2~3分, 宫口开大6cm已2小时, 先露仍为S-0, 有产瘤5cmX4cmX3cm, 及颅骨重叠, 宫缩时儿头不下降, 查骨盆正常, 胎儿估计3900g, 此时应如何处理

A. 加强宫缩

B. 继续严密观察等待自然分娩

C. 给吗啡肌注

D. 立即剖宫产术

E. 准备宫口开全产钳助产

58. 孕妇27岁, G2P1, 妊娠34周。近1周来有恶心、呕吐、食欲欠佳, 皮肤瘙痒, 巩膜黄染, 妊娠期曾服用维生素C、叶酸及钙片。血压140/90mmHg, ALT 192U/L, 尿蛋白(±)。子宫底高度33cm, 胎心率140次/分。最可能的诊断是

A. 药物性肝炎

B. 病毒性肝炎

C. Pre-eclampsia 肝损害

D. 妊娠期肝内胆汁淤积症

E. 急性胃肠炎

59. 孕妇27岁, G2P1, 妊娠34周。近1周来有恶心、呕吐、食欲欠佳, 皮肤瘙痒, 巩膜黄染, 妊娠期曾服用维生素C、叶酸及钙片。血压140/90mmHg, ALT 192U/L,

尿蛋白(±)。子宫底高度 33cm, 胎心率 140 次/分。最有帮助的诊断方法是

- A. 大便常规
- B. 血清胆红素测定
- C. 肝炎病毒抗原、抗体测定
- D. 血清胆酸测定
- E. 眼底检查

60. 孕妇 27 岁, G2P1, 妊娠 34 周。近 1 周来有恶心、呕吐、食欲欠佳, 皮肤瘙痒, 巩膜黄染, 妊娠期曾服用维生素 C、叶酸及钙片。血压 140/90mmHg, ALT 192U/L, 尿蛋白(±)。子宫底高度 33cm, 胎心率 140 次/分。最适当的处理是

- A. 隔离, 静脉滴注保肝药物, 视母儿情况处理
- B. 卧床休息, 口服保肝药物, 继续妊娠
- C. 立即行剖宫产术, 防止肝脏负担继续加重
- D. 立即隔离, 行引产术终止妊娠
- E. 观察 1 周, 肝功能无明显改善者终止妊娠

61. 女, 26 岁。G1P0, 31 周妊娠。阴道少量出血, 伴规律性腹痛 3 小时入院。查体: 宫底高度 30cm, LOA, 胎心 120 次/分, 宫缩 20 秒/5~7 分。阴道检查: 宫颈管消退 70%, 宫口尚未扩张。最可能的诊断是

- A. 早产临产
- B. 胎儿宫内窘迫
- C. 胎儿发育受限
- D. 先兆早产
- E. 轻型胎盘早剥

62. 女, 26 岁。G1P0, 31 周妊娠。阴道少量出血, 伴规律性腹痛 3 小时入院。查

体:宫底高度 30cm, LOA, 胎心 120 次/分, 宫缩 20 秒/5~7 分。阴道检查: 宫颈管消退 70%, 宫口尚未扩张。不宜选用下列哪项处理措施

- A. 镇静药
- B. 卧床休息
- C. B 型超声检查胎儿大小
- D. 选用 α 肾上腺素能受体兴奋药
- E. 选用 β 肾上腺素能受体兴奋药

63. 女, G1P0, 孕 38 周, 规律宫缩 5 小时入院。产科检查: 宫口扩张 3cm, 胎心 140 次/分, 胎头已衔接。突发抽搐, 继之意识消失, 测血压 170/120mmHg, 尿蛋(++)。此病例应诊断为

- A. 子痫前期
- B. 产前子痫
- C. 癫痫
- D. 产时子痫
- E. 脑血栓

64. 女, G1P0, 孕 38 周, 规律宫缩 5 小时入院。产科检查: 宫口扩张 3cm, 胎心 140 次/分, 胎头已衔接。突发抽搐, 继之意识消失, 测血压 170/120mmHg, 尿蛋(+++)。以下哪项处理不适宜

- A. 20%甘露醇 250ml 快速静点
- B. 冬眠合剂静推
- C. 25%硫酸镁 20ml 缓慢静推
- D. 急行剖宫产
- E. 留置尿管

65. 女, 37 岁。第 2 胎 22 周妊娠, 做家务劳动后感胸闷气短, 近 1 周夜间经常咳嗽、咳痰, 不能平卧。查体: 心率 120 次/分, 心界向左扩大, 心尖区可闻收缩期及舒张期雷鸣样杂音, 双肺底闻及小水泡音, 双下肢水肿(+), 第一次妊娠晚期有类似情况。该患者的诊断是

- A. 心力衰竭
- B. 肺部感染
- C. 妊娠水肿
- D. 支气管哮喘
- E. 妊娠期生理变化

66. 女, 37 岁。第 2 胎 22 周妊娠, 做家务劳动后感胸闷气短, 近 1 周夜间经常咳嗽、咳痰, 不能平卧。查体: 心率 120 次/分, 心界向左扩大, 心尖区可闻收缩期及舒张期雷鸣样杂音, 双肺底闻及小水泡音, 双下肢水肿(+), 第一次妊娠晚期有类似情况。最正确的处理是

- A. 强心、利尿, 继续妊娠, 加强产前监护
- B. 限制食盐摄入
- C. 住院控制心力衰竭后剖宫取胎及做绝育术
- D. 住院控制心力衰竭后引产
- E. 住院控制心力衰竭后可以继续妊娠

67. 女, 37 岁。第 2 胎 22 周妊娠, 做家务劳动后感胸闷气短, 近 1 周夜间经常咳嗽、咳痰, 不能平卧。查体: 心率 120 次/分, 心界向左扩大, 心尖区可闻收缩期及舒张期雷鸣样杂音, 双肺底闻及小水泡音, 双下肢水肿(+), 第一次妊娠晚期有类似情况。产后处理, 下列哪一项正确

- A. 宫缩欠佳, 可以应用麦角新碱

- B. 鼓励早下床活动
- C. 可以母乳喂养
- D. 限制输液速度和总入量
- E. 无感染征象可预防性使用抗生素 3 天

68. 38 岁已婚妇女，G2P1，连续 2 次 TCT 结果为：未明确诊断意义的不典型鳞状细胞 (ASOUS)。应立即做以下哪项处理

- A. 全子宫切除
- B. 宫颈广泛切除术
- C. 宫颈锥切术
- D. 阴道镜检查
- E. 盆腔 MRI

69. 38 岁已婚妇女，G2P1，连续 2 次 TCT 结果为：未明确诊断意义的不典型鳞状细胞 (ASOUS)。确诊的方法是

- A. 宫颈活组织病理检查
- B. 高危 HPV-DNA 检测
- C. 血 HCG 升高
- D. 膀胱镜检查
- E. 宫腔镜检查

70. 患者 24 岁，大流术 7 个月后一直阴道淋漓出血，胸痛 1 周，喷射性呕吐 1 天，尿妊娠试验阳性，B 超示宫腔内未见胎囊但宫腔线不清，肌壁间局灶血流丰富。最可能的诊断

- A. 不全流产
- B. 葡萄胎

- C. 绒癌
- D. 宫内残留
- E. 侵蚀性葡萄胎

71. 患者 24 岁, 大流术 7 个月一直阴道淋漓出血, 胸痛 1 周, 喷射性呕吐 1 天, 尿妊娠试验阳性, B 超示宫腔内未见胎囊但宫腔线不清, 肌壁间局灶血流丰富。

下列哪项是不恰当的处理

- A. 摄胸片
- B. 做脑 CT
- C. 立即清宫
- D. 血 β -HCG 测定
- E. 尽快化疗

72. 22 岁女性, 15 岁月经初潮, 周期 4~7 天/2~3~4 个月, 量中等, 现闭经 2 年, 常每 5~6 个月用黄体酮, 撤退性出血阳性。检查面部痤疮, 体重 74kg, 身高 1.62m, 血性激素 LH 17U/L, FSH 8U/L, E2 25pg/ml, PRL5ng/ml, T1.9ng/ml; B

超示子宫附件未见明显异常。最恰当的诊断应该是

- A. PCOS
- B. I 度闭经
- C. 下丘脑性闭经
- D. 高雄激素血症
- E. 卵巢性闭经

73. 22 岁女性, 15 岁月经初潮, 周期 4~7 天/2~3~4 个月, 量中等, 现闭经

年，常每 5~6 个月用黄体酮，撤退性出血阳性。检查面部痤疮，体重 74kg，身

高 1.62m，血性激素 LH 17U/L, FSH 8U/L, E2 25pg/ml, PRL5ng/ml, T1. 9ng/ml;B

妇产科学预测卷

超声子宫附件未见明显异常。最恰当的治疗是

- A. 雌、孕激素序贯周期治疗
- B. 复合口服避孕药周期治疗
- C. 泼尼松(强的松)治疗
- D. 螺丙酯(安体舒通)治疗
- E. 氯米芬促排卵治疗

74. 产褥期是指分娩结束至产后几周

- A. 5 天
- B. 10 天
- C. 2~4 周
- D. 4~6 周
- E. 6~8 周

75. 产后多久子宫进入盆腔

- A. 5 天
- B. 10 天
- C. 2~4 周
- D. 4~6 周
- E. 6~8 周

76. 早期妊娠

- A. 12 周末以前
- B. 13~27 周末

C. 20~28 周

D. 28 周以后

E. 37 周以后

77. 晚期妊娠

A. 12 周末以前

B. 13~27 周末

C. 20~28 周

D. 28 周以后

E. 37 周以后

78. 停经 12 周，伴少量阴道出血及轻微下腹痛。内诊子宫 7 周大小，B 超示子宫 6.3 cm X 5.2 cm X 4.6 cm, 可见妊娠囊，未见胎心。

A. 卧床休息

B. 大量广谱抗生素静点后清宫

C. 应用雌激素 3 天后做刮宫术

D. 立即刮宫

E. 观察，无特殊处理

79. 停经 50 天，伴月经量出血 1 周，下腹痛 1 天，内诊子宫 7 周大小，宫口可容 1 指。

A. 卧床休息

B. 大量广谱抗生素静点后清宫

C. 应用雌激素 3 天后做刮宫术

D. 立即刮宫

E. 观察，无特殊处理

80. 宫颈癌筛查方法为

A. 腹腔镜

B. 宫颈细胞学检查+高危型 HPV-DNA 检测

C. 阴道镜

D. 宫腔镜

E. 宫颈组织病理学检查

81. 宫颈癌确诊方法为

A. 腹腔镜

B. 宫颈细胞学检查+高危型 HPV-DNA 检测

C. 阴道镜

D. 宫腔镜

E. 宫颈组织病理学检查

82. Ashermen 综合征

A. PRL > 50ng/ml

B. LH/FSH > 3, T > 96 μ g/ml

C. LH、FSH 均 < 5U/L

D. E2 < 20 μ g/mL、FSH > 40 μ g/ml

E. 五项激素水平全正常

83. Premature ovarian failure

A. PRL > 50ng/ml

B. LH/FSH > 3, T > 96 μ g/ml

C. LH、FSH 均 < 5U/L

D. E2 < 20 μ g/mL、FSH > 40 μ g/ml

E. 五项激素水平全正常

84. LH 峰出现后 24 小时进行

- A. 人工授精
- B. 配子移植
- C. 合子移植
- D. 胚胎移植
- E. 囊胚移植

85. 受精后 2~3 天进行

- A. 人工授精
- B. 配子移植
- C. 合子移植
- D. 胚胎移植
- E. 囊胚移植

86. 受精后 5 天进行

- A. 人工授精
- B. 配子移植
- C. 合子移植
- D. 胚胎移植
- E. 囊胚移植

87. 月经来潮，但经期腹痛明显，多伴子宫内膜异位症

- A. 双角子宫
- B. 处女膜闭锁
- C. 残角子宫
- D. 始基子宫
- E. 输卵管发育不全

88. 月经正常，无其他不适，多在人工流产时或 B 超检查时发现

- A. 双角子宫
- B. 处女膜闭锁
- C. 残角子宫
- D. 始基子宫
- E. 输卵管发育不全

89. 正常阴道 pH 为

- A. pH 3.8~4.4
- B. pH 5~6.6
- C. pH4.0~4.7
- D. pH 4.5~5.5
- E. pH 5.0~5.5

90. 滴虫阴道炎时阴道 pH 为

- A. pH 3.8~4.4
- B. pH 5~6.6
- C. pH4.0~4.7
- D. pH 4.5~5.5
- E. pH 5.0~5.5

91. 阴道假丝酵母菌病时阴道 PH 为

- A. pH 3.8~4.4
- B. pH 5~6.6
- C. pH4.0~4.7
- D. pH 4.5~5.5

E. pH 5.0~5.5

92. 细菌性阴道病时阴道pH 为

A. pH 3.8~4.4

B. pH 5~6.6

C. pH4.0~4.7

D. pH 4.5~5.5

E. pH 5.0~5.5

二、多选题

93. 下列哪些对子宫内膜异位症的诊断有意义

A. 子宫后倾固定

B. 后穹窿触痛结节

C. 卵巢巧克力囊肿

D. 子宫增大不平

E. CA125 升高

94. 病毒性肝炎对妊娠的影响，正确的是

A. 妊娠晚期患病，妊高征的发病率高

B. 易发生产后出血

C. 早产发生与围生儿死亡率明显增高

D. 易发生 DIC

E. 孕早期患乙型肝炎，婴儿感染率为 25%

95. 妊娠期泌尿系统的变化

A. 肾小球滤过率增加

B. 肾血流量减少

- C. 肾糖阈下降
 - D. 肾糖阈升高
 - E. 血清中尿素氮、肌酐较非孕期降低
96. 关于妊娠剧吐，以下哪些是正确的
- A. 可能与 HCG 水平增高有关
 - B. 高龄初产好发
 - C. 尿中出现酮体应补液治疗
 - D. 治疗中应监测电解质、肝功能
 - E. 必要时应行眼底和神经系统检查
97. 以下哪项可以判断卵巢已经排卵
- A. 子宫内膜呈现分泌期改变
 - B. 子宫内膜呈现增殖期改变
 - C. 基础体温为双项
 - D. 宫颈黏液为典型羊齿状结晶
 - E. 血清孕酮 $>5\text{nmol/L}$
98. 子宫颈黏膜下肌瘤须与哪些疾病鉴别
- A. 宫颈大型息肉
 - B. 子宫颈癌
 - C. 纳氏囊肿
 - D. 子宫内膜间质肉瘤
 - E. 重度宫颈糜烂
99. 关于生殖器疱疹，下列哪些正确
- A. 由单纯疱疹病毒引起

- B. 病原体 90%为 HSV- II
- C. 通过性接触传播，传染性强
- D. 潜伏期可以长达数月，以局部病损为主，无全身症状
- E. 妊娠合并生殖器疱疹者应在破膜前或破膜 4 小时内行剖宫产结束妊娠

100. 盆腔厌氧菌感染的特点主要有

- A. 形成盆腔脓肿
- B. 形成感染性血栓
- C. 50%~60%盆腔脓肿可培养出厌氧菌
- D. 脓液中有粪臭
- E. 病原体有脆弱杆菌、消化球菌、溶血链球菌等