

330 妇产科学

专业实践能力

一、A1

1. 哪项不是糖尿病终止妊娠的指标
 - A. 合并重度妊高征
 - B. 酮症酸中毒
 - C. 巨大儿
 - D. 胎儿宫内生长明显受限
 - E. 严重感染
2. 哪项不是生殖器结核常见的临床表现
 - A. 不孕
 - B. 月经过少或闭经
 - C. 下腹坠痛，经期加重
 - D. 低热、乏力、消瘦
 - E. 月经过多或痛经
3. 前置胎盘剖宫产手术时，最难处理的问题是
 - A. 子宫切口撕裂不易缝合
 - B. 胎儿头已入盆，取头困难
 - C. 胎盘前壁附着，难以娩出胎儿
 - D. 胎盘附着面的出血难以止血
 - E. 胎儿严重窒息
4. 行会阴侧后斜切开术时，未切断的组织是

- A. 部分肛提肌.
 - B. 球海绵体肌
 - C. 会阴浅横肌
 - D. 坐骨海绵体肌
 - E. 会阴深横肌
5. 前置胎盘行剖宫产手术前做 B 超最主要的目的是
- A. 胎儿是否存活
 - B. 了解胎头高低
 - C. 胎位是否正常
 - D. 估计胎儿大小
 - E. 决定子宫切口部位
6. 子宫胎盘卒中常并发于哪种情况
- A. 显性胎盘早期剥离
 - B. 隐性胎盘早期剥离
 - C. 完全性前置胎盘
 - D. 部分性前置胎盘
 - E. 子宫破裂
7. 关于围绝经期的描述, 哪项错误
- A. 卵巢内卵泡数明显减少, 且易发生卵泡发育不全
 - B. 围绝期开始后, 可以不再采取避孕措施
 - C. 月经周期不规律的围绝经期妇女, 多为无排卵月经
 - D. FSH 和 LH 水平升高
 - E. 生殖器官逐渐萎缩

8. 宫颈黏液呈羊齿状结晶时哪项不正确

- A. 黏液性状稀薄、透明
- B. 拉丝度可达 10cm 以上
- C. 氯化钠含量比例减少
- D. 月经周期第 8~10 天开始出现, 至排卵期最清晰
- E. 此时宫颈黏液最利于精子穿过

9. 关于下丘脑-垂体-卵巢轴, 哪项错误

- A. 控制女性发育、正常月经和性功能
- B. 受大脑高级中枢调节
- C. 大量雌激素抑制下丘脑分泌 FSH/LH
- D. 不参与机体内环境及物质代谢的调节
- E. 大量孕激素对 LHRH 呈抑制作用

10. 关于月经血的特征, 哪项不正确

- A. 一般为暗红色不凝固的血
- B. 月经血内纤维蛋白减少, 纤维蛋白原升高
- C. 剥落内膜中含有活性酶, 破坏凝血因子
- D. 正常情况下可有小血凝块
- E. 除血液外, 还有子宫内膜碎片、宫颈黏液及脱落阴道上皮

11. 关于梅毒下列哪项正确

- A. 普通消毒液如肥皂、乙醇对苍白密螺旋体无效
- B. 苍白密螺旋体不能通过胎盘屏障传给胎儿
- C. 苍白密螺旋体在 40°C 以上环境均可存活
- D. 苍白密螺旋体干燥 1~2 个小时即可死亡

E. 晚期梅毒传染性较一期梅毒强

12. 有关人工流产，哪项错误

A. 妊娠 10 周内可行吸宫术

B. 妊娠 14 周以上不宜用钳刮术

C. 人流术刮宫前常规肌注麦角新碱

D. 吸引负压宜 $<400\text{mmHg}$ ，不可 $>600\text{mmHg}$

E. 人工流产术后常规检查宫内吸出物

13. 口服避孕药的用法哪项错误

A. 长效口服避孕药月经周期第 5 天 1 片，第 10 天服第 2 片；以后按第一次服药日期每月服 1 片

B. 短效口服避孕药自月经周期第 5 天开始，每天 1 片，连服 21 天

C. 服短效避孕药前半周期出面，可增服炔雌醇至第 21 天

D. 服短效避孕药后半周期出血，增服炔雌醇至第 21 天

E. 探亲避孕药同房后即服 1 片，次日加服 1 片

14. 哪种病变是外阴癌前病变

A. 外阴鳞状上皮细胞增生

B. 外阴硬化型苔藓

C. 外阴硬化型苔藓合并鳞状上皮细胞增生

D. 外阴白癜风

E. 外阴色素减退疾病伴上皮不典型增生

15. 诊断宫颈癌的最主要方法

A. 宫颈刮片细胞学检查

B. 碘试验

C. 阴道镜检查

D. 宫颈锥切

E. 宫颈活组织病理学检查

16. 羊水过多放羊水治疗，哪项错误

A. 适用于症状严重，无法忍受者

B. 要求放羊水速度 $<500\text{ml}/\text{小时}$

C. 一次总量应超过 $2\ 000\text{ml}$

D. 放羊水太多，可引起早产

E. 3~4 周后可重复

17. 会阴侧切患者，伤口感染裂开，应从何日开始用高锰酸钾粉坐浴为宜

A. 产后 3~5 天

B. 产后 5~7 天

C. 产后 1 周后

D. 产后 2 周后

E. 产后 3 周后

18. 宫颈不典型增生的分级取决于

A. 细胞的异型性

B. 基底膜是否完整

C. 异型细胞侵犯上皮的范围

D. 细胞核分裂象多少

E. 宫颈糜烂面积的大小

19. 外阴鳞状上皮细胞增生的治疗主要是

A. 抗生素治疗

B. 局部皮质激素治疗

C. 局部丙酸睾酮治疗

D. 手术治疗

E. 局部雌激素治疗.

20. 子宫内膜癌手术治疗开腹后应首先进行

A. 立即全面探查盆腹腔

B. 取腹水或腹腔冲洗液

C. 钳夹宫角，以防癌细胞由输卵管溢出

D. 切除双附件

E. 用化疗药液冲洗盆腹腔，消灭转移到子宫外的癌细胞

21. 哪项是葡萄胎清除术后诊断侵蚀性葡萄胎的依据

A. 半年内 X 线胸片提示肺野外侧有多个圆形阴影

B. 1 年后 X 线胸片提示肺野外侧有多个圆形阴影

C. 1 年后出现阴道紫蓝色转移灶

D. 1 年后出现阴道不规则出血

E. 2 个月内血 β -HCG 仍未转阴

22. 衣原体感染生殖道的临床特征，哪项错误

A. 常向深层侵犯

B. 感染与不孕有关

C. 孕妇感染可引起流产，胎膜早破

D. 新生儿经阴道分娩，可引起沙眼衣原体眼结膜炎、肺炎

E. 可应用酶免法检测衣原体抗原

23. 关于细菌性阴道病，哪项不正确

- A. 阴道黏膜广泛充血
- B. 多数为厌氧菌感染
- C. pH 多数为 5.5~6.0
- D. 阴道分泌物中可找到线索细胞
- E. 是阴道内细菌生态平衡失调引起的

24. 哪项不是卵巢交界瘤的特点

- A. 上皮细胞增生活跃及核异型，细胞复层小于 3 层，无间质浸润
- B. 属于恶性肿瘤
- C. 大多对放疗敏感
- D. 生长缓慢，转移率低，复发迟
- E. 复发后仍是交界瘤

25. 青春期功血合并重度贫血，最恰当的止血方法是

- A. 大剂量雌激素
- B. 大剂量孕激素
- C. 大剂量雄激素
- D. 小剂量雌激素
- E. 小剂量孕激素

26. 哪项不是念珠菌阴道炎的高危因素

- A. 妊娠
- B. 糖尿病
- C. 应用大剂量抗生素
- D. 应用大剂量雌激素
- E. 慢性盆腔炎

27. 如临床可疑子宫内膜不规则脱落，进行诊刮的恰当时间是

- A. 月经来潮前
- B. 月经来潮 2 小时内
- C. 月经来潮第 1 天
- D. 月经来潮第 2 天
- E. 月经来潮第 5 天

28. 女，38 岁。检查发现宫颈糜烂面明显凹凸不平，占整个宫颈面积的 2/3 以上，其诊断为

- A. 单纯型中度糜烂
- B. 颗粒型重度糜烂
- C. 颗粒型中度糜烂
- D. 乳突型中度糜烂
- E. 单纯型重度糜烂

29. 女，26 岁。G1P0，宫内孕 41 周，宫口开大 4~5cm，胎心 120/min，胎心监测示“晚期减速”，胎儿头皮血 pH 7.15，最恰当的处理是

- A. 面罩吸氧提高胎儿血氧浓度
- B. 产妇左侧卧位，观察产程，等待自然分娩
- C. 静滴缩宫素加速产程
- D. 剖宫产结束分娩
- E. 待宫口开全，阴道助产缩短第二产程

30. 某孕妇，宫内孕 32 周，宫底达剑突下 2 横指，胎方位为 LSA，其最佳的胎所诊位置是

- A. 脐部

- B. 脐左上方
- C. 脐右上方
- D. 脐右下方
- E. 脐左下方

31. 女, 45 岁, 已婚。月经量增多 2 年, 子宫多发肌瘤, 如孕 14 周大小。最佳处理方法为

- A. 保守观察
- B. 药物治疗
- C. 药物治疗+子宫肌瘤摘除术
- D. 子宫肌瘤摘除术
- E. 全子宫切除术

32. 女, 52 岁。绝经 3 年, 反复阴道流血 4 个月。妇检外阴阴道正常, 宫颈光滑, 子宫正常大小, 双附件无异常, B 超提示宫腔内有回声团。诊断性刮宫未刮出组织, 哪项处理最恰当

- A. 采用口服止血药及激素药物
- B. 观察 3 个月再行 B 型超声检查
- C. 再次诊断性刮宫
- D. 宫腔镜检查
- E. 行子宫及双附件切除术

33. 25 岁, 初产妇, 宫内孕 36 周, 孕期检查正常, 出现皮肤瘙痒 3 周, 1 周来皮肤发黄, 食欲好, 无其他自觉不适, 检查血胆红素 3mg/dl , ALT 正常, 血压 $120/80\text{mmHg}$, 应首先考虑

- A. 妊娠高血压综合征

- B. 急性传染性肝炎
- C. 妊娠期胆汁淤积症
- D. 原发性妊娠急性脂肪肝
- E. 药物性肝炎

34. 经产妇，30 岁。宫内孕 35 周出现恶心、呕吐、不思饮食，. 血-ALT 增尚，HBsAg 阳性，诊断为急性乙型肝炎，宜采取哪项处理

- A. 隔离、保肝治疗、继续妊娠
- B. 卧床休息、保肝治疗、继续妊娠
- C. 隔离，肝炎治疗观察 1 周，肝功能无明显改善，应终止妊娠
- D. 隔离，终止妊娠
- E. 立即剖宫产

35. 女，46 岁。外阴瘙痒 10 余年，近日发现外阴有散在小丘疹，活检为 VINII，最佳治疗方案为

- A. 5%的氟尿嘧啶软膏外涂
- B. 激光治疗
- C. 外阴单纯切除
- D. 外阴广泛切除
- E. 定期随访

36. 女性，38 岁，G2P0, 痛经渐进加重 5 年。患者月经规律，5/28 天，量中。自 5 年前人流后开始痛经，以下腹部为重，放射至肛门及大腿，患者最可能的诊断是

- A. 急性盆腔炎
- B. 慢性盆腔炎急性发作

C. 原发性痛经

D. 子宫内膜异位症

E. 坐骨神经痛

37. 女，43岁。子宫增大如孕3个月，诊断为子宫肌瘤，行全子宫切除，保留双侧附件，不需切断的前带是

A. 圆韧带

B. 骨盆漏斗韧带

C. 卵巢子宫韧带

D. 主韧带

E. 阔韧带

38. 女，G1P0，宫内孕35周，胎位ROA，宫口开全1小时，胎心160~180次/分，胎先露位于S+3，应立即做何种处理

A. 吸氧

B. 立即剖宫产

C. 立即产钳助娩

D. 静滴缩宫素加强宫缩

E. 静注50%葡萄糖40ml+维生素C，改善胎儿窘迫

39. 女，45岁，外阴奇痒2年余。外阴皮肤增厚，纹理突出，由于长期搔抓出现不同程度的破损、皲裂、隆起。为确诊，应首选哪项检查

A. 刮片细胞学检查

B. 分泌物细菌学检查

C. 阴道镜检查

D. 病变局部取活组织病理检查

E. 切除外阴，进行免疫组化染色检查

40. 女，35岁。初孕妇，宫内孕36周，B型超声检查提示FGR，羊水指数4.5，宫颈Bishop评分3分，进一步处理哪项正确

A. 继续观察至39周妊娠

B. 羊膜腔内输液治疗

C. 促宫颈成熟引产

D. 尽快剖宫产

E. 羊水穿刺行染色体核型分析

41. 女性，30岁，诊为左侧前庭大腺囊肿，直径4cm。首选的治疗方法是

A. 前庭大腺囊肿剥除术

B. 前庭大腺囊肿造口术

C. 前庭大腺囊肿抽液术

D. 抗生素治疗

E. 随访观察

42. 女，49岁，绝经2年。查体发现右侧卵巢囊性包块6cmX6cmX5cm。术中冰冻病理检查结果为卵巢浆液性囊腺瘤。常规采取的手术方式为

A. 右侧附件切除术

B. 双侧附件切除术

C. 全子宫切除术

D. 全子宫+双侧附件切除术

E. 肿瘤细胞减灭术

43. 有关产褥期处理，哪项是错误的

A. 每天用1:5000高锰酸钾冲洗外阴

- B. 肝炎患者不可用大量雌激素退奶
- C. 产后子宫复旧不良者给予子宫收缩药
- D. 产后排尿困难者常规导尿
- E. 乳头皲裂可局部外用蓖麻油铍剂

44. 女，27岁，初孕妇，36周妊娠。孕早、中期定期检查无异常，近1周来感头晕，1小时前突感头痛继而抽搐1次而入院。检查神志尚清，血压170/110mmHg，尿蛋白(+++)，头先露，胎心140/min。首选的处理方案是

- A. 立即剖宫产娩出胎儿
- B. 积极治疗2~4小时病情稳定后行剖宫产
- C. 点滴硫酸镁，解痉止抽并降压，积极完善化验，促宫颈成熟
- D. 促胎肺成熟，1周后终止妊娠
- E. 点滴硫酸镁的同时，静滴缩宫素引产

45. 28岁孕妇，妊娠38周，近1周出现下肢水肿，头昏眼花，视物模糊，血压150/110mmHg，尿蛋白(+)，胎心音正常，头先露，NST反应型，最合适的处理是

- A. 即行剖宫产
- B. 解痉，降压等待自然分娩
- C. 积极治疗24~48小时，考虑终止妊娠
- D. 积极治疗1周后考虑终止妊娠
- E. 立即人工破膜及静脉滴注缩宫素引产

46. 女性，49岁。月经紊乱5年。妇检外阴、阴道正常，宫颈光滑，子宫稍大，双附件无异常。分段诊刮宫颈管无组织刮出，宫腔内膜病检为重度非典型增生，局灶癌变。该患者的病变属于

- A. 功能性子宫出血

- B. 子宫内膜癌 I 期
- C. 子宫内膜炎性疾病
- D. 子宫内膜癌 II 期
- E. 子宫内膜癌前病变

47. 女性，49 岁。月经紊乱 5 年。妇检外阴、阴道正常，宫颈光滑，子宫稍大，双附件无异常。分段诊刮宫颈管无组织刮出，宫腔内膜病检为重度非典型增生，局灶癌变。其正确的治疗方法是

- A. 全子宫加双侧附件切除术
- B. 广泛子宫切除术加双附件切除术
- C. 广泛子宫切除加盆腔淋巴结清扫术
- D. 放射治疗
- E. 子宫全切加双侧附件切除并补充放疗

48. 患者，女，35 岁。主诉大便时阴道脱出一肿块 3cmX3cm。检查发现，取膀胱截石位向下进气时，可见阴道前壁膨出，宫颈外口在阴道口上方约 2cm。宫体大小正常，后位，附件(一)。该病人的诊断为

- A. 阴道前壁脱垂
- B. 子宫 I 度脱垂合并膀胱膨出
- C. 膀胱膨出
- D. 子宫 II 度脱垂
- E. 子宫 II 度脱垂并膀胱膨出

49. 患者，女，35 岁。主诉大便时阴道脱出一肿块 3cmX3cm。检查发现，取膀胱截石位向下进气时，可见阴道前壁膨出，宫颈外口在阴道口上方约 2cm。宫体大小正常，后位，附件(一)。该病人合适的手术方法为

A. 阴道前壁修补+宫颈部分切除+主韧带悬吊术

B. 阴道壁修补术

C. 阴道全子宫切除

D. 阴道全子宫切除+阴道壁修补

E. 经腹子宫全切

50. 女，37岁。G1P0，停经3个月，既往曾诊断有先心病，室间隔缺损。能胜任日常工作活动。此孕妇的高危因素有

A. 1项

B. 2项

C. 3项

D. 4项

E. 5项

51. 女，37岁。G1P0，停经3个月，既往曾诊断有先心病，室间隔缺损。能胜任日常工作活动。应建议此孕妇在什么时间做羊膜腔穿刺行羊水检查

A. 妊娠10周

B. 妊娠22周

C. 妊娠18周

D. 妊娠28周

E. 妊娠30周

52. 女，28岁。因活跃期停滞诊为头盆不称。剖宫产术后15天，发热、下腹疼痛、恶露增多3天。体格检查：体温 38.9°C ，脉搏110/min，血压120/80mmHg，下腹压痛。妇科检查：阴道内较多血性分泌物，恶臭，子宫如孕2个月大，压痛明显，双附件区未扪及包块，无明显压痛。最可能的诊断是

- A. 急性输卵管炎
- B. 急性盆腔结缔组织炎
- C. 胎盘组织残留
- D. 盆腔血栓性静脉炎
- E. 急性子宫内膜炎

53. 女，28岁。因活跃期停滞诊为头盆不称。剖宫产术后15天，发热、下腹疼痛、恶露增多3天。体格检查：体温38.9°C，脉搏110/min，血压120/80mmHg，下腹压痛。妇科检查：阴道内较多血性分泌物，恶臭，子宫如孕2个月大，压痛明显，双附件区未扪及包块，无明显压痛。以下哪种处理不恰当

- A. 半卧位
- B. 诊断性刮宫
- C. 加强营养
- D. 应用大量抗生素
- E. 纠正水、电解质失衡

54. 50岁妇女，2-0-3-2。近2年来月经不规律，10~30天/2~3个月，经量多，外观贫血貌，曾服药治疗效果不佳，诊刮子宫内膜单纯性增生。应诊断为

- A. 排卵期出血
- B. 老年期出血
- C. 无排卵功血
- D. 炎症出血
- E. 有排卵型功血

55. 50岁妇女，2-0-3-2。近2年来月经不规律，10~30天/2~3个月，经量多，外观贫血貌，曾服药治疗效果不佳，诊刮子宫内膜单纯性增生。恰当的处理为

- A. 雌激素治疗
- B. 孕激素治疗
- C. 雄激素治疗
- D. 三合激素治疗
- E. 切除子宫

56. 女，G1P0。宫内孕 32 周，头晕、乏力及食欲差半月余。查：胎位、胎心及骨盆测量均正常，血红蛋白 80g/L，血细胞比容 0.25，红细胞平均体积 (MCV) $>94\text{fl}$ ，红细胞平均血红蛋白 (MCH) $>32\text{pg}$ 。最确切的诊断是

- A. 巨幼红细胞贫血
- B. 缺铁性贫血
- C. 再生障碍性贫血
- D. 地中海贫血
- E. 失血性贫血

57. 女，G1P0。宫内孕 32 周，头晕、乏力及食欲差半月余。查：胎位、胎心及骨盆测量均正常，血红蛋白 80g/L，血细胞比容 0.25，红细胞平均体积 (MCV) $>94\text{fl}$ ，红细胞平均血红蛋白 (MCH) $>32\text{pg}$ 。最必须的药物治是哪一项

- A. 叶酸
- B. 硫酸亚铁
- C. 大量维生素 E
- D. 维生素 B12 肌注
- E. 右旋糖酐铁

58. 女, 39 岁。婚后 8 年未避孕未怀孕, 月经规律, 痛经重。月经来潮 12 小时子宫内膜活检为分泌期子宫内膜, B 超下通液输卵管通而不畅。男方精液化验精子数 6 200 万/ml, 活力 60%。最可能的诊断是

- A. 卵巢因素不孕
- B. 输卵管因素不孕
- C. 子宫因素不孕
- D. 宫颈因素不孕
- E. 男性不孕

59. 女, 39 岁。婚后 8 年未避孕未怀孕, 月经规律, 痛经重。月经来潮 12 小时子宫内膜活检为分泌期子宫内膜, B 超下通液输卵管通而不畅。男方精液化验精子数 6 200 万/ml, 活力 60%。月经干净后 2 天超声检查发现右附件 5cmX 5cmX 3cm 液性暗区伴密集光点, 最可能的诊断为

- A. LUFs
- B. 卵巢单纯性囊肿
- C. 输卵管积水
- D. 子宫内膜异位囊肿
- E. 卵巢冠囊肿

60. 女, 39 岁。婚后 8 年未避孕未怀孕, 月经规律, 痛经重。月经来潮 12 小时子宫内膜活检为分泌期子宫内膜, B 超下通液输卵管通而不畅。男方精液化验精子数 6 200 万/ml, 活力 60%。最佳的检查方法是

- A. 宫腔镜检查
- B. 腹腔镜检查
- C. CT 检查

D. MRI 检查

E. X 线检查

61. 女性，23 岁，未婚。尿频、尿急、白带增多 2 天。有不洁性生活史。妇科检查：外阴皮肤、黏膜潮红，小阴唇内侧见数个小菜花赘生物，宫颈充血水肿，子宫正常大小，两侧附件无明显异常。考虑该患者有 STD，哪项不是 STD 的病原体

A. 梅毒螺旋体

B. 弓形虫

C. 淋球菌

D. 人乳头状瘤病毒

E. 衣原体

62. 女性，23 岁，未婚。尿频、尿急、白带增多 2 天。有不洁性生活史。妇科检查：外阴皮肤、黏膜潮红，小阴唇内侧见数个小菜花赘生物，宫颈充血水肿，子宫正常大小，两侧附件无明显异常。为了明确 STD 诊断，哪项不是必须的检查项目

A. 白带常规

B. 赘生物活检

C. 宫颈刮片细胞学检查

D. 阴道镜检查

E. B 型超声检查

63. 女性，23 岁，未婚。尿频、尿急、白带增多 2 天。有不洁性生活史。妇科检查：外阴皮肤、黏膜潮红，小阴唇内侧见数个小菜花赘生物，宫颈充血水肿，

子宫正常大小，两侧附件无明显异常。如果此患者诊断为尖锐湿疣，其病原体为

- A. 人乳头状瘤病毒
- B. 巨细胞病毒
- C. 单纯疱疹病毒
- D. 风疹病毒
- E. 人类免疫缺陷病毒

64. 女性，23岁，未婚。尿频、尿急、白带增多2天。有不洁性生活史。妇科检查：外阴皮肤、黏膜潮红，小阴唇内侧见数个小菜花赘生物，宫颈充血水肿，子宫正常大小，两侧附件无明显异常。如果此患者诊断为尖锐湿疣，其病原体最常见的类型为

- A. SHV-1
- B. SHV-2
- C. HPV 6、11
- D. HPV 16 J8
- E. HPV 6、11、16、18

65. 某孕妇38岁，妊娠9周首次来院做产前检查，为除外胎儿畸形，需做检查。羊水中AFP测定最适宜诊断哪种疾病

- A. 脑积水
- B. 先天愚型
- C. 开放性神经管缺陷
- D. 胎儿宫内发育迟缓
- E. 呼吸窘迫综合征

66. 某孕妇 38 岁，妊娠 9 周首次来院做产前检查，为除外胎儿畸形，需做检查。

何时做羊膜腔穿刺术

- A. 妊娠 8~9 周
- B. 妊娠 10~12 周
- C. 妊娠 13~15 周
- D. 妊娠 16~20 周
- E. 妊娠 20~24 周

67. 某孕妇 38 岁，妊娠 9 周首次来院做产前检查，为除外胎儿畸形，需做检查。

用于遗传性疾病的产前诊断方法是

- A. 羊水震荡试验
- B. 妊娠早期绒毛活检
- C. 测定羊水中肌酐值
- D. B 型超声检查
- E. 羊膜腔胎儿造影

68. 女，25 岁，已婚。身高 1.56m，体重 45kg，第二性征发育良好，至今未来月经，无周期性腹痛。幼时曾患结核性腹膜炎。引起闭经最可能的原因是

- A. 脑垂体微腺瘤
- B. 阴道闭锁
- C. 先天性卵巢缺如
- D. 子宫内膜结核
- E. 处女膜闭锁

69. 女, 25 岁, 已婚。身高 1.56m, 体重 45kg, 第二性征发育良好, 至今未来月经, 无周期性腹痛。幼时曾患结核性腹膜炎。哪项辅助检查是最可靠的诊断手段

- A. X 线盆腔摄片
- B. 子宫输卵管碘油造影
- C. 血沉测定
- D. 腹腔镜检查
- E. 子宫内膜活检

70. 女, 25 岁, 已婚。身高 1.56m, 体重 45kg, 第二性征发育良好, 至今未来月经, 无周期性腹痛。幼时曾患结核性腹膜炎。如怀疑该患者为处女膜闭锁, 以下哪项不符合

- A. 第二性征发育良好
- B. 人工周期治疗后月经稀发量少
- C. 无周期性腹痛或下腹坠胀感
- D. 妇科检查未见处女膜呈紫蓝色, 向外膨隆
- E. 肛查未扪及阴道膨隆呈状压向直肠

71. 女, 宫内孕 34 周, 在某基层保健院行产前保健。主诉 2 周以来稍活动即感憋气, 休息时心率 110 次/分, 需高枕卧位, 有时夜间憋醒, 端坐呼吸。应采取的措施是

- A. 镇静消炎, 间断吸氧, 继续观察
- B. 定期产前检查
- C. 抗生素治疗
- D. 转上一级医院监护治疗

E. 左侧卧位，休息

72. 女，宫内孕 34 周，在某基层保健院行产前保健。主诉 2 周以来稍活动即感憋气，休息时心率 110 次/分，需高枕卧位，有时夜间憋醒，端坐呼吸。此病人何时、以何种方式结束分娩最好

A. 维持至孕足月，阴道分娩

B. 立即剖宫产手术

C. 维持至孕 36 周，静点缩宫素阴道分娩

D. 维持至孕 37 周剖宫产分娩

E. 积极改善孕妇心功能，必要时促胎肺成熟后，适时剖宫产终止妊娠

73. 女，宫内孕 34 周，在某基层保健院行产前保健。主诉 2 周以来稍活动即感憋气，休息时心率 110 次/分，需高枕卧位，有时夜间憋醒，端坐呼吸。治疗 1 周后，血压维持在 150/90mmHg，水肿较重，并出现腹水，尿蛋白 8.3g/24 小时，胎儿生长缓慢，脐动脉血流 A/B 为 2.5, 此时应

A. 继续治疗，维持妊娠至 36 周

B. 继续治疗，维持妊娠至 38 周

C. 继续治疗，等待自然分娩

D. 剖宫产终止妊娠

E. 缩宫素点滴引产

74. 胎儿胎盘储备功能不足

A. 轻度可变减速

B. 重度可变减速

C. 晚期减速

D. 正弦曲线

E. 自然减速

75. 胎儿溶血，严重缺血缺氧

A. 轻度可变减速

B. 重度可变减速

C. 晚期减速

D. 正弦曲线

E. 自然减速

76. 未临产，羊水过少

A. 轻度可变减速

B. 重度可变减速

C. 晚期减速

D. 正弦曲线

E. 自然减速

77. 物理治疗后随访

A. 宫颈轻度不典型增生

B. 宫颈原位癌累及腺体

C. 显微镜检镜下早期浸润癌 (I a)

D. 宫颈癌 I b 期

E. 宫颈癌 III 期合适的适应证

78. 全子宫切除术

A. 宫颈轻度不典型增生

B. 宫颈原位癌累及腺体

C. 显微镜检镜下早期浸润癌 (I a)

D. 宫颈癌 I b 期

E. 宫颈癌 III 期合适的适应证

79. 放射治疗

A. 宫颈轻度不典型增生

B. 宫颈原位癌累及腺体

C. 显微镜检镜下早期浸润癌 (I a)

D. 宫颈癌 I b 期

E. 宫颈癌 III 期合适的适应证

80. 孕 26 周, G3P0, 1 周来腹部胀大明显, 伴憋气

A. 羊水过多

B. 羊水过少

C. 巨大儿

D. 过期妊娠

E. 胎儿宫内发育受限

81. 孕 38 周, 2 周来体重、宫高不升, 胎动时, 腹部不适, AFI 4.8cm

A. 羊水过多

B. 羊水过少

C. 巨大儿

D. 过期妊娠

E. 胎儿宫内发育受限

82. 孕 40 周, 宫高 42cm, 腹围 108cm, 双顶径 9.8cm, 股骨长 7.6cm

A. 羊水过多

B. 羊水过少

C. 巨大儿

D. 过期妊娠

E. 胎儿宫内发育受限

83. 白带增多，均匀稀薄，检查黏膜无明显充血，阴道液pH 大于 4.5, 镜下可见
线索细胞

A. 滴虫性阴道炎

B. 阴道假丝酵母菌病

C. 细菌性阴道病

D. 老年性阴道炎

E. 幼女性阴道炎

84. 白带稠厚豆渣样，伴外阴奇痒，检查见小阴唇内侧及阴道黏膜附着白色膜状
物

A. 滴虫性阴道炎

B. 阴道假丝酵母菌病

C. 细菌性阴道病

D. 老年性阴道炎

E. 幼女性阴道炎

85. 黄白色稀薄有泡沫状白带，检查阴道黏膜有散在出血斑点

A. 滴虫性阴道炎

B. 阴道假丝酵母菌病

C. 细菌性阴道病

D. 老年性阴道炎

E. 幼女性阴道炎

86. 上述哪项检查可了解胎儿肺的成熟度

- A. L/S
- B. 肌酐
- C. 胆红素
- D. 甲胎蛋白
- E. 脂肪细胞出现率

87. 上述哪项检查可了解胎儿肾的成熟度

- A. L/S
- B. 肌酐
- C. 胆红素
- D. 甲胎蛋白
- E. 脂肪细胞出现率

88. 上述哪项检查可了解胎儿肝的成熟度

- A. L/S
- B. 肌酐
- C. 胆红素
- D. 甲胎蛋白
- E. 脂肪细胞出现率

89. 增加子宫对缩宫素的敏感性

- A. 大剂量缩宫素
- B. 孕激素
- C. 小剂量缩宫素
- D. 儿茶酚胺

E. 雌激素

90. 可引起子宫节律性收缩的是

A. 大剂量缩宫素

B. 孕激素

C. 小剂量缩宫素

D. 儿茶酚胺

E. 雌激素

91. 使子宫发生强直性收缩的是

A. 大剂量缩宫素

B. 孕激素

C. 小剂量缩宫素

D. 儿茶酚胺

E. 雌激素

92. 降低子宫对缩宫素的敏感性

A. 大剂量缩宫素

B. 孕激素

C. 小剂量缩宫素

D. 儿茶酚胺

E. 雌激素

93. 妊娠期糖尿病需做检查

A. OGTT 空腹血糖 5.6mmol/L , 1 小时血糖 10.2mmol/L , 2 小时血糖 10.0mmol/L , 3 小时血糖 8.4mmol/L

B. 空腹血糖一次为 5.8mmol/L , 一次为 5.5mmol/L

C. OGTT 空腹血糖 5.3mmol/L, 1 小时血糖 9.2mmol/L, 2 小时血糖 7.8mmol/L, 3 小时血糖 5.4mmol/L

D. OGTT 空腹血糖 4.2mmol/L, 1 小时血糖 11mmol/L, 2 小时血糖 8.0mmol/L, 3 小时血糖 6.0mmol/L

E. 糖化血红蛋白 6.8%

94. IGT 需做检查

A. OGTT 空腹血糖 5.6mmol/L, 1 小时血糖 10.2mmol/L, 2 小时血糖 10.0mmol/L, 3 小时血糖 8.4mmol/L

B. 空腹血糖一次为 5.8mmol/L, 一次为 5.5 mmol/L

C. OGTT 空腹血糖 5.3mmol/L, 1 小时血糖 9.2mmol/L, 2 小时血糖 7.8mmol/L, 3 小时血糖 5.4mmol/L

D. OGTT 空腹血糖 4.2mmol/L, 1 小时血糖 11mmol/L, 2 小时血糖 8.0mmol/L, 3 小时血糖 6.0mmol/L

E. 糖化血红蛋白 6.8%

95. 需做 OGTT

A. OGTT 空腹血糖 5.6mmol/L, 1 小时血糖 10.2mmol/L, 2 小时血糖 10.0mmol/L, 3 小时血糖 8.4mmol/L

B. 空腹血糖一次为 5.8mmol/L, 一次为 5.5 mmol/L

C. OGTT 空腹血糖 5.3mmol/L, 1 小时血糖 9.2mmol/L, 2 小时血糖 7.8mmol/L, 3 小时血糖 5.4mmol/L

D. OGTT 空腹血糖 4.2mmol/L, 1 小时血糖 11mmol/L, 2 小时血糖 8.0mmol/L, 3 小时血糖 6.0mmol/L

E. 糖化血红蛋白 6.8%

96. 正常

- A. OGTT 空腹血糖 5.6mmol/L, 1 小时血糖 10.2mmol/L, 2 小时血糖 10.0mmol/L, 3 小时血糖 8.4mmol/L
- B. 空腹血糖一次为 5.8mmol/L, 一次为 5.5 mmol/L
- C. OGTT 空腹血糖 5.3mmol/L, 1 小时血糖 9.2mmol/L, 2 小时血糖 7.8mmol/L, 3 小时血糖 5.4mmol/L
- D. OGTT 空腹血糖 4.2mmol/L, 1 小时血糖 11mmol/L, 2 小时血糖 8.0mmol/L, 3 小时血糖 6.0mmol/L
- E. 糖化血红蛋白 6.8%

二、多选题

97. 女性盆腔淋巴可分为

- A. 髂淋巴组
- B. 腰淋巴组
- C. 骶前淋巴组
- D. 闭孔淋巴组
- E. 腹股沟淋巴组

98. 慢性肾炎对妊娠的影响

- A. 妊高征发生率高
- B. 容易发生胎死宫内
- C. 低出生体重儿增多
- D. 孕妇易发生氮质血症
- E. 巨大儿多

99. 关于妊娠期矿物质代谢的特点, 下列哪些是正确的

- A. 胎儿发育需要钙、铁、磷增加
- B. 胎儿钙主要在孕末期积累
- C. 近足月胎儿体内含钙约 25g
- D. 妊娠期孕妇铁储备不足，易发生缺铁性贫血
- E. 母体缺铁时，胎儿血中铁离子浓度随之降低

100. 药物流产后清宫的指征是

- A. 服米索前列醇后阴道出血多于月经量
- B. 药流后 8 日仍出血，B 超提示宫腔内有异常回声团块
- C. 药流后 15 日阴道出血多于月经量
- D. 药流后 21 日阴道仍有出血
- E. 胎囊排出后 3 日内仍有少量出血及腹痛