

# 303 内科学

## 基础知识

1. 口腔温度达 39.5℃属于
  - A. 正常
  - B. 低热
  - C. 中等发热
  - D. 高热
  - E. 超高热
2. 间歇热最常见的疾病是
  - A. 斑疹伤寒
  - B. 疟疾
  - C. 风湿热
  - D. 败血症
  - E. 大叶性肺炎
3. 紫癜的皮下出血面积的直径为
  - A. <2mm
  - B. 2~3 mm
  - C. 3~5mm
  - D. 5~6 mm
  - E. >6mm
4. 能引起凝血功能障碍的疾病为
  - A. 维生素 C 缺乏
  - B. 维生素 PP 缺乏
  - C. 维生素 K 缺乏
  - D. 单纯性紫癜
  - E. 再生障碍性贫血
5. 下列选项中, 可导致水肿产生的是
  - A. 继发性醛固酮减少
  - B. 毛细血管滤过压降低
  - C. 毛细血管通透性降低
  - D. 血浆胶体渗透压增高
  - E. 淋巴回流受阻
6. 鉴别肝源性与心源性水肿, 最有意义的检查是
  - A. 腹水
  - B. 蛋白尿
  - C. 肝功能
  - D. 腹壁静脉曲张
  - E. 水肿从足部开始
7. 突发严重呼吸困难伴一侧呼吸音消失最常见于

- A. 胸膜炎
  - B. 肺水肿
  - C. 大叶性肺炎
  - D. 支气管哮喘
  - E. 自发性气胸
8. Biots 呼吸常见于下列哪种疾病
- A. 急性传染病
  - B. 颅内压增高
  - C. 尿毒症
  - D. 癔症
  - E. 重度贫血
9. 胸膜摩擦音听诊较为明显的时相为
- A. 吸气初期
  - B. 吸气中期
  - C. 吸气末期
  - D. 呼气末或吸气初
  - E. 吸气末或呼气初
10. 下列常引起空腹疼痛的疾病是
- A. 肝炎
  - B. 胆囊炎
  - C. 胃溃疡
  - D. 胰腺炎
  - E. 十二指肠溃疡
11. 下列呈黏液脓性鲜血便同时伴里急后重的疾病是
- A. 溃疡性结肠炎
  - B. 直肠息肉
  - C. 肠结核
  - D. 消化性溃疡
  - E. 急性细菌性痢疾
12. 对退行性骨关节炎描述错误的是
- A. 多见于中、老年人
  - B. 手指僵硬肿胀
  - C. 关节肿、痛对称分布
  - D. 步行、久站后疼痛加重
  - E. 休息能缓解疼痛
13. 引起尿急的因素中哪项错误
- A. 尿道炎症
  - B. 尿中含糖量高
  - C. 膀胱异物
  - D. 前列腺肿瘤
  - E. 尿浓缩，酸性高
14. 暂时性尿失禁见于以下哪种疾病
- A. 尿路感染

- B. 脑卒中
  - C. 脊髓炎
  - D. 慢性前列腺增生
  - E. 外伤损伤尿道括约肌
15. 营养物质消耗增加引起的消瘦见于以下哪种疾病
- A. 慢性萎缩性胃炎
  - B. 胃切除术后
  - C. 食管疾病
  - D. 重症结核病
  - E. 先天性乳糖酶缺乏症
16. 血管壁功能异常所致的出血性疾病为
- A. 特发性血小板减少性紫癜
  - B. 血友病
  - C. 弥散性血管内凝血
  - D. 过敏性紫癜
  - E. 血小板增多症
17. 周围性眩晕可见于
- A. 迷路炎
  - B. 癫痫
  - C. 多发性硬化
  - D. 高血压脑病
  - E. 小脑出血
18. 下列哪项符合心源性晕厥
- A. 多见于老年女性
  - B. 发作常无明显诱因
  - C. 常见于心动过缓与心脏停搏
  - D. 不能自然苏醒
  - E. 有后遗症
19. 风心病二尖瓣狭窄的典型面容是
- A. 面色灰暗，双颊发红，口唇发钳
  - B. 面色苍白，表情疲惫
  - C. 面色灰褐，额部有褐色色素沉着
  - D. 面容惊愕，目光闪亮
  - E. 表情淡漠，反应迟钝
20. 胸膜疾患的患者常采用的体位是
- A. 强迫仰卧位
  - B. 强迫俯卧位
  - C. 强迫侧卧位
  - D. 强迫坐位
  - E. 自动体位
21. 下列不属于胆汁淤积性黄疸的是
- A. 肝内泥沙样结石
  - B. 肝硬化

- C. 硬化型胆管炎
  - D. 原发性胆汁性肝硬化
  - E. 肝内胆管结石
22. 心尖部触及舒张期震颤最常见于
- A. 二尖瓣狭窄
  - B. 二尖瓣关闭不全
  - C. 动脉导管未闭
  - D. 主动脉瓣狭窄
  - E. 室间隔缺损
23. 关于奇脉，下列叙述正确的是
- A. 指节律正常而强弱交替出现的脉率
  - B. 指平静吸气时脉搏明显减弱甚至消失的现象
  - C. 指脉搏骤起骤落
  - D. 见于急性心肌梗死
  - E. 见于甲状腺功能亢进
24. 贫血患者出现皮肤及黏膜苍白，较为可靠的检查部位是
- A. 面颊、皮肤、上腭黏膜
  - B. 手背皮肤及口腔黏膜
  - C. 耳郭皮肤
  - D. 颈部皮肤、舌面
  - E. 睑结膜
25. 眼底检查见视网膜动脉变细，呈铜丝状，并有动静脉交叉压迫现象，最可能的疾病是
- A. 慢性肾小球肾炎
  - B. 妊娠中毒症
  - C. 高血压动脉硬化
  - D. 糖尿病
  - E. 白血病
26. 为了解肝脏下缘的位置、质地、表面、边缘及搏动，进行肝脏触诊时，患者所处的最佳体位是下列哪一种
- A. 低枕仰卧，两手自然放于躯干两侧，两膝关节屈曲，作较深的腹式呼吸动作
  - B. 高枕仰卧，两手自然交叉于前胸下部，两膝关节屈曲，作平静的腹式呼吸动作
  - C. 低枕仰卧，两手垫牢后颈，两膝关节屈曲，作平静的腹式呼吸动作
  - D. 低枕仰卧，两手自然放于躯干两侧，两膝关节屈曲，作较深的胸式呼吸动作
  - E. 低枕仰卧，两手交叉放于前胸下部，两膝关节屈曲，作平静的胸式呼吸动作
27. 下列哪种体位时颈外静脉充盈度超过正常水平时，称为颈静脉怒张
- A.  $15^{\circ} \sim 25^{\circ}$  的半卧位
  - B.  $20^{\circ} \sim 25^{\circ}$  的半卧位
  - C.  $30^{\circ} \sim 45^{\circ}$  的半卧位
  - D.  $50^{\circ} \sim 55^{\circ}$  的半卧位
  - E.  $60^{\circ} \sim 70^{\circ}$  的半卧位
28. 肿大的甲状腺与其他颈前包块的鉴别中，最重要的是
- A. 甲状腺表面光滑
  - B. 甲状腺位于甲状软骨下方

- C. 甲状腺可随吞咽动作向上移动
  - D. 甲状腺肿大，质地不太硬
  - E. 甲状腺肿大的程度多在胸锁乳突肌以内
29. 关于胸骨角的描述下列哪项是错误的
- A. 相当于第 2 胸椎水平
  - B. 位于胸骨上切迹下约 5cm
  - C. 由胸骨柄与胸骨体的连接处向前突起而成
  - D. 为计数肋骨和肋间隙顺序的主要标志
  - E. 为左右主支气管分叉部位标志
30. 语音震颤增强最常见于
- A. 肺实变
  - B. 肺不张
  - C. 胸膜增厚粘连
  - D. 肺水肿
  - E. 肺气肿
31. 下列对于区别肝外胆管阻塞与肝内胆汁淤积性黄疸最好的检查是
- A. X 线检查
  - B. B 型超声波
  - C. CT
  - D. 经皮肝穿刺胆管造影 (PTC)
  - E. 经十二指肠镜逆行胰胆管造影 (ERCP)
32. 引起便血伴发热、少尿的常见疾病是
- A. 肠结核
  - B. 直肠癌
  - C. 白血病
  - D. 消化性溃疡
  - E. 流行性出血热
33. 患有腹壁疝的患者，仰卧作屈颈抬肩动作时，腹壁肌肉紧张、腹压增加时，应可见到下列哪一种变化
- A. 局限性凹陷
  - B. 局限性膨隆
  - C. 局限性搏动
  - D. 腹部平坦
  - E. 局限膨隆随腹式呼吸而移动
34. 腹部反跳痛的发生机制是
- A. 腹水形成
  - B. 肿瘤淋巴结转移
  - C. 内脏肿大、充血
  - D. 炎症波及腹膜壁层
  - E. 胆管结石并梗阻
35. 直肠指诊触及质硬凹凸不平的包块，应考虑为
- A. 肛裂伴感染
  - B. 直肠周围脓肿
  - C. 直肠癌

D. 直肠脱垂

E. 内痔

36. 精索呈串珠状改变常见于

A. 精索急性炎症

B. 血丝虫病

C. 输精管结核

D. 精索静脉曲张

E. 梅毒

37. 脊柱胸段呈弧形后凸，脊柱强直性固定，仰卧位时亦不能伸直的疾病是

A. 脊柱结核

B. 强直性脊柱炎

C. 脊柱压缩性骨折

D. 佝偻病

E. 脊柱骨软骨炎

38. 引起颈椎活动受限的疾病不包括

A. 颈肌纤维组织炎

B. 先天性斜颈

C. 颈椎病

D. 颈椎骨折

E. 颈椎结核

39. 一侧咀嚼肌肌力减弱或出现萎缩，提示有损害的神经是

A. 迷走神经

B. 面神经

C. 滑车神经

D. 副神经

E. 三叉神经

40. 眼球运动向内、向上及向下活动受限提示有损害的神经是

A. 动眼神经

B. 视神经

C. 滑车神经

D. 展神经

E. 三叉神经

41. 铅管样强直是指

A. 触摸肌肉，坚实感，伸屈肢体时阻力增加

B. 在被动伸屈其肢体时，起始阻力大，终末突然阻力减弱

C. 伸肌和屈肌的肌张力均增高，做被动运动时各个方向的阻力增加均匀一致

D. 骨骼肌受到外力牵拉时产生收缩反应

E. 肌肉松软，伸屈其肢体时阻力低，关节运动范围扩大

42. 舌肌麻痹、萎缩及肌束颤动提示受损颅神经是

A. 舌下神经

B. 面神经

C. 副神经

D. 舌咽神经

E. 三叉神经

43. 肢体在床面上能水平移动，但不能抬离床面提示肌力为

A. 1 级

B. 2 级

C. 3 级

D. 4 级

E. 5 级

44. 慢性支气管炎并发肺气肿时，最早出现的病理生理改变是

A. 用力肺活量降低

B. 生理无效腔气量增大

C. 通气血流比例失调

D. 残气占肺总量百分比增加

E. 低氧血症

45. 对支气管哮喘急性发作病人进行血气分析，其中 PaCO<sub>2</sub> 增高提示

A. 病情好转

B. 出现呼吸性碱中毒

C. 病情恶化

D. 出现心力衰竭

E. 无临床意义

46. 诊断肺炎球菌肺炎，最有价值的化验检查结果是

A. 痰培养可见肺炎球菌

B. 肺实变体征

C. 肺部湿啰音

D. X 线胸片呈以肺叶或肺段分布的大片阴影

E. 外周血白细胞总数升高，以中性粒细胞升高为主

47. II 型呼吸衰竭最常见于下列哪一种疾病

A. 大叶性肺炎

B. 特发性肺间质纤维化

C. 慢性阻塞性肺疾病

D. ARDS

E. 浸润型肺结核

48. 右心功能不全所致的心源性水肿主要由于

A. 淋巴液回流受阻

B. 血浆胶体渗透压降低

C. 毛细血管静水压增高

D. 毛细血管通透性增加

E. 心源性肝硬化白蛋白合成减少

49. 关于高血压药物治疗的选择，下列哪项不正确

A. 无并发症高血压患者——利尿剂

B. 轻中度高血压伴周围血管病者——β 受体阻滞剂

C. 伴糖尿病并有微量蛋白尿者——ACEI

D. 伴有妊娠者——钙通道拮抗剂

E. 伴有痛风者——ARB（血管紧张素受体拮抗剂）

50. 导致急性心肌梗死患者早期（24 小时内）死亡的主要原因为
- A. 心力衰竭
  - B. 心源性休克
  - C. 心律失常
  - D. 心脏破裂
  - E. 肺栓塞
51. 急性下壁心肌梗死时血清 CK-MB 浓度的典型变化为发病后
- A. 6~12 小时达高峰
  - B. 13~15 小时达高峰
  - C. 16~24 小时达高峰
  - D. 25~35 小时达高峰
  - E. 36~48 小时达高峰
52. 二尖瓣口面积为 2.0cm<sup>2</sup> 时，下列说法哪项正确
- A. 为二尖瓣中度狭窄
  - B. 可无临床症状
  - C. 可无心尖部舒张期隆隆样杂音
  - D. 可无跨瓣压差存在
  - E. 一般不引起左心房扩大
53. 慢性心房颤动应用洋地黄的主要目的是
- A. 控制心室率
  - B. 转复房颤律
  - C. 预防室性心律失常
  - D. 为实施电转复做准备
  - E. 增强心肌收缩力
54. 肝硬化失代偿期病人的下列检验中，哪项不正确
- A. 凝血因子减少
  - B. 血红蛋白减低
  - C. 雄激素减少
  - D. 雌激素减少
  - E. 肾上腺糖皮质激素可减少
55. 下列哪一项属于胃十二指肠黏膜防卫因子
- A. 胃酸/胃蛋白酶
  - B. 前列腺素
  - C. 胆盐
  - D. 胰酶
  - E. 药物 (NSAID)
56. 为明确上消化道出血的原因，待病情稳定后，最好行下列哪项检查
- A. 腹部 B 超
  - B. 吞线试验
  - C. 胃镜检查
  - D. 钡餐透视
  - E. 腹部 CT
57. 在我国引起急性胰腺炎最常见的病因为



- A. 胆道疾病
  - B. 胰管结石
  - C. 酗酒
  - D. 高脂血症
  - E. 外伤
58. 肾病综合征最常见的并发症是
- A. 循环衰竭
  - B. 肾功能不全
  - C. 感染
  - D. 静脉血栓形成
  - E. 蛋白及脂肪代谢紊乱
59. 在我国引起慢性肾功能不全最常见的病因是
- A. 慢性肾小球肾炎
  - B. 肾结核
  - C. 肾结石
  - D. 肾小动脉硬化
  - E. 慢性肾盂肾炎
60. 关于缺铁性贫血，下列哪一项是对的
- A. 血清总铁结合力减低
  - B. 血清转铁蛋白饱和度减低
  - C. 血清转铁蛋白减低
  - D. 红细胞的游离原卟啉减低
  - E. 网织红细胞减低
61. 急性白血病诊断的主要依据是
- A. 发热、贫血、出血
  - B. 白细胞计数 $>50 \times 10^9/L$
  - C. 骨髓增生极度活跃
  - D. 胸骨压痛(+)
  - E. 骨髓中原始细胞明显增高
62. 下列哪项在严重的原发性血小板减少性紫癜患者中最常见到
- A. BT 延长
  - B. CT 延长
  - C. 束臂试验阴性
  - D. 血小板功能正常
  - E. 骨髓巨核细胞数减少
63. 甲亢病人出现大便次数增多或腹泻主要是因为
- A. 胃酸缺乏
  - B. 肠道炎症
  - C. 肠蠕动增强
  - D. 结肠过敏
  - E. 小肠吸收不良
64. 高渗性昏迷与酮症酸中毒的实验室检查的主要区别是
- A. 血糖水平

- B. 血钠水平
- C. 血尿素氮水平
- D. 血浆渗透压
- E. 血清 CO<sub>2</sub>CP

65. 特发性面神经麻痹的症状不包括

- A. 额纹消失
- B. Bell (贝尔)现象
- C. 耳后或下颌角后疼痛
- D. 舌前 2/3 味觉障碍
- E. 外耳道或鼓膜出现疼痛疱疹

66. 患者有偏瘫、偏身感觉障碍和偏盲，最可能由下述哪条血管闭塞引起

- A. 大脑前动脉
- B. 大脑中动脉
- C. 大脑后动脉
- D. 内听动脉
- E. 脊髓前动脉

67. 右心衰竭体循环淤血的表现是

- A. 端坐呼吸
- B. 心源性哮喘
- C. 劳力性呼吸困难
- D. 夜间阵发性呼吸困难
- E. 肝颈静脉反流征阳性

68. COPD 病理生理改变的标志是

- A. 气体交换异常
- B. 黏液高分泌
- C. 肺动脉高压
- D. 肺过度充气
- E. 呼气气流受限

69. 胃溃疡节律性疼痛的特点是

- A. 餐后约 1 小时出现疼痛
- B. 空腹疼
- C. 餐时疼
- D. 夜间疼
- E. 餐后 3~4 小时出现疼痛

70. 在下列哪一种情况不应该见到上腹部搏动

- A. 右侧胸腔积液
- B. 腹主动脉瘤
- C. 肝血管瘤
- D. 二尖瓣狭窄
- E. 三尖瓣关闭不全

71. 患者，男，25 岁，胸闷，气短 12 天，伴乏力、低热、盗汗，左侧腋后线第 7 肋间以下语颤减低，叩浊，呼吸音减低，腹部正常，拟诊考虑为

- A. 胸膜间皮细胞瘤

- B. 大叶性肺炎
- C. 充血性心衰
- D. 结核性胸膜炎
- E. 肝硬化

72. 患者，男，20岁，突发四肢紫癜高出皮肤，对称。伴关节痛及腹痛，化验：WBC  $10 \times 10^9/L$ ，Hb  $112g/L$ ，血小板： $200 \times 10^9/L$ 。诊断应该是

- A. 血小板减少性紫癜
- B. 过敏性紫癜
- C. 再生障碍性贫血
- D. 急性白血病
- E. 血管性假血友病

73. 患者，女，24岁，低热、乏力、腹胀1月余。查体：腹部膨隆，腹部可触及不规则包块，不易推动，全腹轻压痛，腹壁柔韧，无反跳痛，移动性浊音阳性。腹水检查：比重1.020，白细胞 $0.6 \times 10^9/L$ ，淋巴细胞90%，腺苷脱氨酶活性细胞增高，拟诊考虑为

- A. 结肠癌腹膜转移
- B. 结核性腹膜炎
- C. 肝硬化
- D. 卵巢囊肿
- E. 肝肾综合征

74. 患者，女，65岁，劳动后突然出现左侧胸部绞痛伴咯血、呼吸困难，自含服“硝酸甘油”后未能缓解而急诊入院。查体：BP  $110/70mmHg$ ，口唇发绀，双肺未闻及明显干、湿啰音。最可能的疾病是

- A. 肺梗死
- B. 食管炎
- C. 心绞痛
- D. 肺部肿瘤
- E. 自发性气胸

75. 患者男，16岁，10小时前脐周痛，现腹痛加剧，转移至右下腹，病变尚未波及腹膜壁层。诊断为急性阑尾炎，其腹痛的发生机制是

- A. 牵涉痛
- B. 反射性腹痛
- C. 躯体性腹痛
- D. 中枢性腹痛
- E. 内脏性腹痛

76. 患者，女，29岁，新婚后第2天出现尿频、尿急，诊断为“蜜月病”给磺胺甲噁唑、呋喃妥因，口服1周后症状缓解，复查尿沉渣、白细胞消失，红细胞： $5 \sim 10/HP$ ，引起血尿可能的原因是

- A. 尿路感染加重
- B. 尿源性败血症
- C. 药物对肾间质的损害
- D. 磺胺药所致再障
- E. 呋喃类药损害尿路黏膜

77. 患者，女，40岁，身高150cm；体重73kg。近3个月患者出现满月脸，毛发增多，颜面部痤疮，腹部紫纹。考虑以下哪种疾病

- A. 库欣综合征

- B. 单纯性肥胖
- C. 垂体性肥胖
- D. 性腺性肥胖
- E. 痛性肥胖综合征

78. 患者，男，58岁，突然剧烈头痛伴恶心、呕吐，脑膜刺激征阳性，脑脊液检查为血性，压力增高，最可能的诊断为

- A. 偏头痛
- B. 脑血栓形成
- C. 颅内感染
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 三叉神经痛

79. 患者，女，38岁，近3年时有发作性眩晕，伴耳鸣、听力减退、恶心呕吐及眼球震颤，每次发作持续3~5天，最可能的诊断是

- A. 迷路炎
- B. 前庭神经元炎
- C. 梅尼埃病
- D. 小脑肿瘤
- E. 位置性晕厥

80. 患有十二指肠球部溃疡的患者，当并发幽门梗阻时可发现下列哪一种最有诊断价值的体征

- A. 肠型
- B. 移动性浊音阳性
- C. 液波震颤
- D. 振水音
- E. 高亢肠鸣音

81. 患者，男，64岁，近日有呼吸困难、咳嗽、下肢水肿。查体：呼吸急促，不能平卧，精神焦虑，该患者的体位可能是

- A. 强迫俯卧位
- B. 强迫侧卧位
- C. 辗转体位
- D. 强迫坐位
- E. 强迫蹲位

82. 3岁患儿，额、项、颞及枕部突出膨大呈圆形，颈部静脉充盈，对比之下颜面很小，双目下视，巩膜外露。该患儿最可能的疾病是

- A. 呆小症
- B. 佝偻病
- C. 先天性梅毒
- D. Down病
- E. 脑积水

83. 患者，女，35岁，多食、多汗、消瘦、心悸半年，查体：突眼，心率增快。该患者颈部检查最可能出现的体征是

- A. 甲状腺肿大，质地柔软，触诊有震颤，听诊闻及“嗡鸣”样血管杂音
- B. 甲状腺结节性肿大，无震颤和杂音
- C. 甲状腺肿大有结节感，不规则、质地硬

D. 颈静脉怒张

E. Oliver 征

84. 患者，男，34 岁，心前区反复疼痛及呼吸困难 3 年，血压 150/30mmHg，心脏呈靴形增大。体检时不可能存在的是

A. 胸骨右缘第 2 肋间扪及收缩期震颤

B. 肱动脉枪击音

C. 毛细血管搏动

D. 心尖区闻及舒张期杂音

E. 水冲脉

85. 患者，女，15 岁，因心悸就诊，体检时发现胸骨左缘 3~4 肋间收缩期震颤，诊断应首先考虑

A. 主动脉瓣狭窄

B. 肺动脉瓣狭窄

C. 动脉导管未闭

D. 室间隔缺损

E. 重度二尖瓣关闭不全

86. 某低位小肠梗阻的患者，可有腹胀、腹痛、剧烈呕吐及排便、排气停止的症状，其呕吐物的性质应是下列哪种

A. 呕吐棕黄色带粪臭的内容物

B. 呕吐大量胃、肠、胰液和胆汁的内容物

C. 剧烈呕吐胃内容物后呕吐血液

D. 呕吐大量酸酵宿食

E. 喷射性呕吐

87. 患者，28 岁，男，教师，近年来常因久站和步行过久后感右侧睾丸胀痛，伴有沿腹股沟区域的牵扯痛，体查发现右侧附睾端精索可触及蚯蚓曲团样变化，可能的疾病为

A. 附睾结核

B. 附睾肿瘤

C. 精索炎

D. 精索静脉曲张

E. 输精管结核

88. 患者，男，30 岁，右侧乳突区疼痛 2 天，口角向左歪斜 1 天。最有助于定位诊断的体征是

A. 双侧皱额和眼睑闭合情况

B. 双侧面部痛觉

C. 张口时下颌偏斜方向

D. 伸舌偏斜方向

E. 双侧肢体肌力比较

89. 患者，女，28 岁，偶尔于疼痛、恐惧时出现头晕、恶心、面色苍白等，几分钟后突然意识丧失，常伴血压下降，持续 1 分钟左右可自然苏醒，最可能的诊断为

A. 血管抑制性晕厥

B. 颈动脉窦综合征

C. 心源性晕厥

D. 脑源性晕厥

E. 换气过度综合征

90. 主动脉瓣关闭不全晚期最主要的并发症是

- A. 心房纤颤
- B. 室性心律失常
- C. 肺水肿
- D. 栓塞
- E. 心力衰竭

91. 有机磷中毒患者口腔有

- A. 氨味
- B. 大蒜味
- C. 肝臭味
- D. 组织坏死的臭味
- E. 烂苹果味

92. 尿毒症患者口腔有

- A. 氨味
- B. 大蒜味
- C. 肝臭味
- D. 组织坏死的臭味
- E. 烂苹果味

93. 糖尿病酮症酸中毒者口腔有

- A. 氨味
- B. 大蒜味
- C. 肝臭味
- D. 组织坏死的臭味
- E. 烂苹果味

94. Crohn 病的病变大多位于

- A. 空肠
- B. 直肠、乙状结肠
- C. 回盲部
- D. 全结肠
- E. 末段回肠

95. 溃疡性结肠炎的病变大多位于

- A. 空肠
- B. 直肠、乙状结肠
- C. 回盲部
- D. 全结肠
- E. 末段回肠

96. 黄疸伴肝大

- A. 败血症
- B. 胆总管癌
- C. 胆道蛔虫病
- D. 甲型肝炎
- E. 急性化脓性胆管炎

97. 黄疸伴脾大

- A. 败血症

- B. 胆总管癌.
- C. 胆道蛔虫病
- D. 甲型肝炎
- E. 急性化脓性胆管炎

98. 黄疸伴胆囊肿大

- A. 败血症
- B. 胆总管癌.
- C. 胆道蛔虫病
- D. 甲型肝炎
- E. 急性化脓性胆管炎

99. 胃、十二指肠急性穿孔时腹腔穿刺液为

- A. 稀薄无臭味脓汁
- B. 淡黄色腹水
- C. 草绿色透明腹水,
- D. 黄色、混浊、含胆汁、无臭气腹水
- E. 血性、臭气重腹水

100. 绞窄性肠梗阻时腹腔穿刺液为

- A. 稀薄无臭味脓汁
- B. 淡黄色腹水
- C. 草绿色透明腹水,
- D. 黄色、混浊,、含胆汁、无臭气腹水
- E. 血性、臭气重腹水