

# 303 内科学

## 相关专业知识

1. 关于急性心肌梗死并发心脏破裂，下列哪项不正确

- A. 多见于起病 1 周以内
- B. 可累及右心室
- C. 心内膜下心梗不易发生
- D. 心动过缓
- E. 多为室间隔破裂穿孔

2. 利尿剂治疗心功能不全的作用主要是通过

- A. 排钠排水
- B. 提高心肌收缩力
- C. 增加心排血量
- D. 减轻水肿
- E. 降低动脉压

3. 冠心病心绞痛发作的典型部位是

- A. 剑突下
- B. 心前区
- C. 心尖部
- D. 胸骨体下段之后
- E. 胸骨体中、上段之后

4. 缺血性心肌病与扩张型心肌病的主要区别点是

- A. 充血性心力衰竭
- B. 心律失常
- C. 心绞痛
- D. 心腔扩大
- E. 猝死

5. 二尖瓣关闭不全的心脏听诊特点为

- A. 心尖区全收缩期杂音，并在吸气时明显增强
- B. 心尖内侧的收缩期杂音，向主动脉瓣区传导
- C. 心尖区全收缩期杂音，并在呼气时增强
- D. 常伴有肺动脉瓣相对关闭不全的杂音
- E. 心尖区第一心音亢进

6. 下列选项中，不符合病毒性心肌炎体征的是

- A. 第一心音增强
- B. 心律失常
- C. 肺部啰音
- D. 颈静脉怒张
- E. 心率增快与体温升高不相符

7. 主动脉瓣反流时心尖部可存在

- A. Graham-Stell 杂音
  - B. Austin-Flint 杂音
  - C. Duroziez 征
  - D. Musset 征
  - E. Traube 征
8. 关于 A 型胃炎，下列哪项是正确的
- A. 较常见
  - B. 大多数由幽门螺杆菌感染引起
  - C. 病变主要累及胃体和胃底
  - D. 发病与遗传素质无关
  - E. 最终不易导致恶性贫血
9. 预防非甾体抗炎药所致消化性溃疡的首选药物是
- A. 硫糖铝
  - B. 胶体铋
  - C. 米索前列醇
  - D. 阿莫西林
  - E. 庆大霉素
10. 胃癌晚期血行转移最多见的部位是
- A. 胃
  - B. 胰
  - C. 肺
  - D. 肝
  - E. 骨骼
11. 肝硬化失代偿期病人的下列检验中，哪项不正确
- A. 凝血因子减少
  - B. 血红蛋白减低
  - C. 雄激素减少
  - D. 雌激素减少
  - E. 肾上腺糖皮质激素可减少
12. 提高胃癌治愈率的关键是
- A. 早期诊断
  - B. 根治性手术
  - C. 早期应用抗癌药物
  - D. 术后放疗
  - E. 综合治疗
13. 急性胰腺炎治疗时，下列属于抑制胰酶活性的药物是
- A. 抑肽酶
  - B. 胰升糖素
  - C. 降钙素
  - D. 生长抑素
  - E. 奥曲肽
14. 下列临床表现中，与肝硬化患者体内雌激素增加无关的是
- A. 蜘蛛痣

- B 男性乳腺发育
  - C 毛细血管扩张
  - D. 贫血貌
  - E. 女性患者月经失调
15. 关于慢性肾盂肾炎的临床表现，下列哪项是错误的
- A. 可无全身症状
  - B. 尿路刺激征可不典型
  - C. 长期肾小球滤过功能损害往往较肾小管功能损害为重
  - D. 可有高血压
  - E. 轻度水肿
16. 急性肾衰少尿期进行透析治疗的指征不包括
- A 血肌酐每日升高 $>176.8 \mu\text{mol/L}$
  - B. 血尿素氮每日升高  $8.9\text{mmol/L}$
  - C 血钾每日升高 $>0.8\text{mmol/L}$
  - D. 酸中毒 ( $\text{pH}<7.25$ )，二氧化碳结合力 $<13\text{mmol/L}$
  - E. 无尿 2 天或少尿 4 天
17. 下列哪一项是诊断肾病综合征的必需条件
- A. 尿蛋白 $>3.5\text{g/d}$
  - B. 尿沉渣红细胞 $>3$  个高倍视野
  - C. 高血压
  - D. 水肿
  - E. 血脂升高
18. 下列选项中不属于肾性骨营养不良症的是
- A. 纤维性骨炎
  - B 尿毒症骨软化症
  - C. 骨质疏松症
  - D. 骨硬化症
  - E. 继发性骨瘤
19. 肾病综合征最常见的并发症是
- A. 循环衰竭
  - B. 肾功能不全
  - C. 感染
  - D. 静脉血栓形成
  - E. 蛋白及脂肪代谢紊乱
20. 诊断慢性肾盂肾炎时，下列哪项是不正确的
- A. 静脉肾盂造影中可见到肾盂肾盏变形缩窄
  - B. 必有尿路刺激(尿急、尿频、尿痛)症状
  - C. 无全身症状，只有尿培养反复多次阳性
  - D. 肾小管功能可持续损害
  - E. 可有高血压、水肿、肾功能减
21. 肾病综合征患者发生血栓并发症，最常见于
- A. 肾静脉
  - B. 冠状血管

- C. 下肢静脉
- D. 下腔静脉
- E. 肺静脉

22. 以下列哪项在严重的原发性血小板减少性紫癜患者中最常见到

- A. BT 延长
- B. CT 延长
- C. 束臂试验阴性
- D. 血小板功能正常
- E. 骨髓巨核细胞数减少

23. 关于缺铁性贫血，下列哪一项是正确的

- A. 血清转铁蛋白饱和度减低
- B. 血清总铁结合力减低
- C. 血清转铁蛋白减低
- D. 红细胞的游离原卟啉减低
- E. 网织红细胞减低

24. 急性和慢性白血病的最主要区别是

- A. 出血程度
- B. 病程长短
- C. 贫血程度
- D. WBC 数目
- E. 白血病细胞分化程度

25. 体液平衡中，细胞外液中最主要的阳离子是

- A. Na<sup>+</sup>
- B. K<sup>+</sup>
- C. Mg<sup>2+</sup>
- D. Mn<sup>2+</sup>
- E. Ca<sup>2+</sup>

26. 低钾血症可引起

- A. 酸中毒
- B. 碱中毒
- C. 高渗性缺水
- D. 低渗性缺水
- E. 等渗性缺水

27. 双胍类口服降糖药最严重的副作用是

- A. 胃肠道反应，口苦
- B. 低血糖
- C. 腹泻
- D. 过敏性皮疹
- E. 乳酸酸中毒

28. 下列不符合甲状腺危象表现的是

- A. 高热达 39℃ 以上
- B. 心率快 > 140 次/分
- C. 厌食

- D. 恶心、呕吐、腹泻
  - E. 白细胞总数和中性粒细胞常减低
29. 在 SLE 应用激素冲击疗法中，下列哪项一般不是适应证
- A. 急性肾衰竭
  - B. NP 狼疮的癫痫发作
  - C. NP 狼疮的明显精神症状
  - D. 严重溶血性贫血
  - E. 严重血小板减少性紫癜
30. 下列与 SLE 病情活动性无关的实验室检查是
- A. 血清 C3、C4 下降
  - B. 白细胞减少和淋巴细胞绝对值减少
  - C. 抗 dsDNA 抗体升高
  - D. 抗 Sm 抗体升高
  - E. 血沉加快
31. 目前治疗系统性红斑狼疮的主要药物为
- A. 环磷酰胺
  - B. 磷酸氯喹
  - C. 雷公藤总苷
  - D. 非甾体抗炎药
  - E. 泼尼松
32. 心源性脑栓塞时，栓塞多发生在
- A. 大脑前动脉
  - B. 大脑中动脉
  - C. 大脑后动脉
  - D. 椎动脉
  - E. 基底动脉
33. 原发性三叉神经痛在查体时可发现
- A. 面部感觉减退
  - B. 咀嚼肌萎缩
  - C. 角膜反射减弱
  - D. 面部有疼痛触发点
  - E. 张口时下颌偏斜
34. 患者有偏瘫，偏身感觉障碍和偏盲：最可能由下述哪条血管闭塞引起
- A. 大脑前动脉
  - B. 大脑中动脉
  - C. 大脑后动脉
  - D. 内听动脉
  - E. 脊髓前动脉
35. 艾滋病患者肺部机会性感染最常见的病原体是
- A. 白色念珠菌
  - B. 结核分枝杆菌
  - C. 疱疹病毒
  - D. 巨细胞病毒

E. 肺孢子菌

36. 乙型脑炎的临床表现不包括

- A. 起病急，体温升高快，而且发热越高，热程越长，病情则越重
- B. 常有颅内压升高现象
- C. 有些病人出现抽搐、意识障碍
- D. 重症病例可出现呼吸衰竭
- E. 病程早期皮肤可见瘀点

37. 在乙型肝炎患者血清中，不能检测到的乙肝病毒标志物是

- A. HBsAg
- B. 抗-HBs
- C. HBeAg
- D. HBcAg
- E. 抗 HBc

38. 确诊伤寒最可靠的依据来自

- A. 发热、中毒症状、白细胞减少
- B. 血培养
- C. 粪便培养
- D. 胆汁培养
- E. 肥达反应

39. 下列哪类人群中，PPD 阳性对提示活动性结核病最有价值

- A. 肺内有结节样病灶伴纵隔淋巴结肿大的成年人
- B. 长期发热的患者
- C. 没有任何症状的健康查体者
- D. 未接种卡介苗的婴幼儿
- E. 曾接种卡介苗的老年人

40. 要判断肺结核有无传染性，下列选项中最可靠的依据是

- A. 反复咯血
- B. 痰中找到结核杆菌
- C. PPD 试验呈阳性反应
- D. X 线胸片可见钙化点和空洞
- E. 明显的低热、乏力等结核中毒症状

41. 高血压合并糖尿病，BP 180/100mmHg；心率 65 次/分；尿蛋白(+)，血肌酐正常，选用下列哪类药物降压最合适

- A. ACEI 制剂
- B.  $\beta$ -受体阻滞剂
- C. 钙离子拮抗剂
- D. 利尿剂
- E. 脱水药

42. 患者，男，31 岁，突然出现高度呼吸困难，发绀，咯粉红色泡沫样痰，血压，80/50mmHg，两肺散在干、湿啰音，心率 140 次/分，心律绝对不整，心尖部闻及隆隆样舒张中晚期杂音，心电图示心房颤动，抢救措施首选

- A. 静脉注射呋塞米
- B. 静脉滴注硝普钠

- C. 静脉注射氨茶碱
- D. 皮下注射吗啡
- E. 静脉注射毛花苷丙

43. 患者，女，36岁，近2个月于剧烈活动时常发生眩晕及短暂意识丧失，查体胸骨左缘3肋间可闻及3/6级收缩期喷射样杂音。超声心动图示：舒张期室间隔厚度与左室后壁之比为1.6，最可能的诊断为

- A. 急性心肌梗死
- B. 原发性高血压
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 肥厚型心肌病
- E. 先天性心脏病

44. 患者，男，46岁，劳累时心悸、气短1年，腹胀、尿少3天，心电图示心房颤动、心室率110次/分；胸部X线示心影常明显增大，心胸比值60%，肺淤血。有助于该患者诊断的辅助检查是

- A. 心电向量图
- B. 超声心动图
- C. 心导管检查
- D. 心电图运动负荷试验
- E. 心脏放射性核素检查

45. 患者男，49岁，间断上腹疼痛2年，疼痛发作与情绪、饮食有关。查体上腹部轻压痛。胃镜：胃窦皱襞平坦，黏膜粗糙无光泽，黏膜下血管透见。此病例首先考虑诊断为

- A. 胃癌
- B. 急性胃炎
- C. 消化性溃疡
- D. 慢性浅表性胃炎
- E. 慢性萎缩性胃炎

46. 患者，女，39岁，上腹隐痛不适，近1个多月来逐渐加重，服用制酸剂后有所改善食欲尚可，粪便隐血(++)，胃肠钡餐摄片见胃小弯水平部黏膜纹理紊乱，胃壁僵直不规则，应考虑的诊断是

- A. 胃溃疡
- B. 胃窦炎
- C. 慢性萎缩性胃炎
- D. 胃黏膜脱垂
- E. 胃癌

47. 患者，男，54岁，患肝炎后肝硬化10年，近1周来病情加重，腹水量增加，腹胀明显，并出现呼吸困难、睡眠障碍和意识错乱。为减少腹水，下列最佳的治疗药物是

- A. 阿米洛利
- B. 氢氯噻嗪
- C. 螺内酯
- D. 呋塞米
- E. 螺内酯+氢氯噻嗪

48. 患者，男，40岁，6小时前大量饮酒后出现持续性上腹疼痛，阵发性加重，向腰背部放射，弯腰抱膝位可减轻。查体：上腹有压痛，轻度肌紧张。最不可能出现的实验室检查结果是

- A. 血清淀粉酶明显升高
- B. 腹水淀粉酶明显升高
- C. 血糖升高

D. 血钙降低

E. 低血钾

49. 患者，女，57岁，不规则反复上腹痛3年，食欲缺乏。突然呕血3次，每次约300ml，积极治疗24小时不能止血。血压12.3/6.8kPa(92/52mmHg)，脉搏120次/分，进一步治疗宜用哪种治疗措施

A. 注射血凝酶

B. 雷尼替丁静滴

C. 服用去甲肾上腺素

D. 尽快手术

E. 输血输液

50. 原发性肾病综合征患者，首次治疗，每日用泼尼松60mg，三周后尿蛋白仍为(++++)，此时应

A. 改用地塞米松

B. 将泼尼松加量到80mg/d

C. 改用环磷酰胺

D. 用原量继续观察

E. 减少泼尼松用量到40mg/d，加用免疫抑制剂

51. 患者，男，58岁，反复黑便，呕吐咖啡色液体1个月余，消瘦，腹胀，未触及肿块，血红蛋白5g/L，白细胞 $6.0 \times 10^9/L$ ，最大诊断可能是

A. 急性胃炎

B. 慢性胃炎

C. 胃癌

D. 胃溃疡

E. 十二指肠溃疡

52. 患者，男，25岁，节律性间断上腹隐痛3年，加重2天，10小时前开始黑便3次，量约1000g左右，P120次/分，Hb 90g/L，BP 90/60mmHg，首选下列哪种治疗

A. 大量输液

B. 输右旋糖酐

C. 外科手术

D. 急诊内镜止血

E. 输血、补液

53. 患者，男，32岁，肾病综合征患者，近两日右下肢疼、凉，右足背动脉搏动触不清，趾指皮肤发绀，应首先考虑的合并症是

A. 下尿路感染

B. 右下肢静脉血栓

C. 心源性休克

D. 急性肾衰

E. 右下肢动脉栓塞

54. 患者，男，41岁，腰痛、尿频、尿急、血压21.3/13.3kPa(160/100mmHg)，尿蛋白(+)，沉渣红细胞8~10/HP，白细胞15~20/HP。肾盂造影示右肾缩小，肾盏扩张，最可能诊断

A. 慢性肾炎

B. 慢性肾盂肾炎

C. 多囊肾

D. 肾结核

E. 肾盂积液



55. 患者，男，37岁，发热伴鼻出血一周。检查牙龈肿胀，肝脾轻度肿大；血红蛋白40g/L，白细胞 $600 \times 10^9/L$ ，血小板 $15 \times 10^9$ ，骨髓象原始细胞占60%，过氧化物酶染色阳性，非特异性酯酶阳性，阳性反应可被氟化钠抑制；中性粒细胞碱性磷酸酶增加，应诊断为

- A. 急性粒细胞白血病
- B. 急性早幼粒细胞白血病
- C. 急性淋巴细胞白血病
- D. 急性单核细胞白血病
- E. 急性红白血病

56. 患者，女，32岁，月经量多已2年，近3个月来感乏力、头晕、心悸，查血红蛋白65g/L，白细胞 $6.0 \times 10^9/L$ ，血小板 $140 \times 10^9/L$ ；血片中可见红细胞体积小、中央淡染区扩大，骨髓象：粒比红为1:1，红细胞增生活跃，中晚幼红细胞45%，体积小，胞质偏蓝，治疗首选

- A. 肌内注射维生素B12
- B. 口服铁剂
- C. 输血
- D. 脾切除
- E. 口服叶酸

57. 患者，女22岁头昏乏力，鼻出血伴牙龈出血1周，Hb82g/L；WBC $45 \times 10^9/L$ ，血小板 $25 \times 10^9/L$ 。骨髓增生极度活跃，原始细胞0.5，早幼粒细胞0.21，POX强阳性。NAP阴性。非特异性酯酶部分呈阳性反应，不被NaF抑制，确诊急性非淋巴细胞白血病。其FAB分型是

- A. M2
- B. M1
- C. M4
- D. M3
- E. M5

58. 患者，女，57岁，体重76kg，身高160cm。因多饮、多尿确诊为2型糖尿病，经饮食治疗和运动锻炼，2个月后空腹血糖为8.8mmol/L，餐后2小时血糖为13.0mmol/L。进一步治疗应选择

- A. 加磺脲类降血糖药物
- B. 加双胍类降糖药物
- C. 加胰岛素治疗
- D. 加口服降血糖药和胰岛素
- E. 维持原饮食治疗和运动

59. 患者，女，30岁，妊娠6周发生甲状腺功能亢进，甲状腺肿大伴有局部压迫症状，选择下列哪项治疗最恰当

- A. 抗甲状腺药物
- B. 终止妊娠后，服用抗甲状腺药物
- C. 终止妊娠后，手术治疗
- D. 终止妊娠后， $^{131}I$ 治疗
- E. 不终止妊娠，手术治疗

60. 急性肠梗阻患者大量呕吐，脉细数，血压下降，可能是

- A. 低渗性脱水
- B. 等渗性脱水
- C. 高渗性脱水
- D. 低钾血症

E. 高钾血症

61. 患者，女，22岁，I型糖尿病患者，出现恶心、厌食2天，神志不清1小时，查体面色潮红，呼吸深快，意识障碍。诊断方面最可能是

- A. 糖尿病酮症酸中毒
- B. 糖尿病高渗性昏迷
- C. 乳酸性酸中毒
- D. 糖尿病合并尿毒症酸中毒
- E. 低血糖昏迷

62. 患者，女，42岁，多饮、多食10年，空腹血糖经常大于10.8mmol/L。近两个月来眼睑及下肢轻度水肿，血压160/100mmHg，尿蛋白(++)最可能的诊断为

- A. 糖尿病肾病
- B. 高血压病
- C. 糖尿病合并肾盂肾炎
- D. 肾小球肾炎
- E. 糖尿病酮症酸中毒

63. 患者，女，64岁，晨起出现讲话不清，右侧肢体无力，两天后病情渐加重。血压148/80mmHg，意识清，失语，右侧偏瘫，可完全排除的诊断是

- A. 脑栓塞
- B. 脑血栓形成
- C. 短暂脑缺血发作
- D. 脑出血
- E. 腔隙性脑梗死

64. 患者，男，36岁，突然出现剧烈头痛、恶心和呕吐、意识清、四肢无瘫痪、颈项有阻力。为鉴别其为蛛网膜下腔出血还是化脓性脑膜炎，宜采用的主要方法是

- A. 血白细胞总数和分类检查
- B. 颅脑CT扫描
- C. 反复测量体温
- D. 抽血作细菌培养
- E. 腰椎穿刺查脑脊液

65. 患者，男，55岁，突发脑出血，头痛，呕吐，昏迷，血压200/120mmHg，应迅速给予

- A. 止血治疗
- B. 降血压治疗
- C. 降颅压治疗
- D. 维持生命体征
- E. 防治血管痉挛

66. 患者，男，23岁，四肢无力4天，无尿便障碍，无发热。查四肢肌力III级，四肢远端痛觉减退，腱反射弱病理反射，腰穿正常。首先考虑的疾病是

- A. 吉兰-巴利综合征
- B. 脊髓灰质炎
- C. 周期性瘫痪
- D. 急性脊髓炎
- E. 重症肌无力

67. 患者，女20岁，半月来发热37.5℃，伴周身乏力，食欲缺乏，尿色加深如深茶样，化验肝功ALT500U/L，

胆红素  $80 \mu\text{mol/L}$ ，抗 HAV IgM (+)，HBsAg (+)，抗 HBc IgG (+)，应诊为

- A. 急性甲型黄疸型肝炎
- B. 急性甲型合并乙型黄疸型肝炎
- C. 急性乙型黄疸型肝炎
- D. 急性乙型肝炎，既往感染甲肝病毒
- E. 急性甲型黄疸型肝炎，乙肝病毒携带

68. 患者，男，30岁，持续发热20天，伴有周身不适，巩膜轻度黄染，体温  $39^{\circ}\text{C}$ ，神志清，表情淡漠，肝肋下  $2.0\text{cm}$ ，脾肋下  $1.0\text{cm}$ ，白细胞  $3.0 \times 10^9/\text{L}$ ，中性  $80\%$ ，淋巴  $20\%$ ，说为明确诊断，应首选的检查为

- A. 血培养
- B. 骨髓培养
- C. 肝功能
- D. 粪便培养
- E. 尿培养

69. 球结膜充血，无水肿，咽充血，腋下可见点状抓痕样出血点，肝脾未及。血常规检查：WBC  $12 \times 10^9/\text{L}$ ，N  $72\%$ ，L  $28\%$ ，可见异型淋巴细胞。尿蛋白 (+++) RBC  $2 \sim 5/\text{HP}$ 。该患者首先考虑的诊断为

- A. 钩端螺旋体病
- B. 败血症
- C. 流行性出血热
- D. 流行性脑脊髓膜炎
- E. 结核性脑膜炎

70. 患者，男，27岁，于8月份突然发病，表现为发冷、寒战、高热、大汗而后缓解，隔日发作一次，已两周，血涂片查到疟原虫。经氯喹抗疟治疗后症状迅速缓解为防止复发，应采用的药物是

- A. 奎宁
- B. 乙胺嘧啶
- C. 甲氟喹
- D. 青蒿素
- E. 伯氨喹

71. 患者，男，36岁，3年来出现劳累后胸闷、头晕，1小时前因胸闷自用硝酸甘油片后感头晕加重，并出现短暂黑朦而来院。既往无高血压病史，无烟酒史，其父有类似病史。查体：血压  $120/70\text{mmHg}$ ，脉率  $68$  次/分，双肺（-），心界不大，心律整，胸骨左缘  $3 \sim 4$  肋间可闻  $3/6$  级收缩期吹风样杂音，A2 减弱。最可能的诊断是

- A. 肥厚型心肌病
- B. 扩张型心肌病
- C. 先天性心脏病
- D. 缺血性心脏病
- E. 限制性心肌病

72. 患者，男，36岁，3年来出现劳累后胸闷、头晕，1小时前因胸闷自用硝酸甘油片后感头晕加重，并出现短暂黑朦而来院。既往无高血压病史，无烟酒史，其父有类似病史。查体：血压  $120/70\text{mmHg}$ ，脉率  $68$  次/分，双肺（-），心界不大，心律整，胸骨左缘  $3 \sim 4$  肋间可闻  $3/6$  级收缩期吹风样杂音，A2 减弱。应首选的检查是

- A. 心电图
- B. 超声心动图
- C. 心肌核素显像

D. 冠状动脉造影

E. X 线胸片

73. 患者，男，36 岁，3 年来出现劳暴后胸闷、头晕，1 小时前因胸闷自用硝酸甘油片后感头晕加重，并出现短暂黑朦而来院。既往无高血压病史，无烟酒史，其父有类似病史。查体. 血 1 压 120/70mmHg，脉率 68 次/分，双肺（一），心界不大，心律整，胸骨左缘 3~4 肋间闻及可闻 3/6 级收缩期吹风样杂音，A2 减弱。适宜该患者治疗的药物是

A. 硝酸酯类

B. 洋地黄类

C. 利尿剂

D.  $\beta$  受体阻断剂

E. 硝普钠

74. 患者，男，57 岁，吞咽困难 3 个月，未进食 1 周，不能进水 3 天，伴乏力、口渴、尿少、皮肤无弹性、眼窝下陷、消瘦。诊断为贲门癌。该患者发生的水、电解质平衡失调是

A. 轻度低渗性缺水

B. 等渗性缺水

C. 中度低渗性缺水

D. 中高度渗性缺水

E. 重度高渗性缺水

75. 患者，男，57 岁，吞咽困难 3 个月，未进食 1 周，不能进水 3 天，伴乏力、口渴、尿少、皮肤无弹性、眼窝下陷、消瘦。诊断为贲门癌。为指导术前纠正水、电解质失调必须检查的项目是

A. 肝功能

B. 肠功能

C. 免疫功能

D. 血容量

E. 血  $\text{Na}^+$ 、 $\text{Cl}^-$

76. 患者，男，57 岁，吞咽困难 3 个月，未进食 1 周，不能进水 3 天，伴乏力、口渴、尿少、皮肤无弹性、眼窝下陷、消瘦。诊断为贲门癌。对该患者的处理中选择的液体是

A. 静滴 0.45%氯化钠液

B. 静滴 0.9%氯化钠液

C. 静滴 2%氯化钠液

D. 静滴 10%氯化钾液

E. 滴注 5%碳酸氢钠

77. 患者，女，26 岁，四肢肌肉疼痛 4 个月，伴口腔溃疡，光过敏，脱发。查体发现颧部红斑，双手、双膝关节肿胀、有压痛，双下肢凹陷性水肿。化验检查：血沉 90mm/小时，尿蛋白  $>0.5\text{g}/24\text{h}$ 。该患者可能的诊断是

A. 类风湿关节炎

B. 系统性红斑狼疮

C. 风湿性关节炎

D. 急性肾炎

E. 慢性肾炎

78. 患者，女，26 岁，四肢肌肉疼痛 4 个月，伴口腔溃疡，光过敏，脱发。查体发现颧部红斑，双手、双膝关节肿胀、有压痛，双下肢凹陷性水肿。化验检查：血沉 90mm/小时，尿蛋白  $>0.5\text{g}/24\text{h}$ 。该患者应采用的的治疗措施是

- A. 糖皮质激素
- B. 非甾体抗炎药抗药
- C. 甲氨蝶呤
- D. 柳氮磺吡啶
- E. 非甾体抗炎药+糖皮质激素

79. 患者，男，62岁，高血压病史6年，于活动中突然出现右侧肢体无力讲话不清和呕吐，2小时后来急诊。查体：血压220/120mmHg，心律齐，眼球向下斜视意识障碍，不能讲话，右侧肢体完全偏瘫。此患者可能的诊断是

- A. 脑栓塞
- B. 脑出血
- C. 脑血栓形成
- D. 上矢状窦血栓形成
- E. 短暂性脑缺血发作

80. 患者，男，62岁，高血压病史6年，于活动中突然出现右侧肢体无力讲话不清和呕吐，2小时后来急诊。查体：血压220/120mmHg，心律齐，眼球向下斜视意识障碍，不能讲话，右侧肢体完全偏瘫。首选的检查是

- A. 脑血管造影
- B. 头颅MRI
- C. 头颅CT
- D. 经颅多普勒超
- E. 脑电图

81. 患者，男，62岁，高血压病史6年，于活动中突然出现右侧肢体无力讲话不清和呕吐，2小时后来急诊。查体：血压220/120mmHg，心律齐，眼球向下斜视意识障碍，不能讲话，右侧肢体完全偏瘫。住院1小时后，患者出现昏迷，查体发现一侧瞳孔散大，对光反射消失。提示存在

- A. 海马沟回疝
- B. 脑血管痉挛
- C. 小脑扁桃体疝
- D. 展神经麻痹
- E. 脑桥中央溶解

82. 患者，男，27岁，突然意识不清，跌倒，全身强直数秒钟后抽搐，咬破舌2分钟后抽搐停止。醒后活动自如。首先应考虑的疾病是

- A. 脑出血
- B. 脑血栓
- C. 蛛网膜下腔出血
- D. 癫痫
- E. 脑栓塞

83. 患者，男，27岁，突然意识不清，跌倒，全身强直数秒钟后抽搐，咬破舌2分钟后抽搐停止。醒后活动自如。应进一步做的检查是

- A. 头颅X线片
- B. 脑电图
- C. 脑脊液检查
- D. 脑血管造影
- E. 经颅超声多普勒(TCD)

84. 患者，男，22岁，发热起病，体温38℃，3天后体温下降伴周身乏力，食欲缺乏，恶心呕吐。近2天发现尿色深如豆油样，胆红素定量80 μmol/L，抗HBs(+)，抗HAVIgM(+)，巩膜及皮肤中等度黄疸，肝区轻度叩痛，肝肋下触及1cm，质软，脾侧卧位未及，胆囊区无压痛。此患临床诊断应考虑

- A. 急性黄疸型肝炎
- B. 急性重型肝炎
- C. 亚急性重型肝炎
- D. 淤胆型肝炎
- E. 胆囊炎伴肝损害

85. 患者，男，22岁，发热起病，体温38℃，3天后体温下降伴周身乏力，食欲缺乏，恶心呕吐。近2天发现尿色深如豆油样，胆红素定量80 μmol/L，抗HBs(+)，抗HAVIgM(+)，巩膜及皮肤中等度黄疸，肝区轻度叩痛，肝肋下触及1cm，质软，脾侧卧位未及，胆囊区无压痛。从病原学诊断应考虑

- A. 急性乙型肝炎
- B. 急性甲型肝炎
- C. 急性戊型肝炎
- D. 急性甲、乙型肝炎
- E. 急性丁型肝炎

86. 患者，男，22岁，发热起病，体温38℃，3天后体温下降伴周身乏力，食欲缺乏，恶心呕吐。近2天发现尿色深如豆油样，胆红素定量80 μmol/L，抗HBs(+)，抗HAVIgM(+)，巩膜及皮肤中等度黄疸，肝区轻度叩痛，肝肋下触及1cm，质软，脾侧卧位未及，胆囊区无压痛。此患者目前主要治疗措施

- A. 保肝治疗
- B. 卧床休息
- C. 调节免疫功能治疗
- D. 抗病毒治疗
- E. 支持治疗

87. 22岁农村妇女，与邻居口角，被对方打了一耳光，患者走回家中，取一菜刀追赶对方，被石头绊倒，当即肢体不随意运动、抽搐、牙关紧闭、呼之不应，半小时后遂来急诊。下列检查项目中最急需的是

- A. 神经系统检查
- B. 脑CT
- C. 脑脊液
- D. EEG
- E. ECG

88. 患儿为8岁农村男孩，因“突起高热3天，昏迷、抽搐1天”于本年8月3日入院。现体温40.1℃，测压14.7/9.3kPa(110/70mmHg)。皮肤无瘀点。两瞳孔不等大，对光反应迟钝，颈有抵抗感。心率120次/分，双肺听诊正常。腹软，无压痛及反跳痛，肠鸣音不亢进。双侧Babinski征(+)。本例最可能的诊断是

- A. 流行性乙型脑炎
- B. 流行性脑脊髓膜炎
- C. 中毒性肺炎
- D. 中毒性菌痢
- E. 脑型疟疾

89. 患儿为8岁农村男孩，因“突起高热3天，昏迷、抽搐1天”于本年8月3日入院。现体温40.1℃，测压14.7/9.3kPa(110/70mmHg)。皮肤无瘀点。两瞳孔不等大，对光反应迟钝，颈有抵抗感。心率120次/分，双肺听诊正常。腹软，无压痛及反跳痛，肠鸣音不亢进。双侧Babinski征(+)。最需要排除的疾病是

- A. 流行性乙型脑炎
- B. 流行性脑脊髓膜炎
- C. 中毒性肺炎
- D. 中毒性菌痢
- E. 脑型疟疾

90. 患儿为 8 岁农村男孩，因“突起高热 3 天，昏迷、抽搐 1 天”于本年 8 月 3 日入院。现体温 40.1℃，测压 14.7/9.3kPa (110/70mmHg)。皮肤无瘀点。两瞳孔不等大，对光反应迟钝，颈有抵抗感。心率 120 次/分，双肺听诊正常。腹软，无压痛及反跳痛，肠鸣音不亢进。双侧 Babinski 征 (+)。对于本例的诊治方案中，错误的是

- A. 立即进行腰穿，取脑脊液检查常规、生化及病原菌
- B. 20%甘露醇及地塞米松静脉推注
- C. 酒精擦浴
- D. 亚冬眠疗法
- E. 呼吸兴奋剂

91. 患者，男，23 岁，浸润性肺结核患者，初治、涂阴。既往身体健康，血常规、肝肾功能正常。其抗结核化疗方案应选用

- A. 2HRZ/4HR
- B. 2HRZSE/4~6HRE
- C. 2HRZE/4HR
- D. 2H3R3Z3/2H3R3
- E. 2H3R3Z3S3E3/6H3R3E3

92. 患者，男，23 岁，浸润性肺结核患者，初治、涂阴。既往身体健康，血常规、肝肾功能正常。下列不良反应与利福平无关的是

- A. 胃肠道反应
- B. 肝功损害
- C. 流感样症状
- D. 皮肤综合征
- E. 视神经炎

93. 听诊可闻大炮音见于

- A. 一度房室传导阻滞
- B. 二度 I 型房室传导阻滞
- C. 二度 II 型房室传导阻滞
- D. 三度 II 型房室传导阻滞
- E. 青春期的正常男性

94. 听诊第一心音由强变弱见于

- A. 一度房室传导阻滞
- B. 二度 I 型房室传导阻滞
- C. 二度 II 型房室传导阻滞
- D. 三度 II 型房室传导阻滞
- E. 青春期的正常男性

95. 肝性脑病二期的表现是

- A. 扑翼样震颤无法引出

- B. 轻度性格改变和行为失常
- C. 昏睡和精神错乱
- D. 意识错乱和睡眠倒错
- E. 昏睡和精神错乱

96. 肝性脑病四期的表现是

- A. 扑翼样震颤无法引出
- B. 轻度性格改变和行为失常
- C. 昏睡和精神错乱
- D. 意识错乱和睡眠倒错
- E. 昏睡和精神错乱

97. 患者，女，40岁，中度弥漫性甲状腺伴亢合并迁延性肝炎，且对抗甲状腺药物过敏，首选何种治疗

- A. 硫脲类制剂
- B. 碘制剂
- C. 普萘洛尔
- D.  $^{131}\text{I}$
- E. 手术

98. 患者，女，56岁，结节性甲状腺肿伴甲亢，首选何种治疗

- A. 硫脲类制剂
- B. 碘制剂
- C. 普萘洛尔
- D.  $^{131}\text{I}$
- E. 手术

99. 类风湿性关节炎病变始于

- A. 滑膜
- B. 肌肉肌腱
- C. 软骨
- D. 骨
- E. 关节囊

100. 骨性关节炎病变始于

- A. 滑膜
- B. 肌肉肌腱
- C. 软骨
- D. 骨
- E. 关节囊