

# 303 内科学

## 专业知识

1. 下列是社区获得性肺炎最常见致病菌的是
  - A. 肺炎克雷伯杆菌
  - B. 流感嗜血杆菌
  - C. 铜绿假单胞菌
  - D. 肺炎球菌
  - E. 葡萄球菌
2. 下列符合漏出液特点的是
  - A. 比重大于 1.018
  - B. 蛋白含量  $>30\text{g/L}$
  - C. 细胞数  $<100 \times 10^6/\text{L}$
  - D. 胸水蛋白/血清蛋白比值  $>0.5$
  - E. 胸水为血性胸水
3. 治疗慢性肺源性心脏病心力衰竭的首要措施是
  - A. 积极控制感染和改善呼吸功能
  - B. 使用正性肌力药
  - C. 使用小剂量作用缓和的利尿剂
  - D. 应用血管扩张剂减轻心脏负荷
  - E. 卧床休息, 低盐饮食
4. 支气管哮喘的本质是
  - A. 支气管平滑肌可逆性痉挛
  - B. 一种自身免疫性疾病气道慢性炎症
  - C. 气管平滑肌内  $\beta_2$  受体功能低下
  - D. 气道慢性非特异性炎症
  - E. 肥大细胞膜上 M 胆碱能受体功能亢进
5. 关于支气管哮喘急性发作时肺功能的改变, 以下说法正确的是
  - A. 用力肺活量增加
  - B. 第一秒钟用力呼气容积减少
  - C. 残气量减少
  - D. 肺总量减少
  - E. 最高呼气流量增加
6. 冠状动脉粥样硬化次要危险因素不包括
  - A. 糖尿病
  - B. 遗传因素
  - C. 工作紧张
  - D. 肥胖
  - E. 西方的饮食方式
7. 高血压急症是指短时期内血压重度升高, 并伴有心、脑、肾及眼底的严重功能障碍, 其舒张压和(或)收

缩压为

- A.  $>120\text{mmHg}$ ; 不变
  - B.  $\geq 100\text{mmHg}$ ;  $\geq 180\text{mmHg}$
  - C.  $>130\text{mmHg}$ ;  $>200\text{mmHg}$
  - D. 不变 ;  $>200\text{mmHg}$
  - E.  $>120\text{mmHg}$ ;  $>180\text{mmHg}$
8. 属于 IC 类抗心律失常药物是
- A. 美托洛尔
  - B. 美西律
  - C. 普罗帕酮
  - D. 苯妥英钠
  - E. 利多卡因
9. 主动脉瓣狭窄的晚期, 可见
- A. 收缩压升高, 脉压正常
  - B. 脉压升高, 收缩压正常
  - C. 收缩压和脉压均升高
  - D. 收缩压和脉压均下降
  - E. 收缩压和舒张压均下降
10. 急性病毒性心肌炎早期应用激素的指征不包括
- A. 病毒抗体效价增高 4 倍以上
  - B. 难治性心力衰竭
  - C. 房室传导阻滞
  - D. 血流动力学不稳定重症患者
  - E. 有自体免疫因子存在
11. 高血压并发稳定型心绞痛的降压治疗的最佳方案是
- A. 利尿剂
  - B. ACEI
  - C. CCB
  - D.  $\beta$  受体阻滞剂
  - E. 以上都不是
12. 左心衰时心脏听诊特点
- A. 主动脉瓣区第二心音亢进
  - B. 舒张晚期奔马律
  - C. 舒张早期奔马律
  - D. 收缩期喷射音
  - E. 收缩中期喀喇音
13. 心源性哮喘表现为
- A. 劳力性呼吸困难
  - B. 端坐呼吸
  - C. 夜间阵发性呼吸困难
  - D. 发作性喘息
  - E. 呼气性呼吸困难
14. 慢性主动脉瓣关闭不全的心电图表现

- A. 右心室肥厚劳损.
  - B. 左心室肥厚劳损
  - C. 完全性左束支传导阻滞
  - D. 完全性右束支传导阻滞
  - E. 右束支传导阻滞
15. 发绀的决定性因素是
- A. 血压过低
  - B. 心功能衰竭
  - C. 红细胞数量
  - D. 血液中还原血红蛋白的绝对量
  - E. 心脏由右向左分流
16. 消化性溃疡病理损伤至少达
- A. 黏膜层
  - B. 黏膜下层
  - C. 黏膜肌层
  - D. 肌层
  - E. 浆膜层
17. 十二指肠溃疡的好发部位为
- A. 十二指肠球后
  - B. 十二指肠水平段
  - C. 十二指肠降段
  - D. 十二指肠升段
  - E. 十二指肠球部
18. 胃溃疡的好发部位是
- A. 胃窦大弯侧
  - B. 胃角和胃窦小弯
  - C. 贲门
  - D. 胃底部
  - E. 幽门管
19. 确诊慢性胃炎的主要依据是
- A. 血清胃泌素测定
  - B. X 线钡餐检查
  - C. 大便潜血试验
  - D. Hp 检查
  - E. 胃镜及胃黏膜活检
20. 1994 年 WHO 宣布胃癌的 I 类致癌原是
- A. 霉变食品
  - B. 环境因素
  - C. 腌制烟熏食品
  - D. 遗传因素
  - E. 幽门螺杆菌
21. 小胃癌的大小为
- A.  $<0.1\text{cm}$

B. <0.5cm

C. <1.0cm

D. <2.0cm

E. <2.5cm

22. Krukenberg 瘤发生的部位是

A. 十二指肠

B. 卵巢

C. 盆腔

D. 大网膜

E. 膀胱

23. 克罗恩病内镜下表现描述错误的是

A. 病变呈节段性分布

B. 黏膜呈铺路卵石样改变

C. 可见纵行溃疡

D. 肠腔狭窄

E. 可见环状溃疡, 边缘呈鼠咬状

24. 肝硬化门静脉高压可引起

A. 凝血因子减少

B. 脐静脉呈水母头状

C. 水肿

D. 黄疸

E. 肝昏迷

25. 肝硬化门脉高压诊断最有特征的表现是

A. 腹水

B. 贫血

C. 侧支循环建立

D. 脾大

E. 内分泌紊乱

26. 肝硬化失代偿期诊断的主要依据

A. 体重下降

B. 蜘蛛痣

C. 腹胀

D. 食欲减低

E. 周身乏力

27. 肝硬化患者出现上消化道出血后应采用下列措施预防肝性脑病的是

A. 保肝

B. 弱碱灌肠

C. 弱酸灌肠

D. 纠正酸碱平衡

E. 大量补液

28. 关于急性胰腺炎时的腹痛, 下列说法错误的是

A. 多为持续性

B. 程度多较严重

- C. 为急性胰腺炎的主要表现和首发症状  
D. 弯腰抱膝位可减轻疼痛  
E. 不能为一般胃肠解痉药缓解
29. 下列不属于急性胰腺炎并发症的是
- A. 慢性胰腺炎  
B. 急性肾衰竭  
C. 败血症  
D. 高脂血症  
E. 胰腺脓肿
30. 急性胰腺炎需与下列疾病进行鉴别, 除了
- A. 消化性溃疡急性穿孔.  
B. 急性阑尾炎  
C. 胆石症和急性胆囊炎  
D. 急性肠梗阻  
E. 心肌梗死
31. 急性胰腺炎时, 下列不是手术适应证的是
- A. 胰腺坏死合并感染  
B. 消化道出血  
C. 胰腺脓肿  
D. 胰腺假性囊肿  
E. 胆道梗阻
32. 下列对诊断慢性胰腺炎有重要价值的是
- A. 立位腹平片  
B. 胰腺 CT  
C. MRCP  
D. ERCP  
E. 超声内镜
33. 关于慢性胰腺炎的手术指征, 错误的是
- A. 腹痛剧烈  
B. 合并胰腺脓肿  
C. 不能排除癌变  
D. 胰腺肿大引起阻塞性黄疸  
E. 瘘管形成
34. 蛛网膜下腔出血和脑出血的主要鉴别点是
- A. 脑脊液有无血液  
B. 有无神志不清  
C. 有无脑膜刺激征  
D. 有无高血压病史  
E. 有无神经系统定位体征
35. 有关震颤麻痹的生化病理, 下列说法正确的是
- A. 纹状体多巴胺增多  
B. 纹状体多巴胺减少  
C. 纹状体乙酰胆碱增多

- D. 纹状体乙酰胆碱减少
  - E. 多巴胺减少,同时乙酰胆碱增多
36. 关于帕金森病临床表现错误的是
- A. 搓丸样动作
  - B. 齿轮样强直
  - C. 大写征
  - D. 路标现象
  - E. 面具脸
37. 杰克逊(Jackson)癫痫属于
- A. 部分运动性发作
  - B. 复杂部分性发作
  - C. 体觉性发作
  - D. 精神性发作 ;
  - E. 全面性发作
38. 关于癫痫的治疗原则错误的是
- A. 联合用药原则
  - B. 个体化用药原则
  - C. 长期用药原则
  - D. 停药应遵循缓慢和逐渐减量的原则
  - E. 增药可适当的快,减药一定要慢
39. 癫痫持续状态治疗首选
- A. 苯妥英钠大负荷剂量静滴
  - B. 安定静脉注射
  - C. 异戊巴比妥钠静脉注射
  - D. 氯硝西洋静脉注射
  - E. 卡马西平鼻饲
40. 关于偏头痛, 以下不正确的是
- A. 多在儿童和青年期发病, 女性多见
  - B. 有或无视觉先兆
  - C. 可持续 4~72 小时
  - D. 头痛缓解后均不遗留神经系统阳性体征
  - E. 发作时首选咖啡因麦角胺口服
41. 根据哪些方面的临床表现区别中枢性瘫痪和周围性瘫痪
- A. 肌力的大小
  - B. 有无感觉障碍
  - C. 有无病理反射
  - D. 有无大小便障碍
  - E. 以上都不是
42. 浅昏迷最有价值的体征是
- A. 对疼痛刺激有反应
  - B. 角膜反射消失
  - C. 无吞咽反射
  - D. 能执行简单的命令

E. 瞳孔对光反射消失

43. 下列治疗措施中不适合用于急性脊髓炎急性期的是

- A. 糖皮质激素
- B. 维生素 B 族类药物

C. A. T. P

D. EACA 静脉滴注

E. 加强护理, 防治并发症

44. 治疗短暂性脑缺血发作的药物是

A. 烟酸

B. EACA

C. 苯妥英钠

D. 小剂量阿司匹林

E. 卡马西平

45. 一位患者有步态不稳 (夜晚黑暗时加重), 行走时双目注视地面, 跨步阔大, 举足过高, 踏步作响。应考虑为

A. 小脑性共济失调

B. 前庭功能障碍

C. 感觉性共济失调

D. 下肢痉挛性轻瘫

E. 鸭步

46. 运动性失语, 其病变部位在

A. 左侧大脑半球

B. 右侧大脑半球

C. 主侧 (优势) 半球额下回后部

D. 角回

E. 第一、二颞回后部

47. 浅感觉纤维在脊髓丘脑束中的排列是

A. 按骶、腰、胸、颈次序, 由前向后

B. 按骶、腰、胸、颈次序, 由后向前

C. 按颈、胸、腰、骶次序, 由内向外

D. 按骶、腰、胸、颈次序, 由内向外

E. 以上均不对

48. 人体的运动功能位置在中央前回的排列是

A. 头面在上部, 下肢在下部

B. 躯体在上部, 头面在下部

C. 下肢在上部, 头面在下部

D. 头面在上部, 上肢在下部

E. 上述排列均不对

49. 癫痫大发作的首选药物是

A. 丙戊酸钠

B. 氯硝西洋

C. 苯妥英钠或苯巴比妥

D. 安定

E. 扑痫酮

50. 下列各反射的神经支配错误的是

A. 膝反射 (L2~L4)

B. 提睾反射 (L1~L2)

C. 踝反射 (S2~S4)

D. 肛门反射 (S4~S5)

E. 肱二头肌反射 (C5~C6)

51. 以下疾病不会出现针尖样瞳孔的是

A. 脑桥出血

B. 神经梅毒

C. 有机磷中毒

D. 鸦片类药物过量

E. 阿托品药物过量

52. 与深感觉传导有关的结构是

A. 楔束

B. 锥体束

C. 内侧纵束

D. 外侧丘系

E. 脊髓丘脑束

53. 下骶髓病变时, 不应出现的临床表现是

A. 二便障碍

B. 锥体束征阴性

C. 下肢严重瘫痪

D. 肛门反射消失

E. 鞍区感觉丧失

54. 不属于贫血临床表现的是

A. 面色苍白, 头昏乏力

B. 食欲减退, 恶心

C. 记忆力减退, 失眠多梦

D. 持续低热, 牙龈渗血

E. 活动后心悸气促

55. 体内缺铁性贫血最终阶段的诊断依据是

A. 血清铁减低

B. 血清总铁结合力增高

C. 血清转铁蛋白饱和度下降

D. 骨髓贮存铁及铁蛋白减少

E. 典型的小细胞低色素性贫血

56. 缺铁性贫血的实验室检查应是

A.  $MCV < 100 \text{ fl}$ ,  $MCHC < 32\%$

B. 骨髓象呈“核老浆幼”现象

C. 血清铁降低、总铁结合力正常、转铁蛋白饱和度降低

D.  $FEP > 0.9 \text{ } \mu\text{mol/L}$ ,  $ZPP > 0.9 \text{ } \mu\text{mol/L}$

E. 血清铁蛋白正常



57. 缺铁性贫血患者可待下列指标正常后停止补铁的是

- A. 血红蛋白
- B. 血清铁
- C. 红细胞计数
- D. 铁蛋白
- E. 总铁结合力

58. 下列关于对于 M3 的说法正确的是

- A. 骨髓增生活跃，原粒细胞占非红系有核细胞 >80%
- B. 最易发生 DIC
- C. Ph' 多阳性
- D. NAP 升高
- E. CD19(+)、CD33(-)、HLA-DR(+)

59. Auer 小体不见于

- A. M2 型白血病
- B. M3 型白血病
- C. 急性淋巴细胞白血病
- D. M4 型白血病
- E. M5 型白血病

60. 与急性淋巴细胞白血病不相符的是

- A. 过氧化物酶阴性
- B. 未见 Auer 小体
- C. 苏丹黑染色阳性
- D. 糖原 PAS 反应(-)
- E. 非特异酯酶阴性

61. 急性髓细胞白血病首选治疗方案是

- A. DA 或 HA
- B. HOAP
- C. VP
- D. 小剂量阿糖胞苷
- E. 左旋门冬酰胺

62. 以下实验室检查不是原发性骨髓纤维化特点的是

- A. 成熟红细胞大小不一，常见泪滴形红细胞
- B. 骨活检见大量纤维组织增生
- C. 白细胞增多或正常，以早、中幼粒细胞增多为主
- D. Ph' 染色体阳性
- E. 骨 X 线检查呈“毛玻璃”现象

63. 有关脾功能亢进错误的是

- A. 脾亢早期表现为白细胞和血小板减少
- B. 脾大程度与脾功能亢进程度平行
- C. 脾亢时巨噬细胞吞噬功能增强
- D. 脾亢时血液稀释加重贫血
- E. 呈增生性骨髓象

64. 过敏性紫癜最常见的类型是

- A. 单纯型
  - B. 腹型
  - C. 肾型
  - D. 关节型
  - E. 混合型
65. 关于慢性 ITP 的描述, 正确的是
- A. 多见于儿童
  - B. 发病前多有感染史
  - C. 骨髓幼稚巨核细胞增加
  - D. 多可自行缓解
  - E. 血小板生存时间缩短
66. 符合急性淋巴细胞性白血病的是
- A. 为儿童最多见的急性白血病
  - B. 易发生 DIC 出血严重
  - C. 与 EB 病毒感染有关
  - D. 中枢神经系统白血病少见
  - E. 化疗效果差
67. 脾功能亢进切脾治疗的指征
- A. 中度脾大, 无压迫症状
  - B. 老年血栓患者
  - C. 严重的血小板减少和出血症状
  - D. 幼年患者
  - E. 粒细胞减少, 无感染症状
68. 病程在 10 年以上的 1 型糖尿病患者, 首要死亡原因的并发症是
- A. 酮症酸中毒
  - B. 心血管病变
  - C. 高渗性非酮症昏迷
  - D. 糖尿病性肾病
  - E. 结核病
69. 糖尿病酮症酸中毒的特征性表现是
- A. 昏迷
  - B. 皮肤黏膜干燥
  - C. 呼气有烂苹果味
  - D. 二氧化碳结合力下降
  - E. 呼吸深大
70. 治疗糖尿病的下列药物中, 较易引起胃肠反应及乳酸中毒的是
- A. 胰岛素
  - B. 二甲双胍
  - C. 格列本脲
  - D. 罗格列酮
  - E. 瑞格列奈
71. 慢性肾功能不全最早、最常见的症状是
- A. 高血压

- B. 贫血
  - C. 消化道症状
  - D. 出血倾向
  - E. 皮肤瘙痒
72. 慢性肾功能不全患者贫血的主要原因是
- A. 铁缺乏
  - B. 活动性失血
  - C. 红细胞生成素产生绝对或相对减少
  - D. 铝负荷过重
  - E. 继发性甲状旁腺功能亢进
73. 慢性肾功能不全尿毒症患者最常见的死亡原因是
- A. 动脉粥样硬化
  - B. 心力衰竭
  - C. 脑出血
  - D. 电解质紊乱
  - E. 心律失常
74. 急性肾衰竭最常见的原因
- A. 间质性肾炎
  - B. 大血管疾病（肾动脉血栓、肾静脉栓塞）
  - C. 急性肾小管坏死
  - D. 肾小球疾病
  - E. 微血管疾病
75. 治疗慢性肾盂肾炎下列描述错误的是
- A. 必须同时去除诱因
  - B. 单用有效药物使用 2~4 周
  - C. 症状不明显，可采用低剂量抑菌疗法
  - D. 急性发作时治疗同急性肾盂肾炎
  - E. 根据尿培养药敏结果选择抗生素
76. 急性肾衰竭患者，静脉应用碳酸氢盐指征是
- A. 实际碳酸氢盐小于 20mmol/L
  - B. 实际碳酸氢盐小于 17mmol/L
  - C. 实际碳酸氢盐小于 15mmol/L
  - D. 实际碳酸氢盐小于 13.5mmol/L
  - E. 实际碳酸氢盐小于 17.1mmol/L
77. 关于肾病综合征并发感染说法不正确的是
- A. 与蛋白质营养不良有关
  - B. 与免疫功能紊乱有关
  - C. 与糖皮质激素治疗有关
  - D. 常见感染部位是消化道感染
  - E. 常见感染部位是呼吸道感染
78. 血红蛋白尿可见与下列疾病，除了
- A. 阵发性血红蛋白尿
  - B. 蚕豆病

- C. 血型不合的输血反应
  - D. 溶血性疾病
  - E. 重症肾小球肾炎
79. 成人 24 小时尿蛋白大于多少时称为蛋白尿
- A. 100mg
  - B. 150mg
  - C. 200mg
  - D. 250mg
  - E. 300mg
80. 大量蛋白尿指
- A. 24 小时尿蛋白定量大于 2.0 克
  - B. 24 小时尿蛋白定量大于 2.5 克
  - C. 24 小时尿蛋白定量大于 3.0 克
  - D. 24 小时尿蛋白定量大于 3.5 克
  - E. 24 小时尿蛋白定量大于 5.0 克
81. 下列情况不适合行肾活检的是
- A. 原发性肾病综合征
  - B. 原因不明的肾小球性蛋白尿
  - C. 原因不明的急性肾衰竭少尿期延迟
  - D. 持续肾小球源性血尿
  - E. 孤立肾
82. 肾病综合征的诊断标准不包括
- A. 尿蛋白大于 3.5g/d
  - B. 血浆白蛋白低于 30g/L
  - C. 血尿
  - D. 血脂升高
  - E. 水肿
83. 肾病综合征常见并发症不包括
- A. 急性肾衰竭
  - B. 感染
  - C. 血栓、栓塞
  - D. 出血
  - E. 蛋白质及脂肪代谢紊乱
84. 以下不是尿路感染易感因素的是
- A. 糖尿病
  - B. 肾结石
  - C. 输尿管插管
  - D. 胆囊结石
  - E. 长期应用糖皮质激素
85. 下列关于尿路感染病因的说法，正确的是
- A. 革兰阳性球菌为最常见的致病菌
  - B. 大肠埃希菌感染占 40%
  - C. 革兰阴性菌占 50%

- D. 血行感染是常见的感染方式
- E. 上行感染占尿路感染的 95%
86. 尿路感染的诊断, 正确的是
- A. 尿路感染肯定有尿路刺激征表现
- B. 尿液中培养发现一次细菌即可确诊尿路感染
- C. 下尿路感染常以膀胱刺激征为突出表现
- D. 上尿路感染不会出现发热、寒战
- E. 尿结核菌培养阴性可除外泌尿系结核
87. 下列是系统性红斑狼疮的典型皮损的是
- A. 盘状红斑
- B. 蝶形红斑
- C. 结节红斑
- D. 荨麻疹
- E. 下肢的网状青斑
88. 系统性红斑狼疮原发病所致的皮肤黏膜病变不包括
- A. 皮肤红斑
- B. 光过敏
- C. 鹅口疮
- D. 脂膜炎
- E. 口腔溃疡
89. 系统性红斑狼疮肺部受累最严重的病变是
- A. 胸腔积液
- B. 狼疮肺炎
- C. 肺间质病变
- D. 弥漫性肺泡内出血
- E. 肺动脉高压
90. 肾结核患者早期唯一重要的阳性发现是
- A. 尿内有少量的红细胞和脓细胞
- B. KUB (尿路平片) 可见钙化灶
- C. IVU (静脉尿路造影) 可见空洞破坏
- D. 腰部扪及包块
- E. 肾区疼痛
91. 患者女。反复尿频、尿急和血尿, 尿结核菌培养阳性, 经 CT 检查发现有肾积脓。最好的治疗方法是
- A. 抗感染治疗
- B. 抗结核治疗
- C. 抗结核+病灶切除
- D. 抗结核+右肾切除
- E. 抗结核+肾部分切除
92. 有关肾结核的诊断, 下列分析错误的是
- A. 尿沉渣中查到抗酸杆菌不一定是结核
- B. 尿结核杆菌培养阴性, 不能排除尿路结核
- C. 排泄性尿路造影可以不显影
- D. 男性患者的原发病灶在附睾

- E. 扪及肿大的肾脏不一定是结核肾
93. 钩体病最多见的临床类型是
- A. 肺出血型
  - B. 肾衰竭型
  - C. 流感伤寒型
  - D. 黄疸出血型
  - E. 脑膜脑炎型
94. 预防和控制伤寒流行的最重要措施是
- A. 早期隔离和治疗患者
  - B. 检出带菌者并进行隔离
  - C. 伤寒菌苗预防接种
  - D. 切断传播途径
  - E. 疫区消毒
95. 关于菌痢的病理改变叙述不正确的是
- A. 病变主要累及乙状结肠和直肠
  - B. 急性期肠黏膜基本病变是渗出性炎症
  - C. 病变通常可侵犯黏膜肌层
  - D. 中毒性菌痢肠道病变多轻微
  - E. 慢性期可有肠壁增厚、息肉形成
96. 急性菌痢临床类型中最为凶险的类型是
- A. 急性典型
  - B. 急性中毒性菌痢休克型
  - C. 急性中毒性菌痢脑型
  - D. 急性中毒性菌痢混合型
  - E. 急性非典型
97. 下列不是典型间日疟临床表现的是
- A. 高热
  - B. 黄疸
  - C. 寒战
  - D. 大汗
  - E. 脾大
98. HIV 抗反转录病毒治疗的药物不包括
- A. 核苷类反转录酶抑制剂
  - B. 非核苷类反转录酶抑制剂
  - C. 蛋白酶抑制剂
  - D. 进入和融合抑制剂
  - E. 转录酶抑制剂
99. 疟原虫感染人体的阶段为
- A. 配子体
  - B. 滋养体
  - C. 子孢子
  - D. 裂殖子
  - E. 环状体

100. 在生产条件下，金属汞主要经呼吸道进入人体的形式是

- A. 粉尘
- B. 烟
- C. 蒸气
- D. 雾
- E. 混合形式