

303 内科学

专业知识

1. 答案:D

2. 答案:C

3. 答案:A

4. 答案:D

5. 答案:B

6. 答案:A

解析:糖尿病是动脉粥样硬化的主要危险因素。

7. 答案:E

8. 答案:C

9. 答案:D

解析:主动脉瓣狭窄的患者动脉脉搏上升缓慢,细小而持续(细迟脉)。在晚期,收缩压和脉压均下降。

10. 答案:A

11. 答案:C

12. 答案:C

13. 答案:C

解析:心力衰竭患者夜间平卧睡眠时,由于回心血量增多,迷走神经兴奋及膈肌上移压迫等原因,发生夜间阵发性呼吸困难,出现类似哮喘症状。

14. 答案:B

解析:慢性主动脉瓣关闭不全常有左心室增大改变,心电图表现为左心室肥厚劳损。

15. 答案: D

解析:血液中还原血红蛋白颜色青紫,若其绝对量多则表现为皮肤黏膜发绀。

16. 答案:C

解析:溃疡的黏膜损伤超过黏膜肌层,不同于糜烂。

17. 答案:E

18. 答案:B

19. 答案:E

20. 答案:E

21. 答案:C

22. 答案:B

23. 答案:E

24. 答案:B

解析:肝硬化肝功能减退表现为全身症状如周身乏力,消化系统症状如食欲减低,出血倾向,内分泌紊乱相关表现如蜘蛛痣、肝掌、男性乳房发育等,黄疸;肝硬化门脉高压的表现有门体侧支循环如食管胃底静脉曲张、痔核、腹壁静脉曲张,脾大,腹水。

25. 答案:C

26. 答案:B

27. 答案:C

解析：酸性肠道可减少氨的吸收，并促进血液中的氨渗入肠道排出。

28. 答案:B

解析：急性胰腺炎时腹痛为主要表现和首发症状，程度轻重不一，可为钝痛、刀割样痛、钻痛或绞痛，呈持续性，可有阵发性加剧，不能为一般胃肠解痉药缓解，进食可加剧。多位于中上腹，可向腰背部呈带状放射，取弯腰抱膝位可减轻疼痛。

29. 答案:D

解析：急性胰腺炎的并发症，可表现为局部并发症和全身并发症。局部并发症包括胰腺脓肿和胰腺假性囊肿。全身并发症包括急性呼吸衰竭；急性肾衰竭；心力衰竭与心律失常；消化道出血；胰性脑病；败血症与真菌感染；高血糖；慢性胰腺炎。

30. 答案:B

31. 答案:B

解析：急性胰腺炎的手术适应证：胰腺坏死合并感染；胰腺脓肿；胰腺假性囊肿；胆道梗阻或感染；诊断未明确、疑有腹腔脏器穿孔或肠坏死者行剖腹探查术。

32. 答案:D

33. 答案:A

34. 答案:E

解析：蛛网膜下腔出血主要表现为头痛、脑膜刺激征、眼部症状，一般无神经系统定位体征。脑出血根据出血部位不同而出现局灶性定位表现。

35. 答案:B

解析：考查 PD 的病理机制。

36. 答案:C

解析：帕金森病临床表现为小写征。

37. 答案:A

38. 答案:A

解析：考查癫痫的治疗原则，应在单药治疗无效或效果不佳时选择联合用药。

39. 答案:B

40. 答案：D

41. 答案：C

解析：上下神经元瘫痪的鉴别。

42. 答案：A

43. 答案：D

解析：急性脊髓炎不需止血治疗。

44. 答案:D

解析：阿司匹林(抑制血小板聚集)为 TIA 的治疗药物。

45. 答案：C

解析：此患者的步行符合感觉性共济失调。小脑蚓部病变，行走呈醉汉步态；小脑半球或前庭病变，行走向患侧偏斜。两下肢痉挛性轻瘫行走时，出现剪刀步态。鸭步见于肌营养不良症，因骨盆带肌无力，走路左右摇摆。

46. 答案：C

解析：言语功能的完成虽与两大脑半球有关，其中起主要作用是某些皮层区。运动性失语病变位于主侧或优势半球（善于用右手者为左半球，用左手者为右半球）的额下回后部。当主侧第一、二颞回后部有病变，引起感觉性失语。主侧角回病变产生失读症。

47. 答案：C

解析：浅感觉第二级神经元的纤维在脊髓侧索组成脊髓丘脑束的排列是以骶、腰、胸、颈的次序由外向内。

48. 答案：C

解析：人体的运动功能位置在前中央回的排列如倒立的人，下肢在上部，头面在下部。

49. 答案：A

50. 答案：C

解析：踝反射是由 S1~S2 节段的神经支配的。

51. 答案：E

解析：阿托品药物过量可引起瞳孔散大。

52. 答案：A

解析：锥体束与运动传导有关；内侧纵束与眼球水平性同向运动有关；外侧丘系与听觉冲动传导有关；脊髓丘脑束与浅感觉传导有关。

53. 答案：C

解析：下骶髓病变时无肢体瘫痪及锥体束征。

54. 答案：D

55. 答案：E

56. 答案：B

57. 答案：D

58. 答案：B

59. 答案：C

60. 答案：D

61. 答案：A

62. 答案：D

解析：Ph' 染色体阳性是 CML 典型染色体改变。

63. 答案：B

解析：脾功能亢进多有脾大症状，但脾大程度与脾功能亢进程度并非平行。

64. 答案：A

解析：过敏性紫癜最常见的类型是单纯型。

65. 答案：C

66. 答案：A

67. 答案：C

解析：脾亢切脾治疗的指征：脾大显著，压迫症状明显；严重的溶血性贫血；严重的血小板减少和出血症状；粒细胞极度减少而致反复感染。

68. 答案：D

解析：糖尿病肾病为病程在 10 年以上的 1 型糖尿病患者的主要死亡原因。

69. 答案：C

解析：糖尿病酮症酸中毒时酮体中含有丙酮，丙酮有烂苹果味，所以呼气有苹果味为糖尿病酮症酸中毒的特征性表现，余均不是。

70. 答案：B

解析：双胍类降糖药的副作用。

71. 答案：C

解析：消化道症状是慢性肾功能不全最早最常见的症状，早期表现为食欲缺乏，厌食，继之出现恶心，呕吐，腹泻等；其与尿素在胃肠道内经尿素酶作用分解产生氨、胃肠道多肽激素代谢异常等因素有关。

72. 答案：C

解析：肾性贫血有多种因素参与，但主要原因是肾衰竭患者体内 EPO 产生绝对或相对减少。

73. 答案：B

解析：心力衰竭是尿毒症患者最常见的死亡原因。随着肾功能不断恶化，心衰的患病率明显增加，至尿毒症期可达 65%~70%。

74. 答案：C

75. 答案：C

解析：治疗无效或仍再发的患者可采用低剂量抑菌疗法；而无症状型菌尿应根据不同人群选择不同治疗方案。

76. 答案：C

77. 答案：D

78. 答案：E

解析：血红蛋白尿主要见于严重的血管内凝血，如溶血性疾病，阵发性血红蛋白尿，蚕豆病，血型不合的输血反应。

79. 答案：B

80. 答案：D

81. 答案：E

解析：肾活检适应证：原发性肾脏病急性肾炎综合征，原发性肾病综合征，无症状性血尿，无症状性蛋白尿，继发性或遗传性肾脏病，肾小球肾炎导致的迅速发展的肾衰竭，移植肾。肾活检的禁忌证：明显出血倾向重度高血压，精神病或不配合操作，孤立肾，小肾。

82. 答案：C

83. 答案：D

解析：肾病综合征并发症为：感染、血栓、栓塞、急性肾衰竭、蛋白质及脂肪代谢紊乱。

84. 答案：D

85. 答案：E

86. 答案：C

解析：尿结核菌培养阳性率低，故阴性不排除泌尿系结核。

87. 答案：B

88. 答案：C

解析：鹅口疮是口腔黏膜白色念珠菌感染，见于小儿和抵抗力低的人，狼疮患者可在激素和免疫抑制剂治疗后出现继发感染。

89. 答案：D

解析：弥漫性肺泡内出血是 SLE 严重的肺部病变，死亡率高，需要激素冲击治疗。

90. 答案：A

解析：早期症状是结核灶侵犯集合系统引起的炎症表现。

91. 答案：D

解析：结核性肾积脓，对侧肾功能良好，应该在抗结核的基础上行肾切除。

92. 答案：D

解析：尿道口和包皮处有其他抗酸杆菌存在；肾自截的情况下尿结核杆菌培养可能阴性；患者无论是男女，原发病灶最常见的是肺。

93. 答案：C

94. 答案：D

95. 答案：C

解析：菌痢病理改变主要病变部位在乙状结肠和直肠，病变通常局限于固有层，肠黏膜穿孔少见。急性期

肠黏膜基本病变是渗出性炎症，慢性期可有肠壁增厚、息肉形成，中毒性菌痢肠道病变多轻微。

96. 答案：D

解析：急性菌痢临床类型包括：典型、非典型、重型和中毒型。中毒型按临床表现可分为：休克型、脑型和混合型。其中混合型最为凶险，病死率极高。

97. 答案：B

解析：典型间日疟患者的临床表现为寒战、高热、大汗，若反复发作可引起脾大。而黄疸见于出现溶血性尿毒综合征的疟疾患者。

98. 答案：E

99. 答案：C

100. 答案：C

解析：汞常温下即可蒸发，主要以蒸气形式经呼吸道侵入人体，完整皮肤基本不吸收，消化道吸收能力也较差。