

# 317 外科学

## 专业实践能力

(1-3 题共用题干)

患者，男性，65 岁。进食后突发下腹阵发性剧痛，烦躁 10 小时，伴恶心，无明显呕吐，肛门停止排气、排便。查体：体温 36.8℃，心率 95 次/分，血压 140/85mmHg。心肺(-)。腹膨隆，下腹部膨隆明显，全腹均有压痛，反跳痛不明显。下腹部似可扪及一包块，肠鸣音稍活跃。腹部 X 线平片：下腹部有肿块影。既往有类似发作病史，但排气、排便后好转。

问题 1: 该患者可能的临床诊断是

- A. 小肠扭转
- B. 结肠癌
- C. 结肠息肉
- D. 肠套叠
- E. 急性阑尾炎
- F. 乙状结肠扭转

问题 2: 进一步的主要处理是

- A. 查尿常规
- B. 急测血电解质
- C. 胃管抽吸
- D. 禁食
- E. 给予抑酸药
- F. 纤维结肠镜检查
- G. 钡灌肠检查
- H. 肝、肾功能检查

问题 3: 治疗方式

- A. 非手术治疗
- B. 急诊剖腹或腹腔镜探查
- C. 肠切除肠吻合
- D. 结肠癌根治术
- E. 短路手术
- F. 肠造口

(4-7 题共用题干) 患者，女性，52 岁。1 个月前出现进食后腹胀，伴腰酸、乏力，无发热，反酸、嗝气，无腹痛，自发病以来体重下降 7kg。查体：腹部可扪及直径约 15cm 质硬肿物，边界不清，活动度差，无压痛。

问题 4: 为明确诊断，首选的辅助检查为

- A. 胸部 X 线片
- B. 腹部立位 X 线平片
- C. 腹部 B 超
- D. 腹部 CT
- E. 上消化道造影
- F. 结肠镜检查

G. 腹腔动脉造影

提示：患者腹部 CT 结果如图 1 所示（患者曾于 1 年前接受左肾切除术）。

问题 5：首先考虑的诊断是

- A. 肠系膜肿物
- B. 大网膜肿物
- C. 小肠肿物
- D. 乙状结肠肿物
- E. 腹膜后肿物
- F. 腹腔脓肿
- G. 脾肿物

提示：患者接受剖腹探查手术，术中发现肿物位于腹膜后，完整切除，大体标本见图 2。

问题 6：患者最可能的诊断为

- A. 恶性淋巴瘤
- B. 纤维肉瘤
- C. 脂肪肉瘤
- D. 畸胎瘤
- E. 血管瘤
- F. 黏液瘤
- G. 神经鞘瘤

问题 7：术后病理证实为腹膜后脂肪肉瘤，其来源为

- A. 间叶组织
- B. 神经组织
- C. 泌尿生殖脊残余
- D. 胚胎残余组织
- E. 上皮组织
- F. 无法分类

（8-14 题共用题干）

患者，男性，40 岁。饱餐后突发中上腹剧痛，呈撕裂样，迅速波及全腹 10 小时来诊。既往有高血压病 15 年，血压控制不理想。患“胃病”2 年，未规律诊治。查体：急性病容，腹肌强直，肠鸣音未闻及，WBC  $11 \times 10^9/L$ 。

问题 8：该患者最可能的诊断是

- A. 急性胃肠炎
- B. 胃、十二指肠溃疡穿孔
- C. 腹主动脉瘤
- D. 急性胰腺炎
- E. 贲门黏膜撕裂症
- F. 胆道蛔虫症

问题 9：最有诊断意义的检查为

- A. 腹部 BUS
- B. 胸腹部 CT
- C. 立位腹部 X 线平片
- D. 胸腹部 MRI
- E. 急诊胃镜

F. 血常规、生化检查

问题 10: 目前最适合的处置方式为

- A. 胃肠减压
- B. 抑酸抗炎
- C. 单纯穿孔修补术
- D. 胃大部切除术
- E. 高选择性迷走神经切断术
- F. 胃空肠吻合术

提示: 若患者为空腹发病, 腹膜炎症状轻微。

问题 11: 则最适宜的处置方式为

- A. 禁食、水, 胃肠减压
- B. 抑酸抗炎
- C. 单纯病灶修补术
- D. 胃大部切除术
- E. 高选择性迷走神经切断术
- F. 迷走神经切断术

问题 12: 则最可能的诊断为

- A. 胃肠吻合口破裂
- B. 十二指肠残端破裂
- C. 碱性反流性胃炎
- D. 重症胰腺炎
- E. 术中损伤胆道
- F. 输入襻梗阻

问题 13: 造成上述现象的原因可能为

- A. 吻合口缝线脱落
- B. 缝线过紧, 黏膜坏死
- C. 溃疡切除不够, 形成穿孔
- D. 输入襻梗阻, 十二指肠腔内压力过高
- E. 术中损伤胆道系统
- F. 输出襻梗阻, 十二指肠腔内压力过高

提示: 如患者行胃大部切除术后 10 年, 出现上腹隐痛, 食欲缺乏, 4 个月体重减轻 10kg, 粪便隐血试验阳性。

问题 14: 考虑诊断为

- A. 慢性胃炎
- B. 碱性反流性胃炎
- C. 残胃癌
- D. 胃溃疡
- E. 胃憩室炎
- F. 十二指肠溃疡

(15- 17 题共用题干)

患者, 男性, 43 岁。右上腹持续性胀痛伴低热、食欲差、消瘦 2 个月入院。提示: 查体: 体温 38.6℃, 神志清楚, 精神状态佳; 皮肤、巩膜轻度黄染; 腹平坦, 无蜘蛛痣, 右上腹压痛, 肝肋下 2cm 触及。

问题 15: 需要鉴别的疾病包括

- A. 肝脓肿
- B. 继发性肝癌
- C. 胆管结石
- D. 胆囊癌
- E. 慢性胆囊炎
- F. 胰头癌

提示：入院后检查脾未触及，乙型肝炎表面抗原阳性，AFP 450 μg/L。Tc-吡哆醛-5-甲基色氨酸扫描阳性。

问题 16：与继发性肝癌鉴别的重要依据有

- A. 乙型肝炎表面抗原阳性
- B. 血 AFP 升高
- C. 肝大
- D. 黄疸
- E. 99mTc-PMT 扫描阳性
- F. 脾无肿大

提示：CT 提示右肝肿瘤 4cm，胃镜检查有食管静脉曲张。体检移动性浊音阳性，TBIL 119mmol/L。

问题 17：此患者适合的治疗有

- A. 右半肝切除
- B. RFA 治疗
- C. 肿瘤局部切除
- D. 注射无水乙醇
- E. 索拉非尼治疗
- F. 脾切除+门奇断流术
- G. 胆总管探查“T”形管引流术

(18-20 题共用题干)患者，女性，43 岁。右上腹反复疼痛 15 年，因皮肤、巩膜黄染 4 天人院。既往有胆石症病史。查体：体温 39.6℃，心率 98 次/分，呼吸 24 次/分，血压 124/90mmHg，皮肤、巩膜轻度黄染，腹部略有膨隆，腹软，上腹部有压痛，Murphy 征阳性。

问题 18：患者就诊时应紧急检查的项目有

- A. 腹部 X 线平片
- B. B 超
- C. CT
- D. 12 导联心电图
- E. 胃肠道钡剂造影
- F. 血清淀粉酶
- G. 尿淀粉酶

提示：B 超示胆囊内可见大小不等强回声光团，后方伴声影，胆囊壁厚 0.8cm；胆总管下段可见一直径约 1.0cm 的强回声光团，伴声影。血、尿淀粉酶均明显升高。

问题 19：诊断考虑的疾病为

- A. 胆囊炎
- B. 胆石症
- C. 急性胆管炎
- D. 急性胰腺炎
- E. 细菌性肝脓肿
- F. 蛔虫病

提示：入院第 4 天患者出现寒战伴有腹痛加重。查体：体温 40.2℃，心率 145 次/分，血压 60/40mmHg；神志不清，精神状态差，嗜睡。

问题 20：目前该患者最可能是

- A. 消化性溃疡穿孔
- B. 急性胰腺炎
- C. 胆囊炎
- D. 原发性腹膜炎
- E. 急性梗阻性化脓性胆管炎

(21 - 23 题共用题干)患者，女性，54 岁。因巩膜发黄、尿色加深逐渐加重 1 个月入院。有乙型肝炎病史 25 年。提示：B 超检查提示肝内外胆管扩张、胆囊肿大。

问题 21：为了下一步进行定位诊断，可检查的项目包括

- A. 腹部 X 线平片
- B. CT
- C. 磁共振胆道成像
- D. 经皮经肝胆道造影
- E. 经内镜逆行性胰胆管造影
- F. 常规 X 线胃肠钡餐
- G. 口服胆囊造影
- H. 腹部透视

提示：入院后巩膜中度黄染，大便呈灰白色。

问题 22：未明确诊断，进一步检查包括

- A. CA19-9 和 CEA
- B. 血清胆红素
- C. 血清淀粉酶
- D. 血清 AFP
- E. 血胰岛素
- F. 粪便常规加隐血试验

提示：皮肤瘙痒，体温正常。查体：肝肋缘下 2cm，右肋下触及椭圆形质软肿物。问题 23：该患者最可能的诊断是

- A. 急性胆管炎
- B. 急性梗阻性化脓性胆管炎
- C. 胆道蛔虫
- D. 胆总管结石
- E. 胆管癌
- F. 急性胆囊炎
- G. 原发性肝癌

(24- 29 题共用题干)

患者，男性，56 岁，农民。左下肢青筋凸出 30 多年，长期站立后感左下肢酸痛不适及肿胀。近 4 年来左小腿皮肤瘙痒、颜色发黑。左下肢浅静脉迂曲，以小腿内侧为主伴色素沉着，左足背动脉可扪及搏动。右下肢无异常。

问题 24：该患者需要考虑的诊断是

- A. 原发性左下肢静脉瓣膜功能不全

- B. 左下肢动脉硬化闭塞症
- C. 左下肢血栓闭塞性脉管炎
- D. 左下肢单纯性静脉曲张
- E. 左下肢深静脉血栓形成后综合征
- F. 左下肢动静脉瘘

问题 25: 为明确诊断, 可做的检查有

- A. Perthes 试验
- B. Trendelenburg 试验
- C. Pratt 试验
- D. 动脉造影
- E. 多普勒超声
- F. 节段性动脉测压
- G. 静脉造影

提示: Trendelenburg 试验(+), Perthes 试验: 深静脉通畅。多普勒超声: 左侧大隐静脉及其属支静脉曲张, 左侧隐股静脉瓣查见反流, 左小腿查见交通静脉反流; 深静脉通畅, 未查见反流。ECG, 胸部 X 线片, 肝、肾功能, 血常规, 凝血机制无异常。

问题 26: 对该患者的诊断是

- A. 原发性左下肢静脉瓣膜功能不全
- B. 左下肢动脉硬化闭塞症
- C. 左下肢血栓闭塞性脉管炎
- D. 左下肢单纯性静脉曲张
- E. 左下肢深静脉血栓形成后综合征
- F. 左下肢动静脉瘘

问题 27: 该患者病情进展后, 可能出现的常见并发症有

- A. 血栓性浅静脉炎
- B. 肢端坏死
- C. 足掌穿透性溃疡
- D. 足靴区溃疡
- E. 足趾端溃疡
- F. 曲张静脉破裂出血

问题 28: 该患者在左足靴区容易发生溃疡的原因是

- A. 该区皮肤及皮下组织很薄
- B. 该区动脉供血不足
- C. 该区深静脉血重力最大, 淤血最重, 常造成缺氧
- D. 该区皮肤免疫力差
- E. 该区有恒定的交通静脉, 易发生瓣膜关闭不全。
- F. 该区神经分布少

问题 29: 对该患者拟行手术治疗, 应包括

- A. 高位结扎大隐静脉、并剥脱其主干
- B. 股静脉瓣膜修复术
- C. 带瓣静脉段移植术
- D. 剥脱曲张的浅静脉
- E. 结扎功能不全的交通静脉

F. 半腱肌-股二头肌腱襻膈静脉瓣膜代替术

(30-32 题共用题干)患者, 男性, 42 岁。4 个月以来巩膜、皮肤黄染, 伴恶心、腹胀、食欲缺乏, 嗜睡 1 天。发现乙型肝炎表面抗原阳性 17 年。

问题 30: 患者应进行下一步检查, 除了

- A. ERCP
- B. 腹部 CT
- C. 凝血分析
- D. 生化全项
- E. 甲胎蛋白
- F. 粪便常规+隐血试验

提示: 患者入院查体: 全身黄染, 腹部膨隆, 移动性浊音(+), 肝右肋触及 2cm, 质硬伴压痛。辅助检查: ALT 320U/L, TBil 298  $\mu\text{mol/L}$ , ALB 30g/L, TT 24 秒, AF-P 120ng/ml。

问题 31: 目前可以基本排除的疾病是

- A. 急性肝炎
- B. 慢性肝炎活动
- C. 肝炎后肝硬化
- D. 原发性肝癌
- E. 胆道梗阻
- F. 肝性脑病

问题 32: 不属于患者嗜睡原因的是

- A. 氨可以干扰脑细胞三羧酸循环
- B. 氨可以直接干扰神经的电活动
- C. 氨可上调星形胶质细胞 BZ 受体表达
- D. 假性神经递质可以取代正常递质
- E. 氨增加脑对抑制性氨基酸的摄取
- F. 氨可以导致脑水肿

(33-35 题共用题干)患者, 女性, 30 岁。今日突发寒战、高热伴右上腹胀痛入院。提示: 体检: 体温 31.8C, 呈弛张热型, 右上腹压痛伴肌紧张。

问题 33: 急诊医生为明确诊断需要进行检查的项目有

- A. 血常规
- B. 血型
- C. 上消化道造影
- D. 动脉血气分析
- E. CT
- F. 胸部 X 线片
- G. 腹部超声

提示: 血常规: WBC $2.3 \times 10^9/L$ , NO. 90, 明显核左移。胸透提示右膈抬高。

问题 34: 最可能的诊断是

- A. 急性胆囊炎
- B. 急性胆管炎
- C. 原发性肝癌
- D. 肝脓肿
- E. 消化性溃疡

F. 机械性肠梗阻

提示: B 超示肝内可见多个液性暗区, 多为 A. 0~B. 0cm。

问题 35: 下一步应采取的治疗措施有

- A. 肝叶切除术
- B. 在 B 超引导下穿刺
- C. 使用抗生素
- D. 输液
- E. 吸氧
- F. 输血

(36- 38 题共用题干) 患者, 男性, 28 岁。便后纸上带血近 7 年, 间断便后滴鲜血, 加重 5 天。排便时有肿物脱出, 可自行还纳, 无排便疼痛, 有时伴肛门瘙痒。问题 36: 此患者最可能的诊断是

- A. I 度内痔
- B. II 度内痔
- C. III 度内痔
- D. IV 度内痔
- E. 外痔
- F. 混合痔
- G. 血栓性外痔
- H. 环状痔
- I. 直肠脱垂

问题 37: 针对此患者, 下列治疗方法中不合适的有

- A. 立即手术治疗
- B. 少食辛、辣食物, 多摄入纤维素
- C. 温水坐浴, 保持肛门洁净
- D. 应用肛门直肠栓剂
- E. 应用乳膏剂
- F. 活动性出血可用硬化药治疗
- G. 保持粪便通畅
- H. 应用中药疗法

问题 38: 非手术治疗后症状无好转, 下一步处理不宜采用的是

- A. 立即手术治疗
- B. 继续非手术治疗, 观察
- C. 行纤维结肠镜检查
- D. 询问有无大便习惯改变
- E. 询问有无家族病史
- F. 询问有无体重减轻

(39- 40 题共用题干) 患者, 男性, 46 岁。腹胀、食欲缺乏、乏力 3 个月, 5 小时前突然呕吐鲜血约 800ml, 伴心悸、大汗, 面色苍白。查体: 血压 95/5mmHg, 脉搏 120 次/分, 巩膜黄染, 肝、脾肋下未及, 移动性浊音 (+)。化验 ALB 27g/L, TBiL 82.6μmol/L, HBsAg (+)。

问题 39: 引起患者上消化道出血最可能的原因是

- A. 消化性溃疡出血
- B. 胃癌出血
- C. 胆道结石合并胆道出血



- D. 食管胃底静脉曲张破裂出血
- E. Mallari - Weiss 综合征
- F. 应激性溃疡

问题 40: 适宜的紧急处理和措施包括

- A. 局部喷洒止血药
- B. 应用抑酸药物
- C. 放置三腔二囊管压迫止血
- D. 剖腹探查止血
- E. 快速静脉补液治疗
- F. 必要时输血治疗

(41-43 题共用题干)

患者, 男性, 30 岁。酗酒、饱餐后 2 小时突发持续性上腹剧痛, 很快扩散至全腹, 查体: 腹部有压痛, 肌紧张, 肝浊音界消失, X 线检查见膈下新月形气体。问题 41: 该患者诊断与鉴别诊断应考虑

- A. 胃溃疡急性穿孔
- B. 胃癌穿孔
- C. 十二指肠溃疡急性穿孔
- D. 阑尾炎穿孔
- E. 胆囊炎穿孔
- F. 急性重症胰腺炎

问题 42: 进一步的处理是

- A. 输血补液
- B. 急测血电解质
- C. 胃肠减压
- D. 禁食
- E. 给予止血药
- F. 监测生命体征
- G. 胰腺 CT
- H. 肝肾功能
- I. 急诊胃镜检查

问题 43: 可能的手术方式为

- A. 剖腹或腹腔镜探查
- B. 修补穿孔或胃大部切除术, 胃穿孔时应取活检
- C. 冲洗腹腔
- D. 不需要放置腹腔引流
- E. 阑尾切除术
- F. 胆囊切除术
- G. 胰床引流、坏死组织清除术

(44-46 题共用题干) 患者, 男性, 56 岁。有慢性肝炎病史 23 年, 近期肝区持续胀痛。

问题 44: 为发现早期肝癌, 患者接受的定期检查中至少应包括的项目是

- A. AFP 化验检查
- B. 腹部 B 超
- C. 腹部 CT
- D. 核素扫描

E. 肝动脉造影

F. 胃镜检查

提示 :经 B 超、CT 检查,证实肝右前叶有 3cm×3cm 占位性病变。

问题 45:有助于明确诊断的化验检查包括

A. HBsAg

B. WBC

C. ESR

D. AFP

E. BUN

F. CEA

问题 46:如果准备安排患者接受手术治疗,手术的禁忌证包括

A. 大量腹水

B. 轻度黄疸

C. 1 个月前曾发生心肌梗死

D. 胸部 X 线片发现肺部多发性占位

E. 生化检查 Alb 30g/L

F. 肝功能检查 ALT 88U/L、AST 92U/L

(47-52 题共用题干)患者,男性,40 岁。15 天前因右股骨干骨折行内固定术,今日出现左下肢肿胀。

问题 47:首先考虑的诊断为

A. 下肢动脉栓塞

B. 下肢动脉硬化闭塞症

C. 血栓闭塞性脉管炎

D. 下肢深静脉血栓形成

E. 右侧心力衰竭

F. 肾衰竭

G. 雷诺综合征

问题 48:临床常用的有助于确诊和了解病变范围的检查有

A. 血常规

B. 凝血功能

C. 超声多普勒

D. 下肢静脉顺行造影

E. CT

F. MRI

G. 放射性核素检查

H. 动脉造影

提示 :该患者经 B 超检查明确诊断为下肢深静脉血栓。

问题 49:该疾病最严重的并发症为

A. 下肢溃疡

B. 肺栓塞

C. 下肢浅静脉曲张

D. 伴动脉痉挛,肢体缺血

E. 腔静脉阻塞

F. 患肢坏死

G. 肾衰竭

问题 50: 为预防肺栓塞的发生, 最为有效的处理措施是

- A. 溶栓
- B. 抗凝
- C. 祛聚
- D. 下腔静脉滤器置入
- E. 吸氧
- F. 严格卧床休息
- G. 穿弹力袜或用弹力绷带

问题 51: 该患者在治疗过程中应

- A. 下床活动, 促进静脉回流
- B. 卧床休息
- C. 取头低足高位
- D. 保持大、小便通畅
- E. 注意监测凝血酶原时间
- F. 起床活动时穿弹力袜
- G. 适当应用利尿药

问题 52: 可以用于治疗该疾病的药物有

- A. 肝素
- B. 华法林
- C. 尿激酶
- D. 低分子右旋糖酐
- E. 阿司匹林
- F. 丹参
- G. 双嘧达莫

(53-55 题共用题干)

患者, 男性, 49 岁, 农民。反复黑粪、呕吐咖啡色内容物 2 个月来诊。发作时无腹痛, 伴有食欲缺乏、消瘦、乏力。既往体健, 无上腹疼痛史, 否认寄生虫病史。查体: 体温 36.1℃, 心率 110 次/分, 呼吸 20 次/分, 血压 90/50mmHg; 皮肤、巩膜无黄染, 腹部胀满, 无脐周静脉曲张、蜘蛛痣, 肠鸣音减少, 全腹未触及肿块, 腹部无压痛, 肝、脾未触及。血 Hb 54g/L, WBCF.  $3 \times 10^9/L$ , 粪便隐血试验 (+)。问题 53: 初步诊断可能为

- A. 胃癌
- B. 胃、十二指肠溃疡
- C. 胃间质瘤
- D. 门脉高压症、食管胃底静脉曲张破裂
- E. 肝血管瘤
- F. 大肠癌

问题 54: 进一步的处理是

- A. 输血、补液
- B. 胃镜检查
- C. 查 PT、APTT
- D. MRCP
- E. 腹部立位 X 线平片

- F. 腹腔穿刺
- G. 腹部 CT
- H. 肿瘤标志物
- I. 纤维结肠镜
- J. 血淀粉酶、脂肪酶

问题 55: 胃镜提示胃底部巨大溃疡, 则手术方式可能有

- A. 剖腹探查术
- B. 全胃切除术
- C. 近端胃切除术
- D. 远端胃切除术
- E. 胃癌根治术
- F. 贲门周围血管离断术
- G. Roux-en-Y 吻合术
- H. 经颈内静脉肝内门体分流术

(56- 61 题共用题干)

患者, 女性, 42 岁。颈粗 3 年, 无明显伴随症状。曾于医院检查示: TgAb、TPOAb 增高, 未做特殊处理。1 天前出现右颈部疼痛, 伴低热、心悸。查体: 心率 100 次/分, 双侧甲状腺 I 度肿大, 质硬, 表面不光滑, 甲状腺右叶压痛明显。2 周前有上呼吸道感染史。

问题 56: 目前最可能的诊断是

- A. 急性化脓性甲状腺炎
- B. 慢性淋巴性甲状腺炎
- C. 结节性甲状腺肿
- D. 亚急性甲状腺炎
- E. 甲状腺癌
- F. 慢性侵袭性纤维性甲状腺炎
- G. 木样甲状腺肿
- H. 甲状腺恶性淋巴瘤

问题 57: 经过上述治疗, 患者症状明显缓解。近 2 个月甲状腺迅速长大, 伴呼吸困难。查体: 双侧甲状腺 III 度, 质硬, 表面欠光滑。根据上述情况, 目前最可能的诊断是

- A. 慢性淋巴细胞性甲状腺炎合并甲状腺结核
- B. 慢性淋巴细胞性甲状腺炎合并甲状腺功能亢进
- C. 慢性淋巴细胞性甲状腺炎合并甲状腺功能减退
- D. 慢性淋巴细胞性甲状腺炎恶变
- E. 转移性甲状腺癌
- F. 慢性淋巴细胞性甲状腺炎合并化脓性感染

问题 58: 下列检查结果支持诊断的是

- A. 甲状腺摄取  $^{131}\text{I}$  率显著升高
- B. 甲状腺摄取  $^{131}\text{I}$  率显著降低
- C. 彩超示甲状腺腺体血流丰富
- D. 彩超示甲状腺右叶杂乱回声团块
- E. 血 T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub> 轻度升高
- F. 红细胞沉降率升高
- G. TRAb 升高

问题 59: 针吸细胞学检查未发现癌细胞, 查见大量淋巴细胞, 查见多核巨噬细胞。下列治疗中正确的是

- A. 大剂量头孢 3 代药物
- B. 糖皮质类固醇激素
- C. 抗炎镇痛类药
- D. 手术治疗
- E. 大剂量奎诺酮类药物
- F. 甲状腺功能减退时可加用甲状腺干制剂治疗

问题 60: 该病的主要病因包括

- A. 细菌感染
- B. 神经精神因素
- C. 自身免疫性因素
- D. 环境因素
- E. 药物反应
- F. 下丘脑激素分泌紊乱
- G. 病毒感染

问题 61: 该患者目前检查示 T4 及 FT4 均升高, 出现这种情况的可能原因是

- A. 炎症破坏滤泡细胞
- B. 长效甲状腺刺激激素刺激
- C. 甲状腺结节自主性分泌
- D. TSH 增高刺激甲状腺分泌甲状腺素
- E. 长期使用某种含碘的药物
- F. 异位甲状腺分泌甲状腺素

(62-66 题共用题干)

患者, 女性, 72 岁。1 年来无明显诱因出现大便时滴鲜血, 外院考虑“痔”, 给予非手术治疗后好转。此后便血间断出现, 有时混有黏液, 无排便疼痛。3 天前患者排大量鲜血便, 并出现头晕, 无意识丧失。体重半年来下降 10kg。查体: 心率 105 次/分, 血压 100/60mmHg, 面色稍苍白, 腹部平坦, 无明显压痛, 血红蛋白 87g/L。

问题 62: 此时应当进行的处理为

- A. 开放静脉, 补液, 输血
- B. 注射止血药物
- C. 立即手术治疗
- D. 做急诊胃镜
- E. 做肛门镜检查
- F. 做急诊 CT 检查

问题 63: 目前考虑的诊断有

- A. 上消化道出血
- B. 下消化道出血
- C. 胆道出血
- D. 感染性休克
- E. 轻度贫血
- F. 中度贫血

问题 64: 询问的病史中, 对鉴别诊断没有意义的是

- A. 患者近 1 年来有无大便习惯改变
- B. 患者有无反酸、胃灼热
- C. 患者有无大便干、排便费力
- D. 患者有无排便不尽感
- E. 患者有无大便变细、压痕
- F. 患者婚育史
- G. 患者便血是否和大便混合
- H. 患者家族史

问题 65: 患者经非手术治疗后生命体征平稳, 可考虑进一步的检查有

- A. 腹部 CT
- B. 腹部 B 超
- C. 盆腔 CT
- D. 腹腔动脉造影
- E. 腹部立位 X 线平片
- F. 纤维结肠镜

问题 66: 在观察中需要紧急手术的指征是

- A. 出现腹痛
- B. 肠鸣音活跃
- C. 持续便血, 肠镜明确病变但不能控制出血
- D. 合并肠梗阻
- E. 高龄
- F. 血清 CEA 高于正常
- G. 凝血功能差