

317 外科学

专业知识

1. 混合性肝癌占原发性肝癌病理类型的比例是
 - A. 3%
 - B. 10%
 - C. 60%
 - D. 80%
 - E. 90%
2. 肠梗阻的全身变化说法错误的是
 - A. 低位性肠梗阻易产生碱中毒
 - B. 蛋白质分解增多，肝合成蛋白的能力下降
 - C. 血容量减少
 - D. 腹式呼吸减弱
 - E. 可以发生休克
3. 典型的胆囊动脉多数来源于
 - A. 胃右动脉
 - B. 肝右动脉
 - C. 肝总动脉
 - D. 胃十二指肠动脉
 - E. 副肝右动脉
4. 急性肠梗阻治疗中，最首要的处理措施是
 - A. 给予生长抑素
 - B. 胃肠减压
 - C. 纠正水、电解质紊乱和酸碱失衡
 - D. 抗感染
 - E. 尽快手术
5. 有关腹腔镜气腹早期并发症下列不正确的是
 - A. 心律失常
 - B. 气胸或纵隔气肿
 - C. 气体栓塞
 - D. 脑水肿
 - E. 高碳酸血症
6. 门静脉高压症的最早临床表现为
 - A. 呕血或黑粪
 - B. 脾大、脾功能亢进
 - C. 肝功能损害
 - D. 腹水
 - E. 贫血
7. 下列有关良性十二指肠淤滞症的阐述不正确的是

- A. 多见于体重偏轻及高分解状态的患者
 - B. 反复发作性上腹部饱胀、腹痛、呃逆、恶心及呕吐
 - C. 大多数患者在发病时取仰卧或胸膝位可缓解症状
 - D. 首选诊断方法是 X 线钡餐
 - E. 也称为肠系膜下动脉综合征
8. 结肠充气试验阳性提示
- A. 证实阑尾炎的诊断
 - B. 阑尾位于腰大肌前方
 - C. 阑尾位于闭孔内肌附近
 - D. 阑尾位置偏向内侧
 - E. 阑尾位置偏向外侧
9. 有门静脉高压症和上消化道出血的患者，出血的原因并非一定是曲张的静脉，可能由于溃疡或者门静脉高压性胃病而引起出血的患者约占
- A. 20%
 - B. 25%
 - C. 30%
 - D. 40%
 - E. 15%
10. Crohn 病的叙述中不恰当的是
- A. 具有潜在恶性变
 - B. 常合并肛周肛管感染
 - C. 病理改变为累及全层的肉芽肿性炎症病变
 - D. 常合并肠梗阻、便血
 - E. X 线钡灌肠可见狭窄部线状征
11. 乳腺癌患者，以下指标提示预后较差的是
- A. 雌激素受体阳性
 - B. P53 阳性
 - C. Her -2 阳性
 - D. 腋窝淋巴结阴性
 - E. 孕激素受体阳性
12. 乳腺癌患者经新辅助化疗，肿块缩小至 2cm，行手术治疗后还应该进行的治疗是
- A. 放射治疗
 - B. 化学药物治疗和内分泌治疗
 - C. 传统中医药治疗
 - D. 生物治疗
 - E. 放射治疗和化学药物治疗
13. 机械性肠梗阻发生腹痛的原因是
- A. 肠管肌暂时性迟缓状态
 - B. 腹腔内渗液的刺激
 - C. 肠腔内有积气积液
 - D. 肠段的缺血坏死
 - E. 梗阻部位以上强烈肠蠕动
14. 对放射性核素治疗效果最好的是

- A. 乳头状癌
 - B. 非霍奇金淋巴瘤
 - C. 髓样癌
 - D. 滤泡状癌
 - E. 未分化癌
15. 不考虑有绞窄性肠梗阻的是
- A. 扩张肠段呈阶梯性排列
 - B. 腹腔穿刺抽出血性液体
 - C. 腹胀不均匀，局部有隆起
 - D. 呕吐物、胃肠减压抽出液、肛门排出物为血性
 - E. 早期出现休克，治疗后改善不明显
16. 以下有关腹部闭合性损伤导致十二指肠损伤的叙述中，错误的是
- A. 十二指肠是腹膜后位器官，损伤发生比例很小
 - B. 损伤部位多在十二指肠第一、二部，其比例超过 75%
 - C. 抗休克和及时得当的手术处理是治疗的两大关键
 - D. 大多数十二指肠损伤可行单纯修补术
 - E. 浆膜切开血肿切除术适用于十二指肠壁内血肿非手术治疗不缓解者
17. 对于急性腹膜炎伴有休克的患者，宜采用的体位是
- A. 头低足高位
 - B. 半坐卧位
 - C. 中凹卧位
 - D. 去枕仰卧位
 - E. 左侧卧位
18. 胰腺癌最常见的病理类型为
- A. 腺泡细胞癌
 - B. 大嗜酸性粒细胞性癌
 - C. 纤毛细胞癌
 - D. 胰管腺癌
 - E. 多形性癌
19. 动脉栓塞时不应
- A. 镇静、镇痛
 - B. 用热水袋给患肢保温
 - C. 静脉滴注低分子右旋糖酐
 - D. 尽早行 Fogarty 导管取栓术
 - E. 使用解痉药
20. 结肠多源癌的发生概率为
- A. 1%以下
 - B. 2%~5%
 - C. 8%~ 10%
 - D. 12%~ 15%
 - E. 15%~ 20%
21. 下列各项诊断胰岛素瘤的方法中，效果不佳的是
- A. Whipple 三联征

- B. 血胰岛素测定
 - C. 术前 B 超检查
 - D. 选择性动脉造影
 - E. CT 磁共振成像
22. 有关急性化脓性腹膜炎的说法正确的是
- A. 原发性腹膜炎最常见的病原菌是大肠埃希菌
 - B. 考虑诊断原发性腹膜炎时，应早期剖腹探查
 - C. 立位腹部 X 线平片未显示膈下新月状游离气体时可基本排除器官穿孔
 - D. 坏疽性阑尾炎穿孔是引起继发性腹膜炎的常见病因
 - E. 外伤性肝破裂是急性化脓性腹膜炎最常见的病因
23. 不属于急性胆囊炎临床表现的是
- A. 非结石性急性胆囊炎常发生坏死、积脓或穿孔
 - B. 常在夜间或进脂肪餐后发作
 - C. 用手压于右上腹肋缘下，患者可突然吸气暂停
 - D. 可有右肩或右背部疼痛
 - E. 90%合并黄疸
24. 有关腹部闭合性损伤的说法正确的是
- A. 腹腔探查一定要重点突出，切不可全面检查而耽误抢救时间
 - B. 实质性器官损伤时一定可以抽出腹腔积液
 - C. 空腔器官破裂的突出表现是急性腹膜炎
 - D. 脾破裂时一定可以抽出腹腔不凝血
 - E. 肝破裂的死亡率最高
25. 高龄妇女乳腺癌的最佳诊断方法是
- A. B 超
 - B. 干板照相
 - C. 钼靶 X 线摄片
 - D. CT
 - E. 液晶涂减
26. 有关 ERCP 在胰腺癌中的应用错误的是
- A. 可显示主胰管狭窄、管壁僵硬、中断移位或不显影
 - B. 可经导管取胰液做细胞学检查
 - C. 胰管造影正常者可以基本排除胰腺癌
 - D. 对于深度黄疸者，可经内镜放置鼻胆管或内支架引流
 - E. 胰头癌未侵及主胰管时造影常无改变
27. 最能证明肠梗阻患者无绞窄发生的是
- A. 呕吐次数减少，内容物清亮.
 - B. 腹胀缓解
 - C. 休克经治疗后改善
 - D. 疼痛缓解
 - E. 腹腔穿刺液清亮
28. 结肠肝曲癌的切除范围是
- A. 切除距肿块上下缘各 5cm
 - B. 切除升结肠及横结肠各半

- C. 切除盲肠至右半横结肠及所属系膜和淋巴结
 - D. 切除回肠末端 20cm 至右半横结肠及所属系膜和淋巴结
 - E. 保留回盲动脉，切除升结肠及右半横结肠
29. 股管解剖不正确的是
- A. 股管是一个狭长的漏斗形间隙
 - B. 股管前界是腹股沟韧带
 - C. 内界是耻骨梳韧带
 - D. 大隐静脉在此穿过筛状板进入股静脉
 - E. 卵圆窝是股部深筋膜上的一个薄弱部分，覆有一层筛膜，称筛状板
30. 最常见的小肠良性肿瘤是
- A. 小肠平滑肌瘤
 - B. 小肠间质瘤
 - C. 小肠淋巴肉瘤
 - D. 小肠脂肪瘤
 - E. 小肠血管瘤
31. 下列手术方式中属于完全腹腔镜结直肠切除术的是
- A. Righthemicolecotomy
 - B. Transversecolonresection
 - C. Miles 手术
 - D. Lefthemicolecotomy
 - E. Pancolectomy
32. 直肠类癌行根治切除术时直径应大于
- A. 0. 6cm
 - B. 1. 5cm
 - C. 1. 8cm
 - D. 2. 0cm
 - E. 5. 0cm
33. 关于小儿阑尾炎的描述正确是
- A. 临床症状不明显.
 - B. 感染易局限
 - C. 需积极手术
 - D. 大网膜可以起到足够的保护作用
 - E. 典型的转移性右下腹疼痛
34. 急性阑尾炎的典型临床表现是
- A. 恶心、呕吐
 - B. 右下腹压痛、反跳痛
 - C. 脐周疼痛
 - D. 转移性右下腹痛
 - E. 血白细胞升高
35. 溃疡性结肠炎的手术适应证是
- A. 严重坏疽性脓皮病
 - B. 出现贫血
 - C. 反复脓血便

- D. 反复腹痛腹泻
 - E. 长期发热
36. 关于 Buerger 病的描述不正确的是
- A. 多好发于青壮年男性
 - B. DSA 是确诊本病必需的检查
 - C. 特征性临床表现有间歇性跛行、静息痛、肢体坏疽或溃疡
 - D. 多有吸烟史
 - E. 治疗原则主要以改善和增加患肢的血液循环为主
37. 急腹症患者腹腔穿刺抽出不凝血考虑为
- A. 急性化脓性腹膜炎
 - B. 膈下脓肿
 - C. 绞窄性肠梗阻
 - D. 消化性溃疡穿孔
 - E. 输尿管结石
38. 测定 Tg (血清甲状腺球蛋白)最大的意义是
- A. 区分良恶性甲状腺结节
 - B. 诊断 Hashimoto 甲状腺肿
 - C. 诊断 DeQuervain 甲状腺炎
 - D. 甲状腺功能亢进症手术或核素治疗后, 检测复发
 - E. 分化性甲状腺癌手术或核素治疗后, 监测复发
39. 下列无须全身大剂量使用抗生素的疾病是
- A. 颈淋巴结结核
 - B. 新生儿颈部皮下蜂窝织炎
 - C. 对口疮
 - D. 口底化脓性蜂窝织炎
 - E. 颈部脓肿
40. 急性阑尾炎时 Psoassign (+)提示阑尾的位置为
- A. 回肠前位
 - B. 回肠后位
 - C. 盆位
 - D. 盲肠后位
 - E. 盲肠外侧位
41. 下列征象应高度怀疑有绞窄性肠梗阻的是
- A. 呕吐呈反射性, 吐出物为食物或胃液
 - B. 腹部立位 X 线平片见大量气液平面
 - C. 腹腔穿刺抽出血性物
 - D. 血气分析示血氧分压降低
 - E. 血生化检查示严重的代谢性酸中毒
42. 下列解剖结构在急性胆囊炎的腹腔镜手术治疗中最重要的是
- A. Vater 壶腹
 - B. Oddi 括约肌
 - C. 肝固有动脉
 - D. 胆总管

E. Calot 三角

43. 一般认为直肠癌向下浸润距离不超过肿瘤边缘

A. 0.5cm

B. 2~5cm

C. 1~2cm

D. 5~6cm

E. >5cm

44. 以下假性胰腺囊肿不需要手术治疗的是

A. 囊肿直径 \geq 6cm

B. 多发囊肿

C. 囊肿形成的早期

D. 囊肿合并慢性胰腺炎及胰管狭窄

E. 囊肿引起持续性腹痛

45. 由小肠肿瘤引起的急性肠梗阻，其机制是

A. 肿瘤堵塞肠腔

B. 肿瘤缩窄肠腔

C. 肿瘤压迫引起血运障碍

D. 肿瘤引起肠粘连

E. 肠套叠

46. 大肠癌多发生于

A. 直肠和乙状结肠

B. 升结肠

C. 结肠脾曲

D. 结肠肝曲癌

E. 盲肠

47. 急性梗阻性化脓性胆管炎 (AOSC) 的主要病理改变是

A. 胆道黏膜坏死穿孔

B. 胆道完全梗阻化脓致胆道高压

C. 胆囊管阻塞胆囊内高压

D. 胆道不全梗阻致胆道高压

E. 胆道梗阻并发黏膜破坏

48. 对老年复发性腹股沟疝，最好的手术方法是

A. 内环修补法

B. 巴西尼法

C. 佛格逊法

D. 麦克凡 (McVay) 法

E. 无张力疝修补术

49. 以下不属于外伤性肝破裂出血治疗方法的是

A. 症状不明显，出血少的应观察

B. 绝对卧床

C. 出现出血征象时大量输血

D. 边输血，边手术

E. 控制出血后，立即处理肝损伤，尽快结束手术

50. 下列选项中是继发性腹膜炎主要病因的是
- A. 胃穿孔
 - B. 急性胆管炎
 - C. 急性阑尾炎穿孔
 - D. 十二指肠球部穿孔
 - E. 肝硬化腹水
51. 下列选项中关于乳腺淋巴回流途径描述不正确的是
- A. 一侧乳房淋巴液可引流到对侧
 - B. 乳房内侧淋巴液经肋间淋巴管流向胸骨旁淋巴结
 - C. 经胸大肌外侧缘淋巴管引流至腋窝. 淋巴结
 - D. 乳腺深部淋巴液可流入肝
 - E. 两侧胸骨旁淋巴结之间没有直接的淋巴交通
52. 下列选项中属于最常见腹外疝内容物的是
- A. 乙状结肠
 - B. 小肠
 - C. 胃
 - D. 大网膜
 - E. 腹膜
53. 最常见的小肠肿瘤是
- A. 小肠间质瘤
 - B. 神经内分泌肿瘤
 - C. 平滑肌肉瘤
 - D. 纤维瘤
 - E. 淋巴瘤
54. 关于胰腺癌的叙述不正确的是
- A. 多为胰头癌
 - B. 按组织类型, 以导管细胞癌最多
 - C. 广泛浸润周围组织、器官, 并较早经淋巴转移
 - D. 好发年龄为 20~30 岁
 - E. 该病早期诊断困难, 手术切除率低, 预后差
55. 下消化道出血采用积极的非手术治疗后, 出血可以暂时停止, 但常呈周期性复发, 间隔周期一般为
- A. 1~2 周
 - B. 2~3 周
 - C. 6~8 周
 - D. 8~9 周
 - E. 9~10 周
56. 第一例腹腔镜胆囊切除术由法国医生 Mouret 首先完成于
- A. 1984 年
 - B. 1987 年
 - C. 1989 年
 - D. 1990 年
 - E. 1991 年
57. 患者, 男性, 54 岁。查体: 行胃镜检查提示胃窦部可见一直径约 1.5cm 的溃疡。内镜取病理活检提示为

慢性炎症。经内科系统治疗半年无效，考虑手术治疗。首选的术式是

- A. 胃大部切除术
- B. 高选择性迷走神经切断术
- C. 全胃切除术
- D. 单纯溃疡底部贯穿缝扎术
- E. 胃空肠 Roux-en-Y 吻合术

58. 患者，女性，65 岁。3 个月前发现自己皮肤发黄，大便呈陶土色；1 个月前上述症状有所减轻，后又逐渐加重，并出现间断黑粪。超声提示胆囊增大。该患者可能为

- A. 胆囊癌
- B. 十二指肠乳头癌
- C. 胆管癌
- D. 胰体尾癌
- E. 胰岛素瘤

59. 患者，女性，52 岁。急性阑尾炎穿孔术后 1 周，自感腹部持续性胀痛，伴恶心、呕吐，数日未排气。查体：全腹膨隆，肠鸣音消失，腹部广泛轻压痛、反跳痛。腹部 X 线平片示肠管扩张明显，可见数个液平面。该患者初步诊断为

- A. 低位小肠梗阻
- B. 高位小肠梗阻
- C. 麻痹性肠梗阻
- D. 结肠梗阻
- E. 完全性小肠梗阻

60. 患者，女性，42 岁。因黑粪 3 天人院，胃镜检查发现：胃底黏膜下见一约 5cm x6cm 肿物，表面黏膜轻度糜烂，活检示黏膜慢性炎症。为明确诊断，需进一步检查的是

- A. 超声胃镜
- B. 腹部 X 线片
- C. 腹部 B 超
- D. X 线钡餐检查
- E. CEA

61. 患者，女性，35 岁。双乳胀痛 1 个月，查体发现左乳外上区域腺体增厚，钼靶提示左乳广泛针尖样钙化，考虑最可能的诊断为

- A. 乳腺癌
- B. 乳腺囊性增生病
- C. 乳腺纤维腺瘤
- D. 急性乳腺炎
- E. 导管内乳头状瘤

62. 患者，女性，51 岁。胃镜活检：中分化腺癌；腹部增强 CT：未见肝转移结节。手术探查发现幽门下淋巴结肿大，肿瘤已浸润至横结肠，较局限，其余未见异常。此患者应

- A. 胃癌灶切除术联合横结肠切除术
- B. 扩大胃癌根治术联合横结肠切除术
- C. 行胃大部切除术
- D. 行全胃切除术
- E. 内镜下黏膜切除术

63. 患者，男性，74 岁。排便次数增多、便中带血伴消瘦、乏力 1 年。查体：面色苍白，腹软，右下腹部可

触及一约 6cm x4cm 大小肿块，质硬伴压痛。该患者诊断可能为

- A. 克罗恩病
- B. 右半结肠癌
- C. 肠结核
- D. 阑尾周围脓肿
- E. 溃疡性结肠炎

64. 患者，女性，52 岁。发现右乳包块半年，伴皮肤红肿 1 个月。查体：右乳外侧和外上象限皮肤红肿、皮温增高，7 点到 9 点钟区域距乳头 3cm 处扪及一 4cmx3.5cmx2cm 的界限不清、质硬、活动差肿块，压之不适；右腋扪及 2cm 大、质硬、无压痛淋巴结。该患者的初步诊断是

- A. 乳腺囊性增生症
- B. 急性乳腺炎
- C. 乳腺纤维腺瘤
- D. 乳腺癌
- E. 导管内乳头状瘤

65. 患者，女性，60 岁。行肝左外叶切除术后 3 天，未置胃管，尚未排气，小便正常。自觉上腹部胀痛明显，呕吐物为含胆汁的暗绿色液体。查体：上腹膨隆，振水音阳性，肠鸣音减弱，该患者最可能是

- A. 胃瘫
- B. 急性胃扩张
- C. 麻痹性肠梗阻
- D. 胃扭转
- E. 幽门梗阻

66. 患者，男性，43 岁。近 3 个月反复牙龈出血，头晕、乏力、易疲，四肢皮下多处瘀斑，脾于左肋下 3cm 触及，轻触痛。查白细胞 $2.0 \times 10^9/L$ ，血红蛋白 75g/L，血小板 $18 \times 10^9/L$ ，HBsAg (+)。增生型骨髓象，最可能的原因是

- A. 再生障碍性贫血
- B. 溶血性贫血
- C. 特发性血小板减少性紫癜
- D. 白血病
- E. 门静脉高压症

67. 患者，男性，42 岁。因 4 个月来反复腹胀来诊，无寄生虫病史及输血史。查体：腹部膨隆，肝右肋下 3cm，脾左肋下 4cm，移动性浊音阳性。胃镜：可见食管胃底静脉重度曲张。B 超提示：肝后段下腔静脉缩窄。血肝炎标志物均为阴性。该患者最可能是

- A. 肝炎后肝硬化
- B. 血吸虫性肝硬化
- C. 巴德-吉亚利综合征
- D. 门静脉主干闭锁
- E. 肝静脉海绵样变

68. 患者，女性，40 岁。因进食油腻食物后 3 小时出现上腹部疼痛，向两侧腰部放射，10 小时后就诊。查体：体温 $37.6^{\circ}C$ ，血压 150/90mmHg，腹平软，中上腹偏左压痛，无反跳痛。血淀粉酶 600 苏氏单位，腹腔穿刺阴性。诊断急性胰腺炎。此时最适宜的措施是

- A. 禁食、胃肠减压、抗感染、补液
- B. 抗感染、补液、中医中药、抑肽酶
- C. 低脂半流、胃肠减压、抑肽酶

D. 低脂半流食、抗感染、补液、抑肽酶

E. 手术治疗

69. 患者，女性，25岁。发现右颈部肿块3个月，近期出现腰背疼痛。查体：右侧甲状腺扪及肿块4cm，质坚硬，表面不平。腰椎X线摄片显示：L2骨质破坏，拟诊甲状腺癌腰椎转移。甲状腺肿块切除冷冻切片显示：右甲状腺乳头状癌。最恰当的治疗方案是

A. 全甲状腺切除+L2病灶清除术

B. 右侧甲状腺切除+L2放射外照射

C. 全甲状腺切除+放射碘内照射

D. 右侧甲状腺切除+化学治疗

E. 右侧甲状腺切除+甲状腺干制剂

(70-72题共用题干)患者，男性，23岁。因车祸致下腹部外伤6小时。查体：全腹压痛、反跳痛、肌紧张；肝浊音界正常，肠鸣音消失。血WBC $19.3 \times 10^9/L$ ，N91%。考虑为腹腔器官破裂。70. 目前最正确的处理为

A. 静脉补液，严密观察病情变化

B. 立即行上消化道钡剂造影

C. 立即行剖腹探查

D. 行腹部超声

E. 行MRI检查

71. 探查发现患者为乙状结肠破裂，应选择的手术方式为

A. 肠横向缝合修补术

B. 肠纵向缝合修补术

C. 乙状结肠切除，降结肠造口术

D. 行腹腔引流

E. 乙状结肠一期切除吻合术

72. 如术中发现为胃、空肠、乙状结肠破裂，则处理顺序为

A. 胃、空肠、乙状结肠

B. 乙状结肠、空肠、胃

C. 空肠、胃、乙状结肠

D. 空肠、乙状结肠、胃

E. 乙状结肠、胃、空肠

(73-75题共用题干)患者，女性，30岁。半个月前因急性阑尾炎行阑尾切除术，7天前出现高热伴右上腹痛，因疼痛不敢深呼吸。X线提示右侧膈肌抬高，呼吸运动受限，膈下可见占位性阴影。73. 病变发生于此处最合理的解释为

A. 此处血运丰富

B. 此处淋巴管丰富

C. 此处神经丰富

D. 平卧时此处位置较低

E. 阑尾静脉最终汇入门静脉

74. 目前最为恰当的治疗方法是

A. 营养支持治疗

B. 大剂量应用广谱抗生素

C. 肝穿刺引流术+抗生素

D. 根治性切除术

E. 腹腔灌洗，注入抗生素

75. 最可能的诊断是

- A. 肝血管瘤
- B. 细菌性肝脓肿
- C. 原发性肝癌
- D. 肝硬化
- E. 右侧脓胸

(76-78 题共用题干)患者, 女性, 63 岁。近 1 个月来右上腹隐痛, 伴有腹胀、恶心、食欲缺乏, 体重减轻 4kg。76. 查体巩膜轻度黄染;腹平坦, 右肋缘下 3cm 可触及肝, 伴压痛。首先应该考虑的是

- A. 慢性胆囊炎
- B. 肝内胆管结石
- C. 非寄生虫性肝囊肿
- D. 继发性肝癌
- E. 原发性肝癌

77. 最有意义的结果是

- A. 右上腹隐痛
- B. AFP 400 μ g/L
- C. 肝大
- D. 梗阻性黄疸
- E. 脾无肿大

78. CT 提示右肝有一 3cm 肿块, 胃镜发现有食管静脉曲张。患者移动性浊音阳性, 总胆红素 123mmol/L。此患者可以考虑的治疗是

- A. 右半肝切除
- B. 肿瘤局部切除
- C. 肝移植术
- D. 断流术
- E. 局部乙醇注射治疗

(79-80 题共用题干)患者, 男性, 25 岁。餐后运动时突发脐周腹痛伴恶心、呕吐, 并阵发性加重, 发病来未排气、排便。查体:体温 37.3 $^{\circ}$ C, WBC 10.5 \times 10⁹/L。血压 88/62mmHg, 心率 110 次/分;左侧腹部隆起, 肠鸣音高亢, 压痛明显。79. 最可能的诊断是

- A. 十二指肠溃疡穿孔
- B. 急性胰腺炎
- C. 肠扭转
- D. 肠系膜血管栓塞
- E. 蛔虫病

80. 下列处理中最适宜的是

- A. 先行胃肠减压并手术探查
- B. DSA
- C. 口服驱虫药物
- D. 静脉补液
- E. 胃肠减压, 观察病情变化

(81-82 题共用题干)患者, 女性, 42 岁。4 小时前出现右上腹阵发性绞痛伴恶心、呕吐, 患者自述 1 年前诊断过胆囊泥沙样结石。查体:体温 37.4 $^{\circ}$ C, 腹部平坦, 右上腹深压痛, 无肌紧张, Murphy 征(-)。81. 该患者此时首选的检查为

- A. 血常规
- B. 腹部立位 X 线平片
- C. B 超和腹部 CT
- D. ERCP
- E. 经皮肝穿刺胆管造影 (PTC)

82. 非手术治疗 1 天后, 患者神志淡漠, 出现皮肤、巩膜黄染。查体: 体温 38.9℃, 血压 80/40mmHg, 右上腹深压痛、反跳痛、肌紧张。此时可诊断为

- A. 急性坏死性胰腺炎
- B. 十二指肠溃疡穿孔并弥漫性腹膜炎
- C. 急性重型肝炎
- D. 急性结石性胆囊炎
- E. AOSC

(83-85 题共用题干) 患者, 男性, 60 岁。12 小时前搬重物后出现右下腹及右侧阴囊剧烈疼痛, 伴恶心、呕吐。既往有右侧腹股沟可复性包块史。查体: 腹胀明显, 全腹轻压痛, 无腹肌紧张, 肠鸣音减弱。右侧腹股沟韧带中点上方至右侧阴囊高起, 呈梨形, 不能回纳, 有轻压痛。83. 该患者最可能的诊断是

- A. 股疝
- B. 右侧急性睾丸炎
- C. 睾丸恶性肿瘤并内出血
- D. 急性阑尾炎
- E. 右腹股沟斜疝嵌顿

84. 以下初步处理中错误的是

- A. 禁食、水, 做胃肠减压
- B. 腹部 CT
- C. 补液治疗
- D. 做好立即手术的准备
- E. 手法还纳

85. 手术中关键的处理是

- A. 用补片修补
- B. 切除嵌顿肠管
- C. 判断被嵌顿的组织的生命力
- D. 高位结扎疝囊
- E. 消除病因

(86-87 题共用题干) 患者, 男性, 45 岁。3 个月前开车时上腹部被方向盘顶伤后, 出现上腹部持续性胀痛, 逐渐膨起, 餐后加重, 并放射至腰背部, 伴有恶心、呕吐。查体: 体温 38℃, 上腹部偏左侧明显膨隆, 可扪及界限不清、固定、有触痛肿物, 直径 6cm。86. 下一步应做的检查是

- A. 电子胃镜检查
- B. 胆管造影
- C. 腹部 CT
- D. 超声波检查
- E. 胰腺磁共振

87. 该患者最可能的诊断为

- A. 先天性胆管扩张
- B. 横结肠癌

- C. 肾上腺肿物
- D. 胰腺肿物
- E. 胰腺假性囊肿

(88-90 题共用题干)患者, 男性, 50 岁。因消化性溃疡穿孔急诊行毕 I 式胃大部切除术, 术后第 2 天起出现右上腹剧烈疼痛。88. 查体: 右上腹压痛明显, 伴肌紧张, 未扪及明显包块。B 超示肝下多量积液。应考虑该患者出现的并发症是

- A. 吻合口溃疡
- B. 急性完全性输入段梗阻
- C. 碱性反流性胃炎
- D. 十二指肠残端破裂
- E. 输出段梗阻

89. 这种并发症多见于

- A. 十二指肠巨大溃疡行胃大部切除术
- B. 胃大弯侧溃疡行胃大部切除术
- C. 胃底溃疡行胃大部切除术
- D. 胃角溃疡行胃大部切除术
- E. 胃小弯侧溃疡行胃大部切除术

90. 这一并发症的最主要原因是

- A. 胃肠减压失效
- B. 切除胃的范围过大
- C. 术中勉强缝合闭合困难的十二指肠残端
- D. 术中未放置腹腔引流
- E. 未加行迷走神经切断术

91. 患者, 男性, 20 岁, 餐后打篮球时突起腹部绞痛, 伴阵发性加重, 无恶心、呕吐, 考虑为

- A. 麻痹性肠梗阻
- B. 胆道蛔虫病
- C. 肠扭转
- D. 肠套叠
- E. 肠系膜血管栓塞

92. 患者, 男性, 80 岁, 便秘 20 多年, 偶有腹痛。今日突发腹部绞痛, 排便时发现便呈果酱样, 伴有明显腹胀, 考虑为

- A. 麻痹性肠梗阻
- B. 胆道蛔虫病
- C. 肠扭转
- D. 肠套叠
- E. 肠系膜血管栓塞

93. 患者, 女性, 60 岁, 饱餐后中上腹痛、腹泻 2 年, 仰卧位可加重。今日突发腹部绞痛, 腹胀、腹泻、呕吐伴休克, 考虑为

- A. 麻痹性肠梗阻
- B. 胆道蛔虫病
- C. 肠扭转
- D. 肠套叠
- E. 肠系膜血管栓塞

94. 恶臭，脓性液体见于

- A. 结核性腹膜炎
- B. 阑尾炎穿孔腹膜炎
- C. 消化性溃疡穿孔腹膜炎
- D. 急性子宫内膜炎
- E. 肠系膜血管栓塞

95. 黄色浑浊含胆汁液体见于

- A. 结核性腹膜炎
- B. 阑尾炎穿孔腹膜炎
- C. 消化性溃疡穿孔腹膜炎
- D. 急性子宫内膜炎
- E. 肠系膜血管栓塞

96. 暗红色血性液体见于

- A. 结核性腹膜炎
- B. 阑尾炎穿孔腹膜炎
- C. 消化性溃疡穿孔腹膜炎
- D. 急性子宫内膜炎
- E. 肠系膜血管栓塞

97. 属于肝前型门静脉高压症的疾病是

- A. 门静脉海绵样变
- B. 巴德-吉亚利综合征
- C. 肝包虫病
- D. 血吸虫病
- E. 原发性肝癌

98. 属于肝内型门静脉高压症的疾病是

- A. 门静脉海绵样变
- B. 巴德-吉亚利综合征
- C. 肝包虫病
- D. 血吸虫病
- E. 原发性肝癌

99. 胃、十二指肠溃疡的表现为

- A. 伴有寒战、高热，并出现黄疸，可触及肿大的胆囊
- B. 进行性体重下降、食欲缺乏，出血以黑粪为主，呕血少见
- C. 出血量大，伴肝掌，肝、脾大，腹壁皮下静脉曲张
- D. 继发于休克、脓毒症、烧伤、大手术或中枢神经系统损伤后的疾病
- E. 出血部位常位于胃小弯或十二指肠球部

100. 门静脉高压症的表现为

- A. 伴有寒战、高热，并出现黄疸，可触及肿大的胆囊
- B. 进行性体重下降、食欲缺乏，出血以黑粪为主，呕血少见
- C. 出血量大，伴肝掌，肝、脾大，腹壁皮下静脉曲张
- D. 继发于休克、脓毒症、烧伤、大手术或中枢神经系统损伤后的疾病
- E. 出血部位常位于胃小弯或十二指肠球部