

317 外科学

相关专业知识

- 1.关于人体体液分布哪项是错误的
 - A.体液可分为细胞内液与细胞外液二部分
 - B.体液占体重的比例，一般男性大于女性
 - C.新生儿体液可占体重的80%
 - D.细胞外液占体重的35%~40%
 - E.细胞外液包括血浆与组织间液
- 2.对于一个终末期肾衰的病人，下列哪种情况不适宜进行肾移植手术
 - A.年龄大于50岁
 - B.年龄小于2岁
 - C.肾盂肾炎病史
 - D.肾癌
 - E.幼年发病的长期胰岛素依赖型糖尿病病史
- 3.急性阑尾炎早期上腹部及脐周围疼痛是由于
 - A.胃肠道反射性痉挛
 - B.腹膜炎症刺激
 - C.内脏功能紊乱
 - D.合并急性胃肠炎
 - E.内脏神经反射
- 4.输血后非溶血性发热反应的最常见原因是
 - A.细菌污染
 - B.感染
 - C.致热原
 - D.过敏反应
 - E.血液凝集
- 5.女性，30岁，近20天来一直在用皮质类固醇激素治疗，拟在近3~5天做阑尾切除术，对于激素应采取
 - A.立刻停药
 - B.减半给药
 - C.逐渐减量
 - D.术前3天开始每日给50mg,肌注，手术日给100mg,肌注
 - E.术前3天开始每日给100mg,肌注，手术日给200mg,肌注
- 6.男，65岁，胃癌根治手术后10天，一直使用中心静脉全胃肠外营养，突然出现不明原因的寒战、高热，下列那种处理是错误的
 - A.立即停止中心静脉输液
 - B.检测输液瓶内液体
 - C.血培养
 - D.导管尖端细菌培养
 - E.立即由中心静脉输入抗菌药物

7.下列哪项不需预防性应用抗生素

- A.大面积烧伤
- B.迷走神经切断术
- C.急性结肠 梗阻行结肠切除术
- D.严重复合外伤
- E.胰十二指肠切除术

8.单人进行心肺复苏时，人工呼吸和胸外按压的比例应是

- A.2:15
- B.2:5
- C.4:15
- D.2:10
- E.1:5

9.门静脉高压症时，受影响最早、最显著的侧支血管为

- A.脐静脉
- B.胃冠状静脉
- C.直肠上静脉
- D.腹腔后静脉
- E.腹壁上静脉

10.下列哪项不是痔形成的因素

- A.无静脉瓣
- B.直肠上、下静脉丛畸形
- C.静脉壁薄弱，结缔组织萎缩缺乏支持
- D.腹压增高
- E.直肠肛管慢性感染

11.以下有关急性肠系膜上动脉栓塞的临床表现的描述中，哪项是错误的

- A.既往史中常有冠心病或房颤史
- B.剧烈腹部绞痛，药物难以缓解
- C.早期即出现明显的腹膜刺激征
- D.频繁呕吐
- E.可于早期出现休克

12.以下有关菌群失调综合征的叙述中，哪项是错误的

- A.多与应用抗生素不当有关，又称为抗生素相关性肠炎
- B.致病菌多为艰难梭状芽孢杆菌和金黄色葡萄球菌
- C.病人主要表现为腹泻，呈蛋花样或海水样便
- D.应立即停用目前使用的抗生素，改用大剂量广谱抗生素控制感染
- E.疑有腹膜炎、肠穿孔者应行手术治疗

13.诊断原发性下肢深静脉瓣膜功能不全最可靠的检查方法为

- A.下肢静脉超声多普勒检查
- B.静脉造影
- C.MRI深静脉成像
- D.Perthes试验
- E.Pratt试验

14.有关乳癌转移的叙述哪项欠妥

- A.乳癌最常见的远处转移为:肺、骨、肝
 - B.乳癌可以不经腔静脉系统直接转移到骨骼
 - C.右乳房下半部癌较乳房其他部位癌转移到肝脏的机会较多
 - D.血行转移多发在乳癌晚期
 - E.乳癌的骨转移大多是多发性的
- 15.与胃癌发生密切相关的因素不包括
- A.存在胃溃疡胃息肉等良性慢性疾病
 - B.萎缩性胃炎伴肠上皮化生
 - C.幽门螺杆菌感染
 - D.胃大部切除术后残胃黏膜反复发作慢性炎症
 - E.浅表性胃炎
- 16.对壶腹部癌与胰头癌鉴别诊断最重要的检查是
- A.B超
 - B.CT检查
 - C.X线钡餐造影
 - D.MRI
 - E.ERCP
- 17.口服胆囊造影时胆囊显影，但不能说明
- A.胆囊管通畅
 - B.胆囊有收缩功能
 - C.胆囊有浓缩功能
 - D.胆囊有分泌功能
 - E.胆囊形态是否正常
- 18.女性，75岁，股骨颈骨折，GardenIV型，首选的治疗方法是
- A.人工髋关节置换
 - B.加压空心钉内固定
 - C.人工股骨头置换术
 - D.三翼钉内固定术
 - E.保守治疗
- 19.慢性骨髓炎行死骨摘除术的最佳时机是
- A.死骨形成
 - B.死骨形成清楚，包壳充分形成
 - C.窦道长期不愈
 - D.炎症急性发作时
 - E.病理骨折已愈合
- 20.下列哪种骨折不是完全骨折
- A.螺旋骨折
 - B.青枝骨折
 - C.嵌插骨折
 - D.压缩骨折
 - E.骨骺分离
- 21.粗隆间骨折典型的畸形体征是
- A.外旋45°畸形

- B.髋关节弹性固定畸形
- C.屈髋挛缩畸形
- D.外展外旋90°畸形
- E.内收内旋畸形

22.下列药物中，用于治疗前列腺增生症的是

- A.5 α -脱氢酶抑制剂
- B.5 α -还原酶抑制剂
- C.5 α -氧化酶抑制剂
- D. α 受体激动剂
- E. β 受体阻滞剂

23.外伤性血胸，胸穿抽出的积血可形成血凝块，下列哪种情况可能性大

- A.给予止血药后
- B.输液、输血后
- C.胸内出血速度很快
- D.补充多种凝血因子后
- E.同时合并食管损伤时

24.男性，42岁，劳累后心悸气短10年，近年来加剧，曾有过夜间不能平卧。半年前有偏瘫史，现已恢复。查体：脉率完全不规律，心尖区有舒张期隆隆样杂音。超声波示：二尖瓣口1.2cm，瓣口有钙化，瓣下结构不清，左房内未见明确血栓，应选用哪种治疗

- A.强心、利尿及抗凝治疗
- B.二尖瓣闭式分离
- C.二尖瓣球囊扩张
- D.二尖瓣直视手术
- E.可继续观察，无须特殊治疗

25.男性，36岁。头部外伤3小时，伤后昏迷15分钟，头痛、头晕伴呕吐2次，CT检查未见异常。进一步处理应

- A.留院观察，如有变化复查CT
- B.做脑室外引流，监测颅内压变化
- C.腰椎穿刺
- D.脑干诱发电位
- E.对症治疗

26.男性，38岁。跌落伤6天，C.T检查未见异常，仍有头痛、呕吐等症状，腰穿压力为180mmH₂O，脑脊液常规化验中有陈旧红细胞，其诊断为

- A.脑挫伤
- B.脑震荡
- C.脑干损伤
- D.颅骨骨折
- E.颅内血肿

27.断层皮片是指

- A.表皮和真皮的全层
- B.只包括表皮的全层
- C.表皮的全层和部分真皮层
- D.表皮真皮全层和部分皮下组织

E.皮下组织薄片

28.关于色素痣发生恶变的征象,以下哪一项是不正确的

A.增长扩大

B.颜色改变

C.局部出现毛囊炎

D.色素痣周围出现卫星痣

E.黑尿

29.根据中国九分法成人人体表面积估计哪项不正确

A.头颈部9%

B.双上肢18%

C.躯干含会阴27%

D.双下肢46%

E.双臀部5%

30.男性,51岁,上腹部隐痛不适1年,近2个月来加剧;入院查体腹平坦,上腹有轻压痛,未触及肿物,大便潜血试验(+),上消化道造影检查显示胃窦部小弯侧黏膜纹理紊乱,胃壁僵硬,未见明显充盈缺损。该患者首先应考虑

A.慢性胃炎

B.胃溃疡

C.胃癌

D.胃黏膜脱垂

E.萎缩性胃炎

31.女性,40岁,黄疸、纳差,体重减轻已2个月,皮肤黄染,肝大,胆囊可触及。外院血液检查:血清总胆红素200mmol/L,AKP40U/L,SGPT16U/L,病人在门诊首选检查为

A.B超

B.MRI

C.选择性腹腔动脉造影

D.核素扫描

E.CEA

32.大面积烧伤病人第1个8小时,电解质、胶体输入为(不包括基础需水)

A.第1个24小时总入量的1/2

B.第1个24小时总入量的1/3

C.第1个24小时总入量的2/3

D.第1个24小时总入量的1/4

E.第1个24小时总入量的3/4

33.局麻时病人出现面色苍白心悸,气短,烦躁不安,首先考虑

A.局麻药中毒反应

B.过敏反应

C.肾上腺素反应

D.高敏反应

E.疼痛反应

34.低渗性缺水轻度缺钠,每千克体重应补充氯化钠多少克

A.0.25g

B.0.5g

- C.0.75g
- D.1.0g
- E.1.25g

(35-38共用题干)

男性，32岁，车祸致股骨骨折3小时入院。查体：神志淡漠，面色苍白，T36.4℃，HR108次/分，呼吸28次/分，BP：19/45kPa（140/90mmHg）动脉血气分析示pH:7.52,PaO₂:16kPa（120mmHg），PaCO₂:2.8kP（21mmHg），HCO₃⁻:24mmol/L,Hb8.9g/dl。

35.该病人存在有

- A.代谢性酸中毒
- B.代谢性碱中毒
- C.呼吸性酸中毒
- D.呼吸性碱中毒
- E.混合性酸中毒

36.出现上述血气结果的最可能原因是

- A.伤肢疼痛
- B.急性肺水肿
- C.合并中枢神经损伤
- D.大量失血
- E.急性肾功能衰竭

37.为纠正上述酸碱平衡紊乱，正确而简单的步骤是

- A.静脉给予碳酸氢钠
- B.静脉给予盐酸精氨酸
- C.肌肉注射吗啡止痛
- D.快速输血扩容
- E.气管插管机械通气

38.该病人不太可能出现下列哪种情况

- A.眩晕，口周肢端麻木及针刺感
- B.手足抽搐，肌肉震颤
- C.Trousseau征(+)
- D.心电图示T波高尖，P-R间期延长
- E.心率快，血清钙水平降低

(39-41共用题干)

男性，60岁，硬膜外麻醉下行大隐静脉抽脱术，术后2小时下肢活动自如，感觉恢复。4小时后又出现腰背疼痛、下肢麻木、运动无力。

39.最可能的诊断是

- A.硬膜外血肿
- B.脊髓前动脉综合征
- C.脊损伤
- D.脊神经根损伤
- E.硬膜外胶肿

40.进一步检查首选

- A.肌电图
- B.脊柱CT

- C.脑电图
- D.腹部X-RAY
- E.椎管内造影

41.诊断明确后应采取

- A.手术切开，椎板减压，肿块清除
- B.加强抗炎治疗
- C.给予神经营养药
- D.给予扩血管药
- E.给予激素治疗

(42-43共用题干)

女性，24岁，骑马时从马背上摔落，神志清醒，自诉左胸痛，左下肢疼痛，踝关节肿，大腿有异常活动，足背动脉搏动好，足趾感觉运动好。

42.现场急救应首先注意

- A.静卧，检查病人全身情况
- B.检查病人有症状的部位
- C.检查病人无症状的部位
- D.赶快转运
- E.吸氧，输血

43.左下肢最好采取的措施是

- A.加压包扎
- B.患肢固定
- C.手法复位
- D.局部按摩
- E.暂不处理

(44-46共用题干)

男性，30岁，工人，餐后1小时突发上腹部剧痛，很快扩散至右下腹，疼痛呈持续性，无放射，伴有恶心呕吐。发病3小时后来院就诊。体检：血压16/9kPA(120/70mmHg)，腹平，全腹压痛，反跳痛，肌紧张，以右上腹及中上腹为甚，肝浊音界不清，肠鸣音微弱，患者行立位X线腹平片检查：未见膈下游离气体。44.

应考虑什么诊断

- A.胆囊穿孔
- B.乙状结肠穿孔
- C.肝破裂
- D.结肠肝曲肿瘤破裂
- E.胃十二指肠溃疡穿孔

45.患者的腹痛原因是

- A.细菌性腹膜炎
- B.化学性腹膜炎
- C.肠道梗阻
- D.消化性溃疡
- E.肠麻痹

46.此例患者的首先治疗方案为

- A.镇静，止痛
- B.支持治疗

- C.穿刺引流
- D.胃肠减压, 补液观察
- E.即行剖腹探查术

(47-50共用题干)

男性, 60岁, 双下肢无力半年, 右腿明显, 近2个月行走不稳, 右手不能扣纽扣, 无外伤史, 无发热。体格检查, 颈背部无明显压痛, 两上肢前臂及手感觉均减退, 右侧尤其明显, 四肢肌张力增高, 肱二头肌反射亢进, 双侧膝踝反射亢进, 右髌阵挛阳性, 右巴宾斯基征阳性。47.最有助于鉴别诊断的辅助检查为

- A.颈椎X线片
- B.颈段断层摄片
- C.肌电图
- D.颈段MRI
- E.核素扫描

48.最可能的诊断为

- A.脑血栓
- B.颈部软组织损伤
- C.脊髓型颈椎病
- D.颈椎结核
- E.周围神经炎

49.根据体格检查确定病变节段为

- A.颈5~6
- B.延髓
- C.小脑
- D.臂丛神经
- E.颈7~胸1

50.应考虑的治疗是

- A.颈枕吊带牵引
- B.激素治疗
- C.痛点局部封闭
- D.手术解除压迫
- E.颈托围领

(51-52共用题干)

地震现场, 男性, 30岁, 左腰及下肢被倒塌之砖墙压住。震后6小时救出, 4小时后送抵医院。诉口渴, 尿少, 呈暗红色, 检查:脉搏120次/分, 血压11.7/9.3kPA(88/70mmHg), 左下肢明显肿胀, 皮肤有散在瘀血斑及水疱, 足背动脉搏动较健侧弱, 趾端凉, 无骨折征。51.静脉输液宜首选

- A.全血
- B.血浆
- C.等渗盐水加入1.25%碳酸氢钠溶液
- D.5%葡萄糖溶液
- E.成分血

52.拟诊为

- A.肾挫伤
- B.左下肢血栓形成
- C.创伤性休克

- D.左下肢挫伤
- E.挤压综合征

(53-55共用题干)

女性, 46岁, 因“消化性溃疡出血”行胃大部切除术, 术后5天, 患者出现发热, 最高39.2 °C, 伴有顽固性呃逆。腹胀明显、腹痛、纳差、乏力, 心肺听诊:未及明显异常, 右上腹深压痛、叩痛, 无明显反跳痛、肌紧张, 上腹部未及包块, 切口愈合好。立位腹平片:可见膈下游离气, 右侧膈肌有抬高。53.为进一步确定诊断应进行哪项检查

- A.正位X线片
- B.钡餐
- C.胃镜
- D.CT
- E.尿淀粉酶

54.如病变紧靠腹前壁, 哪项治疗较合适

- A.局部热敷
- B.全身联合应用抗生素
- C.采用腹膜外入路引流
- D.行剖腹手术引流
- E.开窗引流

55.如果病变为多发, 应如何处理

- A.联合应用抗生素
- B.采用腹膜外入路引流
- C.行剖腹手术引流
- D.B超介导穿刺引流
- E.开窗引流

(56-58共用题干)

男性, 26岁。突然上腹剧痛, 不能直腰, 于发病30分钟后来诊, 查BP14.7/10.7kPA(110/80mmHg), P110次/分, 板状腹, 肠鸣音消失, 血Hb12.1g/dl, WBC7x10⁹/L, 分叶72%, 尿淀粉酶128IU/L。56.腹穿抽出较多液体, 应尽早开始治疗的方法是

- A.胃肠减压, 输液
- B.针刺疗法, 缓解腹痛
- C.全身应用抗生素
- D.5-Fu, 654-2静点, 抑制胰腺分泌
- E.手术治疗

57.进一步有意义的首选检查方法是

- A.腹部CT
- B.立位腹X线平片
- C.腹部B超
- D.腹腔灌洗
- E.生化检查

58.出现以下哪种情况提示病情恶化

- A.恶心呕吐频繁
- B.体温持续升高
- C.脉率加快, 体温上升

- D.口干, 大汗淋漓
- E.脉率加快, 体温下降

(59-61共用题干)

男性, 60岁, 既往右上肺结核病史, 体检发现右上肺球形病灶直径约为2.5cm, 痰找结核菌阴性, 纤维支气管镜检查未见异常。给予规律抗结核治疗8周后复查X线胸片, 病变较前有所增大。

59.术中冰冻检查为“肺癌”, 则应行何种手术方式

- A.右上肺叶切除
- B.右上肺叶切除, 淋巴结清扫
- C.右肺全切, 淋巴结清扫
- D.包括肿瘤在内的肺楔形切除
- E.完整切除肿瘤

60.若术中冰冻检查病理结果报告为“结核”, 术后应

- A.抗结核治疗4周
- B.抗结核治疗6~12个月
- C.因病灶已完全切除, 不需要抗结核治疗
- D.长期规律抗结核治疗
- E.术后应给予适当化疗

61.最合理的下一步诊治方法是

- A.继续抗结核治疗, 观察
- B.在病人身体条件允许的情况下, 行右上肺切除、淋巴结清扫
- C.在病人身体条件允许的情况下, 剖胸探查, 肿物切除后送冰冻检查, 根据病理结果决定手术方式
- D.在病人身体条件允许的情况下, 行右上肺肿物切除术
- E.即刻给予化疗

(62-63共用题干)

男性, 28岁, 突然呕血来急诊, 呕血2次, 约1200ml, 血色鲜红, 病人否认既往有肝炎病史, 无黄疸。

62.经一系列检查明确病人有肝硬化, 食管静脉曲张, 脾肿大。此病人若手术治疗不宜行下列哪项手术

- A.脾切除, 脾肾分流术
- B.脾切除, 门腔限制性分流术
- C.脾切除, 贲门周围血管离断术
- D.脾切除, 脾腔分流术
- E.单纯脾切除术

63.为明确出血病因, 病人生命体征稳定后, 选择何种检查

- A.选择性腹腔动脉造影
- B.上消化道钡剂检查
- C.B超检查肝、脾
- D.纤维胃镜检查
- E.核素扫描

(64-66共用题干)

男性, 34岁, 进餐后突发上腹部剧烈疼痛, 随即转移至右下腹部;伴有恶心呕吐, 吐后疼痛无明显缓解。体格检查:患者呈急性病容, 血压12/8kPA(90/60mmHg), 脉率118/分;全腹压痛、肌紧张, 以上腹部为重, 肝浊音界存在, 肠鸣音消失。64.该患者最可能的诊断是

- A.急性阑尾炎穿孔导致的弥漫性腹膜炎
- B.急性胆囊炎伴发坏疽、穿孔

- C.急性坏死性胰腺炎
- D.十二指肠溃疡急性穿孔
- E.乙状结肠扭转

65.为进一步明确诊断，首先考虑安排以下哪项检查

- A.腹腔穿刺
- B.测定血尿淀粉酶
- C.上消化道造影
- D.腹部B超
- E.拍立位X线腹平片

66.如果明确诊断后决定急诊行剖腹探查手术，以下术前准备措施中最为重要的是

- A.输血至血压正常
- B.进行钡剂灌肠
- C.应用广谱抗生素
- D.放置鼻胃管，进行胃肠减压
- E.静脉给予止血药

(67-68共用题干)

男性，42岁，凌晨2时许出现右上腹及右腰部突发剧痛，难忍，伴恶心，呕吐，疼痛向右下腹和大腿内侧放射。查体:右上腹深压痛，右腰部轻叩击痛。67.其最可能的诊断是

- A.急性胆囊炎
- B.胆囊结石急性发作
- C.急性胰腺炎
- D.上尿路结石急性发作
- E.急性溃疡病穿孔

68.为明确诊断简便易行的检查方法是

- A.B超
- B.CT
- C.IVP
- D.MRI
- E.同位素肾图

(69-71共用题干)

男性，35岁，5年前出现右下肢间歇性跛行，近半年来加重，行走50m即觉小腿疼痛，夜间觉右侧第1、2趾疼痛难忍，右足苍白，右足背动脉、胫后动脉未及搏动。69.此病例最可能的诊断是

- A.动脉硬化性闭塞
- B.血栓闭塞性脉管炎
- C.大动脉炎
- D.雷诺综合征
- E.动脉栓塞

70.经检查证实腘动脉以下各分支已栓塞，最佳手术方式是

- A.动脉旁路转流术
- B.腰交感神经切除术
- C.经皮穿刺动脉腔内成形
- D.血栓内膜剥脱术
- E.截肢术

71.由于各种原因，病人未同意手术，下列哪项非手术治疗是错误的

- A.中药治疗
- B.血管扩张药
- C.高压氧疗
- D.足部热疗
- E.Buerger运动

72.患儿，男性，生后体检时发现肛门闭锁。首选检查方法

- A.腹立位X线摄片
- B.腹卧位X线摄片
- C.倒立侧位X线摄片
- D.倒立正位X线摄片
- E.水平侧卧位摄片

73.患儿，男性，生后体检时发现肛门闭锁。X线摄片最佳时间

- A.腹立位X线摄片
- B.腹卧位X线摄片
- C.倒立侧位X线摄片
- D.倒立正位X线摄片
- E.水平侧卧位摄片

74.用于治疗早期狭窄性腱鞘炎

- A.局部注射醋酸泼尼松龙
- B.积极进行功能锻炼
- C.早期手术
- D.患肢制动
- E.不必任何处理

75.用于治疗跟腱断裂

- A.局部注射醋酸泼尼松龙
- B.积极进行功能锻炼
- C.早期手术
- D.患肢制动
- E.不必任何处理

76.用于治疗肩关节周围炎

- A.局部注射醋酸泼尼松龙
- B.积极进行功能锻炼
- C.早期手术
- D.患肢制动
- E.不必任何处理

77.骑跨伤常见的尿道并发症为

- A.尿道外口狭窄
- B.尿道膜部狭窄
- C.膀胱颈狭窄
- D.阴茎部的尿道狭窄
- E.尿道球部狭窄

78.包茎反复感染常出现的尿道并发症为

- A.尿道外口狭窄
- B.尿道膜部狭窄
- C.膀胱颈狭窄
- D.阴茎部的尿道狭窄
- E.尿道球部狭窄

79.蛛网膜下腔麻醉下疝修补术后进食时间为

- A.可即刻进食
- B.3-4小时后
- C.24小时后
- D.肠道功能恢复、肛门排气后
- E.麻醉清醒、恶心、呕吐反应消失后

80.小儿全麻臂部血管瘤切除术后进食时间

- A.可即刻进食
- B.3-4小时后
- C.24小时后
- D.肠道功能恢复、肛门排气后
- E.麻醉清醒、恶心、呕吐反应消失后

81.硬脊膜外麻醉下胃肠道手术后进食时间

- A.可即刻进食
- B.3-4小时后
- C.24小时后
- D.肠道功能恢复、肛门排气后
- E.麻醉清醒、恶心、呕吐反应消失后

82.局部浸润麻醉乳房纤维腺瘤摘除术后进食时间

- A.可即刻进食
- B.3-4小时后
- C.24小时后
- D.肠道功能恢复、肛门排气后
- E.麻醉清醒、恶心、呕吐反应消失后

83.可能有心功能不全存在

- A.中心静脉压很低,尿量多
- B.中心静脉压偏低,尿量少
- C.中心静脉压偏低,尿量多
- D.中心静脉压偏高,尿量多
- E.中心静脉压很高,尿量少

84.提示血容量不足

- A.中心静脉压很低,尿量多
- B.中心静脉压偏低,尿量少
- C.中心静脉压偏低,尿量多
- D.中心静脉压偏高,尿量多
- E.中心静脉压很高,尿量少

85.说明液体量已充足

- A.中心静脉压很低,尿量多

- B.中心静脉压偏低, 尿量少
- C.中心静脉压偏低, 尿量多
- D.中心静脉压偏高, 尿量多
- E.中心静脉压很高, 尿量少

86.胃短动脉发自

- A.十二指肠动脉
- B.腹腔动脉干
- C.肝固有动脉
- D.胰十二指肠上动脉
- E.脾动脉

87.胃网膜右动脉发自

- A.十二指肠动脉
- B.腹腔动脉干
- C.肝固有动脉
- D.胰十二指肠上动脉
- E.脾动脉

88.胃左动脉发自

- A.十二指肠动脉
- B.腹腔动脉干
- C.肝固有动脉
- D.胰十二指肠上动脉
- E.脾动脉

89.伤口分泌物少, 肉芽鲜红呈颗粒状, 高出皮肤

- A.凡士林油纱布
- B.3%~5%盐水湿敷
- C.硝酸银烧灼
- D.1:1000苯氧乙醇湿敷
- E.漂白硼酸溶液(优锁)溶液湿敷

90.伤口有特殊腥臭的黄绿色脓液

- A.凡士林油纱布
- B.3%~5%盐水湿敷
- C.硝酸银烧灼
- D.1:1000苯氧乙醇湿敷
- E.漂白硼酸溶液(优锁)溶液湿敷

91.伤口分泌物较多, 肉芽组织水肿苍白

- A.凡士林油纱布
- B.3%~5%盐水湿敷
- C.硝酸银烧灼
- D.1:1000苯氧乙醇湿敷
- E.漂白硼酸溶液(优锁)溶液湿敷

92.伤口平浅, 肉芽组织色鲜红呈细颗粒状

- A.凡士林油纱布
- B.3%~5%盐水湿敷

- C.硝酸银烧灼
 - D.1:1000苯氧乙醇湿敷
 - E.漂白硼酸溶液(优锁)溶液湿敷
- 93.下列那些血管瘤有自然消退的倾向
- A.草莓状血管瘤
 - B.葡萄酒色斑
 - C.婴幼儿海绵状血管瘤
 - D.成人海绵状血管瘤
 - E.蔓状血管瘤
- 94.以下各项临床表现中, 哪项可以提示有绞窄性肠梗阻存在
- A.X线检查发现孤立、胀大的肠襻, 而且不因时间改变位置
 - B.扩张的肠段呈阶梯状排列
 - C.早期即出现休克, 经抗休克治疗后无明细改善
 - D.呕吐物、肛门排出物或腹腔穿刺液含有血性成分
 - E.出现腹膜刺激征
- 95.测量股骨大转子上移的标准有
- A.Bryant三角
 - B.Nelaton线
 - C.Thomas征
 - D.Shoemaker线
 - E.Gaenslen征
- 96.小脑幕切迹疝发生时,下列哪些结构可能受损
- A.大脑前动脉
 - B.滑车神经
 - C.动眼神经
 - D.大脑后动脉
 - E.丘脑下部
- 97.气管插管适应证
- A.呼吸衰竭病人
 - B.有气道灼伤, 呼吸困难病人
 - C.高位硬膜外阻滞
 - D.合并肺部炎症
 - E.合并严重心脏疾患
- 98.成人颅内压增高的诊断依据是
- A.头痛、呕吐、视盘水肿
 - B.腰穿压力> 180mmH₂O
 - C.颅内压监测
 - D.眼球突出
 - E.成人腰穿压力> 1.2kPa
- 99.由内毒素引起的感染性休克, 应采用下列哪几项综合疗法
- A.消除感染灶
 - B.补充血容量,纠正酸中毒
 - C.应用受体兴奋剂

D.应用A.受体阻滞剂

E.血管扩张剂

100.器官移植前需做的检查是

A.血型

B.淋巴细胞毒交叉配合试验

C.混合淋巴细胞培养

D.HLA配型

E.肝炎系列检查